

「相生山緑地の道路建設に係わる検証委員会」の意見陳述書

がなされていたのでしょうか。如何に優秀な専門家集団であっても、昆虫や生態学の専門家がいない「環境に配慮した道づくり専門家会」のような間違った認識でのルート変更が行われた結果、成虫の生息地をはずしたがために、幼虫の生息地の真ん中を通るというルート変更を行う、根本的な誤りを犯す結果となっていました。

成虫調査についても、メッシュごとの目視による頻度調査が行われていますが、数少ない観察記録に加え、量的な把握がなされないまま行われています。調査は、1シーズン3回と少ないだけでなく、観察日及び観察時間がピーク時とは一致しているとは言えないだけでなく、発生時間、時期及び移動距離などの雌雄の違い(雌は後ろ翅がなく、飛べない)や、一般的に昆虫の場合はオスのほうがメスより早く羽化するなどの特性を考慮して行うためにも、ただ単なる分布ではなく、量的な把握が必要です。

昆虫の調査では幼虫の確認が可能な場合には、成虫の分布よりも幼虫の分布のほうが環境への適応性を見るのには適しています。特にホタルやトンボのようになり成虫に飛翔能力が高い場合は、成虫により分散拡大される開放型よりも、例えばえさ生物や生息環境の悪化(乾燥など)による影響を直接受ける幼虫のほうが環境評価を見るのには適しています。その種がその環境にあっていれば、その種は定着するでしょう。

海上の森の自然は、ギフチョウやハッチョウトンボが生息していることだけが重要であるのではなく、2600種を越す昆虫が生息していることこそ重要であります。私たちの年間を通して週2回行った調査では、その日にしか確認できなかった昆虫が6.1%もあり、その日を逃すと見つからなかったかもしれない種が3分の2もいることを示しています。

生物多様性とは、その地域生態系(環境)を構成している多くの種により成り立ち、多くの種の存在によりヒメボタルも生存することが出来るのです。あくまで、ヒメボタルはその環境における代表種として扱われていますが、多くの生物種の存在により生存しているのであって、その地域生態系の一員でしかありません。

すなわち、ヒメボタルはその地域の多くの種が生息する環境・地域生態系の一員として生息しており、道路建設に伴う工事や構築物の影響が生物たちに及ぼす影響を知るためにも、そして改めて相生山の自然の重要性を検証するためにも、相生山全体の動植物の精度の高い調査が必要です。

正しい環境の評価がなされていない

八田耕吉

「環境に配慮した道づくり」の施工ワーキングにおいて、専門家の環境評価には自然に対する評価に大きな誤りがある。正しい自然への評価がなされないまま、環境への配慮が出来るとは考えられない。名古屋市における「ヒメボタル分布調査」を元に、その問題点を整理する。

- 自然を評価するには、生物多様性が重要であるということは良く知られるようになったが、相変わらずの貴重種保護が優先されている。ヒメボタルがその地域生態系において代表される種であるという観点から選ばれているのであり、その種だけが保護されればよいというものではない。佐渡の5羽のトキを環境省（庁）が捕獲したことにより絶滅したのに対して、中国では同時期に見つけられた7羽のトキの保護を地域ぐるみで行ったことによる保護に成功した例からも容易に理解できるであろう。
- 生態系の保護を論じるには水系や地質などの地理的要因、気象学的要因、植生環境などの特徴をきちんと把握し、特徴種としてのヒメボタルの生息環境を保護する配慮が必要であることはもちろん、その種だけが生き残ってもえさとなる生物が生存していなければだめであろう。
- 第3に、ヒメボタルの生息にとって重要なのは卵から幼虫、さなぎ、成虫を通しての環境がセットでそろっていることであり、成虫の飛翔地域をはずせばよいということではない。すべての環境がそろっていることはもちろんのことであるが、その種の生息に重要なのはむしろ移動が少ない、成長する幼虫期の生息環境が重要である。この点においても名古屋市が行った成虫調査は、精度や手法の欠点を無視しても調査に値しない。（あまりにも科学的根拠のない、初歩的な問題であるため、ここでは詳しくは省略する。）ここでは、市民における幼虫調査結果を参考にすべきであろう。
- 分布状況で「ほぼ全域で確認」、「他地域で確認された」として、計画路線上にいなくなっても影響が少ない、配慮しているとされているようであるが、植物版レッドデータブックの監修にかかわった日本自然保護協会は「他地域に分布するという理由の元に生息地・生育地を奪うことが行われる限り、それらの種は確実にし

