

名古屋市が実施する予防接種 スケジュール(乳幼児)

		2 か 月	3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	備 考
定 期 接 種	ロタウイルス 2回接種ワクチン 3回接種ワクチン	↓	↓									接種可能期間が短いので、他の予防接種のスケジュールも考えて、計画的に接種を受けてください。
	B型肝炎	↓	↓	↓								お母さんから赤ちゃんへの感染予防として、出産直後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた方は対象となりません。
	ジフテリア・百日せき・破傷風・ 不活化ポリオ・ヒブ (DPT-IPV-Hib)第1期	↓	↓	↓		↓						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。ヒブ又は四種混合ワクチンで接種を開始した方は同一ワクチンで接種完了してください。※令和6年4月開始
	小児肺炎球菌	↓	↓	↓		↓						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。 追加接種は1歳を過ぎてから行ってください。
	BCG			↓								生後1歳までの接種により、小児の結核の発症や重い後遺症が残るリスクを減らすことができます。
	麻しん・風しん(MR) 第1期、第2期					↓					↓	1期は1歳になったら、2期は年長児相当の学年になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	水痘 (みずぼうそう)					↓	↓					1歳になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	日本脳炎 第1期							↓	↓	↓		原則として、3歳になってから接種を開始します。
接 任 種	おたふくかぜ					↓						接種する場合は、1歳を過ぎた後できるだけ早めが望ましいです。遅くても、保育園等で集団生活を行う前までに接種を受けましょう。

対象年齢

↓ 接種時期の目安(あくまでおおまかな目安です。必要な接種間隔を考慮して、スケジュールを決めてください。)