

参加無料

Cervical Cancer Prevention Seminar


定員
400名
手話通訳・
要約筆記あり

子宮けいがん 予防を考えるセミナー

日時 令和8年 9月12日(土)
14:00~16:50 (開場13:30)

場所 中区役所ホール
名古屋市中区栄四丁目1番8号 地下2階

方法 次のURLよりお申込みください。
お申込み <https://ishikai.nagoya/seminar/20260912/>
右記の二次元コードからもアクセスが可能です。



守ろう、自分の未来を!



MC
元中部日本放送アナウンサー
有限会社LIBRA代表取締役
ひらの ゆかり
平野 裕加里 氏

講演

第1部 14:05~14:50

未来は予防できる。
子宮頸がんを“自分には関係ない”で終らせない

日本赤十字社 静岡赤十字病院 副院長
第二産婦人科 部長 / 病理診断科 部長
いしかわ よし かず
市川 義一 先生

第2部 14:50~15:35

身体の痛みとその理解

愛知医科大学病院 副院長
疼痛緩和外科・いたみセンター 部長
うしだ たか ひろ
牛田 享宏 先生

トークショー 15:45~16:45

TALK SHOW
井上咲楽さんと
演者によるトークショー

タレントの

いの う え さく ら 一緒に考える子宮頸がん予防★
井上咲楽さん来場!

一般社団法人 名古屋市医師会

共催：愛知医科大学病院 名古屋市 後援：名古屋市教育委員会

【プロフィール】

第40回ホリプロタレントスカウトキャラバンで特別賞を受賞。ABC『新婚さんいらっしゃい』やNHK『サイエンスZERO』ではMCを務めるほか、マラソンやトレイルラン、料理や選挙取材などテレビのみならず、他ジャンルでも活躍中。

子宮けいがんはワクチンで 予防することができます

HPVワクチンの効果


現在日本において公費で受けられるHPVワクチンは、9価ワクチン(シルガード®9)です。

シルガード®9は、HPV16型、18型など複数のHPVの感染を防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。



「9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン ファクトシート」(国立感染症研究所)をもとに作成
研究1: Onuki,M.,et al.(2009).Cancer Sci 100(7): 1312 -1316
研究2: Azuma,Y.,et al.(2014).Jpn J Clin Oncol 44(10):910-917.
研究3: Sakamoto, J.,et al.(2018).Papillomavirus Res 6:46-51.

日本人女性の子宮頸がんにおけるHPVの種類(型)の分布と、
ワクチンで予防できる範囲



接種スケジュール

小学校6年~高校1年相当の女の子を対象に、一定の間隔をあけて、合計2回または3回接種します。接種を開始する年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。

15歳未満で接種を開始すると、
合計2回で接種が完了します。

いずれの接種回数でも、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。

※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3) あけます。


一般的な接種スケジュール

シルガード®9

1回目の接種を
15歳になるまでに
受ける場合



1回目の接種を
15歳になってから
受ける場合



HPVワクチンのリスク

HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

因果関係があるかどうか分からないものや、接種後短期間で回復した症状をふくめて、HPVワクチン接種後に生じた症状として報告があったのは、接種1万人あたり約4人です。

このうち、報告した医師や企業が重篤と判断した人は、接種1万人あたり約2人です。