



名古屋市発！新型コロナだより



オミクロン株による爆発的な感染拡大が発生しています。感染から発症までの期間が短いため、日頃の感染防止対策の徹底が大事です！



令和3年度の累計患者数(令和4年2月6日現在)

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	合計
発生	5,533	1,498	1,253	10,880	9,150	410	60	63	27,268	14,461	70,576
死亡	52	60	11	7	36	9	2	0	10	27	214

2月は約1週間で1月の患者数の約半分程度が発生！第5波で最も患者数が多かった8月を既に上回っています。



Check! オミクロン株の特徴は？



3回目接種に関する最新情報はコチラ→



◆感染から発症までの期間が短い

感染から発症まで従来は約5日間でしたが、オミクロン株は約3日間しかないのので、**1人目の感染が判明した時には、既に二次・三次感染も起こしている可能性があります。**

従来株～デルタ株（感染から発症まで約5日）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
感染					発病									

オミクロン株（感染から発症まで約3日）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
感染				発病										

◆重症化率は低いが…

ワクチンの効果もあり、デルタ株と比較して重症化率は低下しましたが、**感染者数が増加しているため、入院患者数は急激に上昇しています。**

(令和4年2月5日現在)

入院	入院調整	施設入所	自宅療養	調整
624 (市内 602) (市外 22)	4	246	15,409	1,626
軽症 445 中等症 167 重症 12 重篤 0				

◆2回目接種だけでは防ぎにくい

現行ワクチンについては、オミクロン株に対しての発症予防効果が従来の株よりも低く、その効果についても時間が経過するとともに減少していきませんが、**3回目接種をすることによって発症予防効果は再上昇します。**

COLUMN

二重マスクについて

- ・マスクは**脇漏れ**が弱点、漏れがなければエアロゾルの8割を止める
- ・**二重は脇漏れを防ぐ！**不織布を2枚でN95マスクなみの効果
- ・苦しければ1枚（外側）はウレタン
- ・メリハリをつける、外せるときは外す



(愛知県立大学 清水宣明教授より)

今、市民の皆様へ



- 接触のあった知人が陽性であることが判明したら、**各自で接触度を判断し、健康観察や自宅待機**を行ってください。
- 知人から陽性になったと連絡を受けた場合はコチラ→
- 感染の拡大が早いので、**1人目の感染者が判明した時には既に感染が拡大している可能性**があります。日頃から、**マスクの着用、こまめな換気、手洗い・消毒の徹底**をお願いいたします。



感染が拡大しているオミクロン株にも、日頃の基本的な感染防止対策が有効です！

