

名古屋市発！新型コロナだより

3月21日をもってまん延防止等重点措置は解除されましたが、現在も第5波のピークを上回る感染状況です。引き続き、感染防止対策を徹底しましょう。



新型コロナウイルス感染症の発生状況 (令和4年4月3日現在)

(1) 月別新規感染者数

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計
発生	5,533	1,498	1,253	10,880	9,150	410	60	63	27,268	46,642	30,583	2,745	136,085
死亡	52	60	11	7	36	9	2	0	10	170	86	2	445

依然として高い水準で推移し、ここ1週間は感染者数が増加に転じるなど、厳しい状態が続いています。

(2) 年代別新規感染者数

	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代～	合計
3月28日～4月3日	932	1,012	1,368	1,027	1,020	578	181	132	103	6,353
3月21日～3月27日	947	1,004	1,013	967	959	526	160	141	84	5,801
3月14日～3月20日	1,410	1,065	881	1,047	1,017	538	220	127	194	6,499
3月7日～3月13日	1,625	1,084	930	1,107	1,024	623	278	165	295	7,131
割合	19.1%	16.2%	16.3%	16.1%	15.6%	8.8%	3.3%	2.2%	2.6%	100.0%

若い世代での感染率が高く、40歳代以下で8割以上を占めています。



Check! ワクチン接種後の副反応

接種部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢などの症状が現れることがあります。いずれの症状も、大部分は接種の翌日をピークに発現し、数日以内に回復します。心配な方は、事前に市販の解熱鎮痛薬、水分補給の飲料やかゆみ止めの軟膏などを用意しておくといでしょう。

◆接種から長期間（概ね2週間以上）経過した後も副反応が疑われる場合は…

長期間、副反応が疑われる症状が継続する方に、治療および予防接種健康被害救済制度へつなぐための案内をする専用の電話相談窓口を開設しています。

電話番号：090-1886-6370 または 090-1886-6380
受付時間：午前9時00分～午後5時00分
(土日・祝日を除く)

COLUMN

エアロゾル※感染を意識した対策を！

※空気中を浮遊する微小な粒子

・咳、会話、呼吸に伴い、エアロゾル発生

エアロゾル感染を防ぐには…

- ・二重マスクの着用
- ・空気道を意識した換気

(愛知県立大学 清水宣明教授より)

感染効率の違い

接触感染
物に付着 手に付着 口に入る 細胞に到達
1000/ℓ 1 0.01 0
ウイルスは到達前に漸減していく

エアロゾル感染
呼吸：20回、10ℓ/分
細胞に到達
ダイレクト、連続的、繰り返し入る



ワクチン接種に関する最新情報は…



知人から陽性になったと連絡を受けた場合は…



4月に行われる行事等での対策

- 歓送迎会などの行事では、大人数(5人以上)・長時間(2時間以上)の飲食は避けましょう。
- 旅行では、基本的な感染防止対策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動は控えましょう。