

# 名古屋市が実施する予防接種 スケジュール(乳幼児)

		2 か 月	3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	備考			
定期 接種	ヒブ(インフルエンザ菌b型)	↓ ↓ ↓ (初回接種)				↓ (追加接種)						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。			
	小児肺炎球菌	↓ ↓ ↓ (初回接種)				↓ (追加接種)						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。 追加接種は1歳を過ぎてから行ってください。			
	B型肝炎	↓ ↓ ↓		↓									お母さんから赤ちゃんへの感染予防として、出産直後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた方は対象となりません。		
	ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ(DPT-IPV)第1期	↓ ↓ ↓ (初回接種)				↓ (追加接種)						生後3か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。			
	BCG	↓												市内指定医療機関で接種してください。 令和元年10月以降、保健センターでの接種は実施しておりません。	
	麻しん・風しん(MR)第1期、第2期						↓ (1期)							↓ (2期)	1期は1歳になったら、2期は年長児相当の学年になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	水痘(みずぼうそう)						↓ ↓							1歳になったら、できるだけ早く接種しましょう。	
	日本脳炎第1期				↓ ↓ ↓ (初回接種) (追加接種)									原則として、3歳になってから接種を開始します。	
任意 接種	ロタウイルス 2回接種ワクチン 3回接種ワクチン	↓ ↓ ↓											接種可能期間が短いので、接種する場合は、他の予防接種のスケジュールも考えて、計画的に接種を受けてください。		
	おたふくかぜ	↓ ↓ ↓		↓									接種する場合は、1歳を過ぎた後できるだけ早めが望ましいです。遅くても、保育園等で集団生活を行う前までに接種を受けましょう。		

対象年齢
  接種時期の目安(あくまでおおまかな目安です。必要な接種間隔を考慮して、スケジュールを決めてください。)