

名古屋市が実施する予防接種 スケジュール(乳幼児)

		2 か 月	3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	備考	
定期 接 種	ロタウイルス 2回接種ワクチン 3回接種ワクチン	↓ ↓		↓ ↓ ↓								接種可能期間が短いので、接種する場合は、他の予防接種のスケジュールも考えて、計画的に接種を受けてください。	
	ヒブ(インフルエンザ菌b型)	↓ ↓ ↓ ↓		↓ ↓ ↓ ↓		↓						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。	
	小児肺炎球菌	↓ ↓ ↓ ↓		↓ ↓ ↓ ↓		↓						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。 追加接種は1歳を過ぎてから行ってください。	
	B型肝炎	↓ ↓ ↓ ↓		↓								お母さんから赤ちゃんへの感染予防として、出産直後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた方は対象となりません。	
	BCG	↓ ↓ ↓ ↓		↓								市内指定医療機関で接種してください。 令和元年10月以降、保健センターでの接種は実施しておりません。	
	ジフテリア・百日せき・破傷風・ 不活化ポリオ(DPT-IPV)第1期	↓ ↓ ↓ ↓		↓ ↓ ↓ ↓			↓						生後3か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。
	麻疹・風しん(MR) 第1期、第2期						↓				↓		1期は1歳になったら、2期は年長児相当の学年になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	水痘 (みずぼうそう)						↓	↓					1歳になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	日本脳炎 第1期				↓ ↓ ↓ ↓				↓ ↓	↓			原則として、3歳になってから接種を開始します。
接 任 種 意	おたふくかぜ					↓						接種する場合は、1歳を過ぎた後できるだけ早めが望ましいです。遅くても、保育園等で集団生活を行う前までに接種を受けましょう。	

対象年齢
 接種時期の目安(あくまでおおまかな目安です。必要な接種間隔を考慮して、スケジュールを決めてください。)