

## 質問6 その他、ご意見等

### ①「子宮頸がんワクチン接種なし」と答えた方のご意見等

1	子宮頸がんワクチンについて、問題になった時に、かかりつけ医に相談しましたが、その見解は報道などとは違い、接種すべきで安全なものであるとのことでした。それでもTVなどで放送された、後遺症の様子を考えると、どうしても接種に踏み切れません。
2	安全性が確立していないので接種は考えていない。
3	他人数とのSEXしないことが、一番だと思うのですが…。イコールワクチンはいらないと思うのです。そのかわり検診を年一回受診すること決定
4	もう高2です。接種が開始された場合公費で受けられる様、日脳のように接種期間の延長措置がありますよね？
5	ご苦労様です。わが娘は、悩んだ末ワクチンは接種していません。(高校2年)接種しないことのリスクは、知っていますが、やはり副反応への不安があったためです。接種してたとえ今は副作用が出なくても、長い年月を経て影響が出ないとも言いきれない中、不安を抱えながら過ごすことは避けました。従って、今の私同様、年1回の検診、そして何かあれば早期治療に努めていこうと思います。ちなみに娘はまだ婦人科受診はしたことがありません。どうぞ定期接種になるからには、これまでに接種された方の継続的な健康調査を実施し、市民の皆様安心して接種して頂けるよう配慮願います。
6	安全性の面から受けませんでした。無料だからと言って実験のような接種をさせないで下さい！
7	子宮頸がんを受けた後にある副作用が怖かったので打たなかった。
8	各種予防接種の副作用、その他社会問題の背景にある金銭の流れを明らかにして欲しいものです。無料、勸奨の恐ろしさを学び、身を守りたい、と常々感じています。
9	2年前子宮頸がんワクチンの予防接種を受けようと予約しましたが、その日にテレビなどでワクチンの副作用で障害を受けた子供さんの映像を見、こわくなりキャンセルしました。それ以降も子宮頸がんの市民講座等を親子で参加したりしましたが、若いこれからの子供がこのワクチン1回で(3回ですが…)人生が変わってしまったら…。どうしても考えてしまい、今もこわくて受けていない状態です。医学的にはワクチンで子宮頸がんが予防できるステキなワクチンではありますが。またガン家系の私にとっては真っ先に受けさせようと思っていましたが、原因がはっきりしていないので、受けようとはおもいません
10	ワクチンに頼らず、予防のための食生活や日常でできる方法、副作用と思われる症状にも保障をつけるべき！！
11	子宮頸がんワクチンは、2種類あり、どちらがどうだという情報を、自分たちで調べないとわからず(ネット、ママ友からの情報)送られてきた資料だけではまず情報不足。そんな中、どちらをうけるか悩んでいたら副作用の報道をみて、こわくてうけていません。無料だからといってうけません。守りたい人は有料でもうつので、子供が小さい時、水ぼうそう等今みたいに無料というか、補助がなかったけどうけさせましたし子宮頸がんワクチン以外にも色々やるべき事はあるんじゃないでしょうか。
12	副作用の重さをニュースなどでみる度、今後改良されても接種する気(させる気)にならない。検診の重要性を知らせた方が良いと思う
13	国や、自治体の接種勸奨では、全ての子宮頸がんの有効のようにとらえている人が多いと感じる。”一部の型の感染症”とあるが、それを理解して、接種している人は少ないように感じる。又、接種勸奨があまりにも早急であり、頻ぱんすぎる勸奨チラシに違和感を感じていた。厚生省と、薬品会社の癒着？等疑念を持った。接種が始まった当初(現在は知らない)程？全て？輸入のワクチンとの認識だったため、この点でも接種はひかえるべきと考えていた。国や自治体が積極的に働きかけると、ほとんどの人は疑わないし、考慮しない。この点も踏まえて勸奨チラシは作るべきだと思う。副反応の訴えがあった方の早急な救済をすべき。
14	子宮頸がんワクチンは「みだらな遊びをしていなければ、接種しなくてよい」と言われ接種しませんでした。
15	子供が子宮頸がんの接種をする前に、副作用の事例を知ったので打つのをやめました。
16	今回のような新しいワクチンは、副作用がよくわからないので、打つのが怖いと思いました。何件かの病院に大丈夫か聞きましたが、厚生省が認めているのと言う返事しかなく信じる事が出来ませんでした。
17	副反応のないワクチンを、早く作って欲しいです。
18	子宮頸がんのワクチンは、受けるつもりはありません。親の判断で受けさせて、テレビで見るような副反応がでてしまったら、と思うと怖くて接種できません。
19	生理痛がひどく、月経も安定しないのに予防注射はさせようと思いません。副作用がひどくTVで見てもそこまでして予防注射はいいかなと。安心してできる時に検討してみます。
20	子宮頸がんワクチンは色々悩んでやめました。副作用で悩んでいる方々を観て、本当につらい日々を送ってみて、そこまでして本当にワクチンが必要なののでしょうか？やはり安全性をもってからの接種をして欲しいです。

21	未来を確実にさせたいので絶対に受けさせない。被害者にさせたくない、ニュースなどで被害者に対しケアがされていない。
22	本人(娘)が中学生の時に子宮頸がんワクチンを接種するかどうか相談受け、副作用が何年か後に出るといけないからと接種させませんでした。今この様に全国で苦しんでいる子たちを見て、あの時の選択によってうちの娘も同じ様な事になっていたかとも思うととても怖いです。
23	今中3ですが、まだ子宮頸がんワクチンは接種していません。接種した方がいいのか迷っています。早く原因がわかってくれたらと思っています。
24	事前に副作用の情報が入り、接種しない事に決めました。調べたところ、取扱い注意の“猛毒”との事で恐くなりました。今はやめて良かった～！！と思っています。ワクチンの必要性を感じない(必要でない為)、自分の子のは接種させない医者もいると聞きました。乳幼児の時期から始まるワクチン接種、疑問を感じます。子宮頸がんワクチンの副作用の事がある前は予防接種はして当たり前だと思っていたので、これからは、予防接種しないのが当たり前にしたいと思っています。
25	副作用が心配だったので子宮頸がんワクチンを見送っていますが、状況を見て接種を考えています。
26	母の妹が子宮けいがんになったため、上の娘は名古屋市が導入してからすぐに接種しました。問題なかったですが、その後いろいろな報道がありましたので、この娘の接種は見合わせています。
27	子供たちは、子宮頸がんのワクチンを接種するつもりでしたが、多方面の医療関係者の方々から、テストで始まった様なワクチンを受けるよりも、自分で定期的に健診を受けたりして、自分の身を守りなさいと数名の医者から言われました。先生方の意見を聞いて良かったと親子共々おもっております。
28	子宮頸がんのワクチンは受けた方がいいとは思いますが、少数とはいえ副反応で何年も苦しんでいる女の子をニュースで見ました。娘がもしあんな風になったらと思うと、なかなかふみきれません。どうして副反応が出てしまったのか、原因がしっかり解明されたら、そしてワクチンの安全性がしっかり証明されたら、接種させたいとは思っています。(母親)
29	子宮頸がんは性的接触がなければ発症することはないと聞いています。しかし予防接種時までにはわからないので、接種のリスクと、ウィルスに感染するリスクをはかるための資料を提供してほしいです。私自身、最近まで、子宮頸がんは、ウィルスによるもので、接触がなければならないということを知りませんでした。(母)
30	姉は受けましたが、その後話題になり不安になりましたので、受けませんでした。
31	子宮頸がんワクチンは姉の同級生が(3つ上)重度の副反応が出てTVでもとり上げられたので、ワクチン接種をやめています。
32	子宮頸がんワクチンで後遺症が出るのがコワイです。重症、軽症全ての後遺症で悩まれたり苦しんでいる方々のことを思うと、気の毒でなりません。体質とかの関係でしょうか。このワクチンでのみになってしまったということは、このワクチンに原因があると思われます。日本人に合わないワクチンなのでは？日本人用の開発をお願いします。
33	アメリカに滞在していたため、たくさん接種してきています。
34	子宮頸がんワクチンの接種をしていないので、考えています。接種した方がいいと思いますが、副作用が心配
35	副作用がこわくて予防接種をすべてうけていません。子供はとっても元気です。
36	私は(親)予防接種の重要性を理解しているので、これまで、すべての予防接種を受けさせてきました。ですから、子宮頸がんワクチンも受けさせるつもりで準備しておりました。しかし、子が、すでにワクチン接種をした学校のお友達の話をはじめ、それを聞いた私が不安になり準備を保留しました。保留した理由は・受けた子たちが、注射が、かなり痛い(インフルエンザより)とのこと・注射を受けた後も、かなり痛みが続く・受けた後、副作用から、学校を休む子が多いなど、複数の子からの話があったことです。親の私の方が不安になり保留していたら、テレビで報道されるようになり、結局、接種はしませんでした。1本の注射が命をすくうこともあります。しかし1本の注射が未来ある子どもの人生を狂わすこともあります。安全がまだわからない物を使うより、若い時から受診しやすい婦人科を作り、(男性の医師では子は嫌がります)検診を毎回、回数を多く受けることの方がよいかと思っています。子どもたちには、たくさん未来があります。その未来が、たった1本の注射により、人生が狂い、未来をあきらめることは、おかしいです。子どもたちが幸せに育つことが、すべての母親の思いです。母より
37	副作用がこわくて打たせれません。
38	副作用の報道やネットなどを見て、子宮頸がんのワクチンを1度もしてません。このまま、しなくてもいいのか、思い切って、やってみるか、今だに検討中です。
39	子宮頸がんすべてが予防できるわけでもなく、本当に安全なのか信ぴょう性が低かったため、はじめから子宮頸がんワクチン接種はうけません。有料でも無料でも判断は同じ、今後も受けない(接種しない)と思います。
40	受けようかと受診したが、ワクチン2種類の説明と、そのどちらにするか？副作用の例があるが、本当にうけるのか？は、親の判断といわれ、とても困り、結局うけさせることをやめた。専門知識のない親への責任は困るので、しっかり対応してほしい！

41	子宮頸がんワクチンは副作用が気にかかり接種をしていません。また必要性、そして副作用の説明をしてほしい。
42	月1の生理が終わったはずなのに、2週間後にまた始まったりします。出たりはしませんが尿の時など、ティッシュで拭いた時に気づく感じです。月経不順だと思って病院には行っていませんが、心配になりました。
43	子宮頸がんワクチンは副反応と将来不妊になるとネットで読み、病院で1回目の予約をしましたキャンセルしました。
44	子供達に子宮頸がんワクチンを接種させなくて、ほんとに良かったと思っています。これから、子供を産まなければいけない子供達におそろしい薬を使って国はどう責任をとるつもりなのか。体調が悪い子供達が、かわいそうでしかたない。
45	子宮頸がんワクチンを接種させなくて、ほんとに良かったと思っています。国が積極的に接種しろ！！と言っていたのだから、元気な体にもどるまで責任をもって、治療してほしい。しなければならない。
46	接種後、日本脳炎の予防接種が中止になり、不安を感じた、予防接種はできる限りうけないようにしたいと思いました。頸がんワクチンもうつつもりはない。
47	子宮頸がんワクチンはかかりつけの内科に予防接種のお知らせが届いた時に、受けた方がよいのか尋ねたところ、積極的にすすめないと言われました。その後、数年たっていますが、受けた方がよいのか、受けなくてもいいのか、情報がなかなか手に入らず、どうしたものかと思っています。ワクチンの安全性や接種時期などの情報をわかりやすく伝えてほしいです。中1で届いた接種券はいつまで有効なのでしょう？接種時期をすぎてしまったら、どうすればいいのでしょうか？教えてほしいです。(現在娘は中3です。ワクチンは接種していません。)
48	子宮頸がんワクチンの副作用が怖くて、子どもに接種させなくて大正解でした。もっとしっかり調査した上で、接種勧奨すべきでしたね！！とり返しが見つからない様な事になってからでは遅いです！！！！
49	子宮頸がんワクチンを子供に接種させようと、婦人科や内科の先生にも相談しましたが、副作用の症状が酷いという報道をTV・新聞等で観て躊躇しました。もっと、副作用がどうしたら出るのか、接種しても安全なのかどうかきちんとした説明をしてもらわないことには、ワクチンを接種させようとは思いません。費用の面や、手続等わからない事が多いです。
50	安全に接種できる様、原因が早く分かる事を願います。不幸な事が行らない、安全性が完全に認められたものを勧奨して頂きたいです。
51	ワクチン接種をしようと思った矢先に種々な副作用の報道があり、かかりつけの医院(複数)で接種をしていないと言われ、本人には将来検診をまめに受けるように勧めようと思っている。このような状況で、本人の責任で接種を判断させるのは、行政は無責任だと考えます。将来、安全なものができたら、接種を考えますが、補助の対象年齢を現在の対象者も含めてほしい。(中～高1にしぼらないで、30才までとか、今、うけるのをためらっている子が将来に渡ってうけられるようにしてほしい) この欄は保護者→本人にコメントを求めるのはおかしい→予防接種の際は保護者に印を押すことを求めているのに保護者のコメント欄がなく本人に書くように求めるだけのアンケートは疑問？
52	姉が接種して、手が(腕)はれてしまい、かなり注射がいたいと言われていたので。そのあとニュース等で間違いになったので接種をやめました。接種しておきたかったのですが怖くてうてませんでした。
53	子宮頸がんワクチンの副作用が不安で接種させていません。安全性が確認できるよう、名古屋市としての独自の判断があってもいいと思います。
54	病気の為、子宮頸がんワクチンを受けられません。受けても良いかもしれませんが、もしもの時に、TVでやっている、障害がでたら、と心配なので受けていません。(医師からは、受けるのを相談してからと言われてます。)
55	予防接種は相談する医者によってすすめられたりやめた方がいいといわれたり、どちらでもいわれたり、一般人としては自己責任といわれても大変難しいです。インフルエンザ、日脳、B肝などでも同じことがいえます。
56	子宮頸がんワクチンの怖しさについては、ずいぶん前から新聞で取り上げられていたので、接種を控えていました。それなのに病院ではただで受けられるうちに受けておいた方がいいよーと気軽にすすめていたので、ホントに大丈夫～？？と懐疑的でした。役所は対応がおそいですよね！
57	現状では、恐ろしくて子宮頸がん予防接種を受けさせる事が出来ません。早急な状況確認と、対策を求めます。
58	目の病気(白内障等)関係で●を小2から毎日飲んでいる。そのため、病院から「子宮けいがんのワクチンは、受けられません。」と断られ、眼科の先生にも止められてしまった。本当は、受けたいです。友人が子宮けいがんになってしまい、私自身もとっても不安です。
59	心も体も、子供から大人に変化する思春期に、人工的に負荷を与えることは不必要。というより危険。危険性を知らせた上で、予防接種をうける選択をさせてほしい。
60	子宮頸がんワクチンを受けなくて、良かったと思っています。

61	うちの子供は、たまたま接種前にSNSでワクチンの危険性を知り、受けずに済みましたが、その後たくさんの方が、副作用で苦しんでいます。速やかにワクチン接種を中止すべきだと思います。
62	予防接種は途中中止などあり接種ができなかったものがある、保護者のサインをもとめられほんとうに接種することがよいのか心配でなかなかふみきることができない。もっと内容についてや、接種方法についても分かりやすくしてほしい。
63	副作用が心配で子宮けいがんワクチンは接種しなかった。(姉が副作用がひどかったから)
64	生れつき障害がある子供には、このアンケートがあてはまらないものがあるし、答えにくいこともある。どうして接種しなかったのかとかの問いがないのはおかしい。本当は接種させたかったのに、色々報道がありこれ以上身体に異常ができたなら、どうなるかわからないから、必要なことならば早く原因を調べてほしい。
65	子どもが赤ちゃんの頃は言われるがまま当たり前のように予防接種を受けていました。子宮頸がんの予防接種の話がにわかに出た時、直感的に打たせませんでした。国や専門家が結論を出せないのを理由にせず、独自に市が調査を行う姿勢は良いと思います。他国で副作用が出たため中止にした予防接種を国が知らぬ顔で国民に勧めているとの情報もあります。何が本当なのかかわからないですが、専門家と言っても医師会も製薬会社も政治家も利益のためには殺さぬ程度に国民を適当に扱うところがあるように思います。団体、部署、個人、小さな単位で身を守るためによくよく考えることが必要だと思います。できることできないことありますが、大切なことは忘れず生きていきたいものです。頑張ってください！！
66	子宮頸がんのワクチンは調べた結果、リスクゼロではないらしいことがわかり、受けないことに決めましたが、知識がなく、無料でガンリスクを減らせるとなれば、接種する人も多いはず、税金が正しく広く公平に使われることを希望します。
67	親類から副作用があるからワクチンを受けないように言われました。受けなくて本当に良かったと思います。不確かなものを受けさせようとするなんてひどいです。
68	せっかく子宮けいがんの予防接種ができたことを喜び、接種させようとしたところへ副反応のニュースを見て受けることをやめています。22才になる長女が中3だった頃スタートしたと思いますが本人の意思で受けなかったのですが、もし副反応がひどかった時のことを思うと受けなくて良かったと思います。
69	テレビ、新聞等の報道を見ていると、万が一うちの娘もと思うとこの先も受けないとおもいます。接種料金の高い予防接種を無料でと最初の報道を見た時は、接種予定でした。国でもきちんと調査してから決定してほしいと思います。予防の為のワクチンで副作用がでてしまったお子様の回復を願うとともに、その御家族に対してきちんと十分な保障をしてほしいと思います。
70	子宮頸がんの原因のヒトパピローマウイルスの感染を受けないようどういう時にウイルスに感染をおこすかを勉強させることの方が大切だと思う。ワクチンが一部の型の感染を予防するだけだと知り、予防接種を受けるリスクとメリットを天秤にかけた時私は受けない方を選択し、無料で受けれるとは知っていたが、娘2人とも受けさせなかった。今は本当に良かったと思っている。一部の型しかかきかないワクチンを打つ必要があるのか？全く理解出来ない。
71	子供が中学3年生になりますが、どうすればいいのかなやんでいます。中止なら中止と言ってもらえるとうすきります。
72	子宮頸がんの予防接種は出来ることなら接種したいと思っておりますがやはり不安な面があります。今回の結果をきちんと公表していただきたいと思っています。
73	子宮頸がんのワクチンは、副作用の報道を見て、打ったが為に娘も同じ目に合うくらいなら子宮頸がんにならない確立を選択してしまっています。自身は45歳になりますが、子宮頸がんの事も知りませんでしたし、幸い健康状態なので、打たない方向で良いのではないかと考えています。病気にならないとは限らないのは重々わかりますが、リスクがあるなら、と踏みきれません。安全なものだと確信してから考えます。
74	ワクチンを受ける受けないが変ることがありよくわからなくなっている！！まだ17才くらいに1回受け残がある！
75	子宮頸がんワクチンについて、インターネットで調べ、副作用について知ったので接種をしませんでした。市民でも簡単に得られる情報でありながら、情報について市が慎重に検討できなかったものかと思っています。接種するかどうかに迷い、保健所に電話した時は、強くすすめられました。それに従わず、本当によかったと思います。
76	子宮頸がんワクチンの案内を頂いていた頃に、副作用の事を耳にし、自分なりにネット等で調べ色々迷った事を思い出しました。接種しないと決めてから、ニュース番組で、接種後ひどい副作用で体がご不自由になられたお子様を拝見し、大変申し訳なくも以前接種しないと決めた事は正しかったんだと思いました。今後、そのような悲劇を起こさないようご考慮下さい。
77	子宮頸がんワクチン接種を受けるべきか、止めるべきか、早期に情報が欲しい。
78	予防接種はほとんど受けていません。その事で非難されたり、就学前検診を最後にされたりと色々あった。だが、このような事態が生じると自分の選択は間違ってたと思う。また、被害に遭われた方々には手厚く補償をするべきだと思う。その責任が国にはあるはずだ。

79	安全性が100%確立された予防接種のワクチンは存在しないでしょうが、この内容は、報道を見て恐しい事だと思いました。子宮頸がんの予防接種の安全性を高めていただくと共に、安易な性交渉の危険さ、性の本来の大切さという内的な教育を大人が責任を持たなければいけないと痛感しました。
80	副作用がこわくて接種できません
81	テレビ等で副反応の報道を見て接種するのを止めました。今でも結果がはっきり分からないので今回色々な情報が少しでもわかると良いと思います。
82	子宮頸がんワクチンは副作用があり、とても我が子に接種することができませんでした。安心なものであれば接種します。今の状況では、とても案心は出来ません。
83	長女(現在高1)の友人が子宮頸がんワクチンを接種した数ヶ月後から副反応ではないか?と心配する症状(過呼吸や腕が使えず長期間三角巾で通学していた。)がありました。友人と保護者は全く気づいてない様子なのでこちらからは何も言えませんでした。このアンケートがきっかけでご本人と保護者が少しでも気にしていただければいいと思います。
84	子宮頸がんワクチンの無料を受けたいと思いましたが副作用のニュースが流れ、怖くて受けられませんでした。ほんとうに大丈夫なワクチンならもう一度無料で受けさせて下さい(本人が判断できる年齢になったら)
85	子宮頸がんワクチンについては、いろいろ報道やうわさ、レポートなどありますが何がどうなっているのかわからず不安で打てません。1つ1つ(インターネット上で多くの人が信じている、話していることも含め)まとめ、反証したり考察したものをまとめて責任ある信頼性のあるところから発表してほしいです。今のところ、うちの娘はたぶん成人するまでは打ちません。
86	いつ接種に行くか悩んでいた時に、副作用について騒がれ始めたので、結局、こわいので接種せずにいます。絶対安全といわれるワクチンが出来れば接種したいです。
87	副反応が出た方には、打った際、生理中だったか、初潮をむかえていたか、アレルギー体質か、等々既に調査されていることとは思いますが、詳細に調べて頂き、今後この様なことが起きない様に、原因を究明して頂きたいとおもいます。
88	今春、大阪より転入致しました。中3の娘ですが、子宮頸がんワクチンを接種していません。仕方のないこととはいえ、余りにも情報は、不確かで、親として責任を感じますが、未だ接種には至っていません。注射嫌いの娘の副反応を恐れてということもありますが一日も早く、何らかの方向性を見い出していきたいと存じます。このような調査に感謝致します。
89	頸がんワクチンを接種後、強い副反応があるなどTVで放映されているのを見て本当に大丈夫なのか不安です。頸がん予防のために受けさせたいと思いつながらなかなか決心が付きません。迷っています。
90	母の考えで受けなかった子宮頸がんワクチン、自費なら1回3万位と医師から聞いても受けなかった。母に感謝、感謝、感謝!
91	無料で接種の案内がきたので、医療機関に接種の予約をしました。副反応が心配だったことは覚えています。予約した医院が時間指定だったので、学校の都合で受けられませんでした。受けなくて良かったと思っています。(新聞に載っていた方は娘と同学年の方々でした)子宮頸がん検診はちゃんと受けるように言っています。
92	報道ニュースで副作用の出た女の子達を見て、接種がこわくなったのでやめた。
93	「子宮頸がんワクチン」を接種する予定でしたが、接種中止になり受けれていません。3歳年上の姉は接種済です。再開を希望します。
94	危険性がわかっているワクチンでしたので接種させませんでした。公費助成をやめ、副作用の被害を受けている方にサポートをお願いしたいと思います。
95	子宮頸がんのワクチンを受けるのが遅れて、受けようと思った時には副作用の報道がされはじめた為、受けるのをやめました。のちに、子供の友達に副作用で高熱がつづいた人と、手をはれて動かせなくなった人がいました。受けなくて良かったと思いました。
96	子宮頸がんは大変気になっており、予防接種で回避できるならそれが理想です。しかし、安全性の高さが得られない状況では接種にふみきることはできないというのが本音です。
97	アトピーなどがある為、頸がんワクチン接種は何となく親として不安があり、すごく迷っていました。ずっと考えてまわりの様子を見て(だんだん打つ人が増えた)やっと、受けようと思った時に、副作用の件を知りました。やめて本当に良かったと思います。タミフルの飛びおりの副作用も含め、副作用が出る人はいると思います。新聞で知った様な女の子が、心因性とか(気持ち、恐怖などの)問題とか・・は絶対に思えません。予防注射は助かる人もいる人、副作用の出してしまう人も少数ながらいると思います、あの女の子達を心因性、他の要因などとせず、早く公的にたすけてあげて下さい。そして、早く治療法を見つけて下さい。
98	子宮頸がんは副反応の報道を見てまだ1度も接種していません、子宮頸がんが安心して接種できるようになったら接種したいと思っています。期間がもうすぐ切れてしまうので接種年齢をのばしてほしいです。
99	副反応が恐いので接種しませんでした。

100	アンケート対応の子どもは、子宮頸がんワクチンの副作用がかなり問題になっていたためにとりやめました。H5年生まれの子は、高2の時に接種しましたが(サーバリックス)副作用は、幸いにもおこりませんでした。長女の周囲では、接種後、副作用のあった人は、いませんでした。全員、サーバリックスを接種しました。(保護者記入)
101	子宮頸がんワクチンは当初から副反応があることが気になり、助成が出て様子を見ていました。副反応が多かったので2つ目の別の薬剤が導入されてもしばらく打ちませんでした。助成期日が迫り、何人かの医療機関にもお尋ねしましたが、あいまいなお返事だったので結局接種をやめました。まわりはほとんどの方が接種済で、今後娘の将来の健康に不安は持ちますが、やめておいてよかったと思っています。何の疑問も持たず、乳児期からの予防接種と同様に無料というだけで接種をして体調を悪くされた方は本当にお気の毒だと思います。
102	子宮頸がんの安全性等についての情報がわかりづらく、接種した方が良いのか、わからない。
103	ワクチンの副反応の実例を知ってからは、子宮頸がんワクチンを含めすべてのワクチンの接種を控えています。
104	子宮頸がんワクチンを接種した同級生に「まだ?」と言われ、娘は受けたりしましたが、副反応の深刻さが少しずつ問題になっていたのを受け取る受け取らない両方のリスクを話し、また、いつでも受けられるからしばらく様子を見ようと説明して接種していません。
105	子宮頸がんワクチンは高額なので補助のある内に接種したいのですが接種して、もし歩行出来なくなったら等、考えると、接種したくても出来ません。それなら接種せずに、なるかならないかわからない子宮頸がんなので、接種せずにいた方がいいという結論になりました。うてば絶対にならないのなら考えますが。
106	子宮頸がんのワクチン接種を今は副反応があるとこわいので、やめています。早く安全性が高い事が証明されることを希望します。
107	子宮頸がんワクチンは副作用が疑われるうちは接種させたくありません。(母記入)
108	①のワクチンへの不安が大きい。なにが危ないのか教えてほしい
109	接種予定でTELした所、品切れ状態でした。丁度、その時、詳しい友達から、接種は考えた方がよいと教えてもらい、保留にしました。(私も調べた上で)友達にも伝えましたが、無料だからみんなうってるから、と答えられました。娘の友だちは高熱が一週間続き、中学校からさぼっているように思われて、悲しい思いをされていました。(とても痛かったうえ・・・)
110	麻しん、風しん以外のものももっとうけやすくしてほしい。
111	人口を3分の1にする目的を早く叶えたいのはわかりますが、病人や身体異常者を増やして結局、国庫負担が大変というのはいかがなものでしょう。時間はかかるかもしれませんが、今の若い子は結婚や育児に夢を持っていませんから、心配しなくても早晩3分の1になります。ワクチンを受けなければ元気にすごせる子たちはそのまま見逃してあげていただけませんか?せめてものお願いです。
112	接種するかしないか非常に迷ったうえで、結果しなかった。医師に相談した時もあまりいい説明がなされず不安に感じた。サーバリックスとガーダシルの違いについても説明不足であり、まわりには選ぶことなく接種されている人もいて大変不安に思えた。一連の報道もあり、たぶん今後も受けないと思う。本人も同じ考え。
113	子宮頸がんワクチンをはじめ、日本脳炎、インフルエンザ…安心して接種できないものがあり、最近控えています。予防のために死んでしまったり、後遺症に苦しむくらいなら、その病気になって死んだ方がましです。
114	受けた人の話ではたおれた、熱が出たなどあった。大切な子供達の実験台になってしまって、怖いので、受けません。無料検診など、に変えてほしいです。年に一回検査した方がよっぽど良いとTVで、専門の先生がおっしゃっていました。
115	副反応が異常という情報があったのでワクチンは接種していません。
116	子宮頸がんワクチンは、接種を予定していた日にニュースを見て、医師と相談して接種をやめました。その後は接種していません。
117	安全な子宮頸がんワクチンを切望します。
118	子宮頸がんワクチンの接種する年ごろでしたが、本人が小柄な事もあり様子を見ていた所、副作用問題があり、そのまま接種していません。
119	子宮頸がんワクチンは親世代にはなかったものなのでしばらく様子を見て、そろそろ接種しようかと思っていた時、副作用のことを報道で知りました。接種しなくて本当に良かったと思っています。
120	接種させたかったのですが、副作用にまつわるニュースが連日流れたことがあり、様子をうかがっているうちに予防接種に必要な書類等をなくしてしまいました。
121	子宮頸がんワクチンは、こわいので、受ける予定は、ありません。
122	ワクチンは、第1～3回のどれをあげればいいのか分からなかったのので3or2回目の日付を書きました。(ジフテリア、風しん、麻しん等)
123	転居しているため、予防接種のお知らせが届いたり、届かなかったりするので、記憶があいまいになっています。子宮頸がんワクチンは、接種していません。

124	わが家は積極的な接種勧奨されていた時にも必要性や安全性に疑問と不安があったため、あえて接種しないことを選択しました。娘と同じ年頃の子どもたちが接種後にいろいろな症状に悩んでいるという話をTVなどや本で見ると心がとても痛みます。きちんと調査してもらい何が起きたのか、原因を知りたいです。
125	絶対やめるべきだと思う。
126	子宮頸がんワクチンは、回りでもすでに打っている友達がいたので迷いましたが、ニュースや新聞で副反応について報道されていたので、重いリスクをしょってまで、打つ必要はないと考え、娘には打ちませんでした。その子の人生が180° 変わってしまうことに、大変ショックを受け、同じことが2度とおこらないよう、願うばかりです。
127	テレビで報道されている副作用のニュースを見ると不安になり接種させられません。病院でも親の判断でと言われるともし何か副作用があった時に親の責任なのだと感じます。
128	子宮頸がんワクチンは、人口抑制のために添加物の入っているものがあると聞いたことがあるので、ワクチンが誰が作り、何の成分ででき、どういう人たちに推奨され、誰が関わっているかをよく調べて、ワクチン会社関連の金の動きも調べ表面的な思惑で国が動くことなく、安全安心なものだけ使うようにしてもらいたい。おそらくワクチンを作った人の奥さんや娘は使用していないと思う。
129	子宮頸がんワクチンは、まだ年令も低いうちに無料接種が始まり、適令になるまで待とうと思っていたら、副作用の問題が出てきました。無料という言葉で、無差別にどんな、ワクチンが理解せず、受けた方が多かったのでは？
130	子宮頸がんワクチンの安全性には疑問があり、また、その後の国の対応も、あまりに不親切でとても受けられなかった。
131	子宮けいがんワクチンを接種を受けてないのでいつ頃受けたいのかかわからないですし、ワクチンを受けて副作用が出たらこわいのでどうしたらいいかわからないです
132	子宮頸がんワクチン(をふせぎたい気持ちと、副作用のリスクとで、娘に受けさせるかどうか迷います。)を受けようとしていた矢先、副作用のニュースが色々出てきて受けるのをギリギリのところまでとやめました。その後、副作用問題がどうなったのか気にはなっていました。
133	子宮頸がんワクチンを接種して、体調が悪くなったと言う、お子さんがいると聞いて、接種するのをやめました。(熱・頭痛がひどくて、学校に行けない状態が多くなった)
134	ワクチンは、そもそも私達の考え及び体質に合わない為一切受けておりません。特に子宮頸がんワクチンに関しては安全性への疑念が大きくなぜ勧めているのかわかりません。
135	子宮頸がんの副作用が強くなる人がいることがわかってからは接種していません。その後どのようになっているのか知りたい。
136	子宮頸がんワクチンを接種しようと考えていましたが、22年ごろから受けた子供、お母さんから、痛いとか、赤くはれて、打った夜から手が上がりにくくなったとか、不安になる言葉を聞き、もう少し様子を見てから打っても大丈夫かもと思っていました。しかし、その後も不安になる報道もかさなり、見送っています。小5、6と立ちくらみ、頭痛が出はじめ、低血圧走立性調節障害と診断された、ため健康の子と比べるとリスクが有ると考え、接種をやめました。すべてのガンに効力があるなら……しかし、体に一度入れてしまったら、どうすることもできない。賭けごとのように娘の体をワクチンにたくすは、できませんから。まだまだ歴史が浅い薬、リスクの大きさがこわいです。副作用を一生背負うと思えば、…安易には、……。
137	足が冷たかったり眠りが浅いなどもっと小さい時から時々ありましたし、それによって学校を休むのではなく眠れず体力が低下し他の病気になって学校を休むという事がありました。なので、どうゆう風にチェックをして良いのかいまいちわかりずらかったです。
138	アメリカでは、子宮頸がんワクチンを接種する時は、好きな男性が出来た時だそうです。副作用も聞きましたが、日本程ではありませんでした。接種する方もあまりいない様です。日本も早く安全なワクチンを作ってほしいです。
139	副作用が明確にならず、安全性が確立されていないワクチンの接種を自治体が奨励することは控えていただきたいです。
140	初めから受ける予定はしていませんでした。
141	(母より)名古屋市が国に先がけてワクチン接種を無料にして下さったので、ありがたく思っていました。しかし、いざ接種となると、副反応の報道が出て、とても未来のある子供に受けさせられるものではないと思いました。自分なりに調べてみると、①ワクチンではガンの原因となるすべてのウイルスに対応できていない。(全てを予防できない)②ワクチンを打ったとしても、定期的ながん検診は必要ということがわかりました。結局検診は必要ですし、ワクチンが全てのウイルスに効くわけではないので、リスクの高いワクチンは打たせないことにしました。
142	子宮頸がんワクチンは副反応がはっきりしていないため、今後受けるつもりはありません。
143	子宮頸がんワクチンは未接種ですが、今後も受けるつもりはありません。

144	子宮頸がんワクチンができた時、とても良いと思い、娘も是非！と思いました。しかし数年前の数々の情報を目にし、いざワクチン接種の年齢になっても、怖い気がします。まわりの友人もほとんど接種してないと聞きました。今までほとんどのワクチンをきちっと受けてきましたが・・・安心して接種することはできません。
145	「どうして、子宮けいがん予防接種を受けなかったか」という質問は無いですね。もし名古屋市に副反応と思われる女性がいるのならば、国の結論を待っているまでもなく、医療費を無料にしてあげて下さい。「因果関係はわからない」という結論にならないでほしいと思います。
146	テレビ、新聞等で子宮頸がんワクチンを接種したのち、はげしい痛みにおそわれたり、歩けなくなったりして今も苦しんでいる子どもやその家族の姿を見えています。確定はしないものの、ほぼワクチンと副作用と考えられます。その方たちへ手厚い補償やワクチンと副作用の関係についての研究をしっかりとやっていただきたいと思います。
147	子宮頸がんのワクチンは副作用があると聞き、知り合いのお友達の子が車イス生活になったと聞いたので怖くて接種していません。
148	接種をしようかどうか迷いましたが、やはり副作用がこわかったのでやめました。自分自身、接種してないのでしなくても大丈夫かと思いました。
149	子宮頸がんワクチンの安全性が不安で接種を見合わせています。なるべく早くその安全性が確認されることを願います。
150	無料にする前に安全性の確認を正しく行って下さい。安全性に？が付いてから任意接種とするのはいかなものか。子宮頸がんワクチンや、耳鼻科や皮膚科等で接種し、副作用が出現した場合、医師は対応できるのか？接種指定の判断はされているのか。市民の安全性は本当に守られていますか？
151	小学校卒業式のとき、受けるようにしようとしてプリントをいただき、早めに行こうと思ってました。でも過去に予防接種のとき、熱を出し、少し怖い思いをしたので、ちょっと躊躇ったところ、ニュースで問題になっているの見てゾッとしました。
152	子宮頸がんワクチン接種について、婦人科の医師に問い合わせたところ、接種をすすめられました。その時の説明の中に「接種をしても20才になったら1年に1回はがん検診を受けることをすすめます」と言われたので、接種を受けるのはやめました。痛い接種を3回も受けても全く受けなくても、子宮頸がんに対すがん検診が必要ななら、接種は不要と判断しました。
153	健康でいたいために、時間やお金をかけて予防接種をするのに、注射をしたために副作用がでて苦しんだり、ひどいときには後遺症まで残ったりするのはおかしいと思う。ちゃんと安全なものを提供してほしい。
154	子宮頸がんワクチンが接種勧奨された時、周囲のほとんどの方は受けていましたが、我が家では夫がインターネットでの情報などで副作用を心配し、やめました。そもそも若い女性(学生)が性交渉をしなければかからないわけで、その点の広報の対応にも疑問を感じました。
155	今現在も接種についてとても迷っています。テレビ等でみた様な副反応が出現するリスクを考えると親としては積極的に実施できません。実施させもしものことがあったら、きっと、その親は自分を責め続けてしまうでしょう。そのため、このような調査をまとめて頂くということは、とてもありがたく思います。是非この結果について大きく(全国的に実施できるよう)マスコミも取り込み私達の様な親達にもわかるよう伝えて欲しいと思います。
156	今回、解答しましたのは次女になります。長女(20才)が重度のアレルギーがあった為以前よりワクチン接種をひかえてきました。その為次女にもいろいろ調べ考えワクチン接種を控えさせてきました(次女の方がアレルギー値が高かった為)子宮頸がんワクチンも同じ理由(アレルギー有)で接種しなかったのですが当時学校で接種していない子どもに手を挙げさせ、クラスで接種していない子は2人だけでした。その2人にむかって先生が理由も聞かずに「接種させない親はひどい」と言われたと言って帰って来ました。もう少しいろいろな意味でワクチンに関して学ぶ機会を増やすべきだと思っております。
157	子宮頸がん予防接種を接種するつもりでございましたが、今のところ受けておりません。とてもありがたい制度だと思えますが、あまりにも多くの副作用らしきニュースを見ますと、不安です。因果関係の有無が、わかった上で(副作用も)親として判断させていただきたいと思っております。予防接種に対する日頃からの活動に感謝しております。ありがとうございます。
158	1回目の接種を考えた時、H25年頃、病院が積極的でなかったので1度も受けたことがありません。別の病院で無理にでも受けておいた方が良かったのか不安です。
159	日本脳炎・DT・MRの追加接種が済んだら子宮頸がんワクチンも受ける予定でいしましたが、その頃ちょうどニュースで副反応の方の話を聞いて、見送りました。今後、受けた方が良いか心配しています。受けると不妊になるとも聞きました。それは数十年後にしか結果が分からないことなので、どちらにしても大変不安です。今回の調査で、少しでも目に見えて比較できると良いと思うので調査して頂いて良かったです。大変な作業だと思いますが、頑張ってください！！
160	副反応の報道を見て、万が一娘が受けてそういう風になったら怖いので受けられないでいます。

161	この予防接種を機に苦しい毎日を送っている女の子たちがいる事を思うと、調査するのがとても遅いと思います。苦しい時間を食送っている子たちに少しでも早く支援や救済をして下さい。行政機関や大人がどう対応するのか見えています。お願いします。
162	子宮頸がんワクチンで重い後遺症で苦しんでおられる方がいらっしゃいます。国は安全性のあるものかどうかしっかり判断をして接種を促していただきたい。全てのワクチン接種について慎重に考えていただきたいです。この様の事(後遺症の問題)があったので私は娘に受けさせていません。
163	私には、多くの医師の友人がいます。その方々がいなければ接種を受けさせていたと思います。医療の現場では分かっていた事だと思います。これは、大変な問題です。やめるべきです。
164	姉は平成10年産まれで子宮頸がんワクチンを接種しています。何ともありませんでしたが、妹の平成13年産まれの子はまだです。どうしたら良いのか、本当にこまります。いろいろなTVでの情報で接種をためらっています。
165	ワクチンで癌が予防できるのなら(たとえ100%でなくとも)これほどよい事は無いと思います。副作用は薬・ワクチンにはつき物ですが、子供には、病気になってほしくないですし、副作用もこわいです。早く安全なワクチンが使用できる様になればよいと思っております。
166	子宮頸がんワクチンの安全性が確信できたら早目に接種させたいと考えています。いつ頃、確信がすむのでしょうか？
167	身近に子宮頸がんワクチン接種直後から、歩けない、体に力が入らない、突然持っていたカバンを落としてしまう等の症状が出て苦しんでいる方がいるので、今回の調査が実施され本格的にワクチンと副作用の因果関係をつきとめようとする国の姿勢には協力したい思いを強くもちました。娘には国がある程度の見解を出し、副作用があるとしてから、リスクを考慮した上で接種させるかどうかを決めたいと思います。
168	どんなワクチンにも副作用が起こるリスクがある。予防接種を受けるたびに心配だ。たぶん今後も子宮頸がんワクチンは受けないと思う
169	母: 子供は周りの友達が、ほぼ100%といいい程、子宮頸がんワクチンを接種していたので、うたない不安が大きく「打ちたい」まで言いましたが、私がいろんな情報を子供に伝え、本人に決めさせました。当時は接種すればいいのか、接種しない方がいいのか両方でしたが、今では接種しなくて良かったと思っています。本人も、接種しなくて良かったと思っています。メディアの情報にまどわされる事なく、自分の考えをもつこと、真剣に自分の体を考える事などよい機会だったと思っています。
170	子宮頸がんワクチンについては、接種を迷いましたが、副作用がこわいため、受けませんでした。副作用の理由が早く分かるとよいです。
171	H15生まれの弟はジフテリア・破傷風(2期)と日本脳炎(2期)の案内が来て接種しているが、H12生まれの姉は、この2つ(2期のみ)をうけてない。よいものか？子宮頸がんワクチンの副作用が気になる。受けなくていいものか？以上2点がよくわかりません
172	中1で子宮ワクチンを受けようと、時期を見測らっていたら、新聞ニュースでポツポツとワクチンを受けた女の子たちが歩けなくなるという話を聞き、一旦、様子を見ようと、子宮ワクチンは受っていない。その後ニュース・新聞でどんどん報道がされるにしたがい、ますますこわくなり、中1で無料接種だったが高1の現在も、副作用がこわくて打っていない。接種するべきかどうかわからずとても困っている。本当に副作用で歩けなくなったり、記憶がなくなったりするのかハッキリ調べてほしい
173	子宮頸がんワクチンは接種予定でしたが、やめました。
174	副作用のことができたので上の子は打てたけど怖くて打てなくなった。
175	私は2000年6月から海外に移住し2010年に帰国しました。海外でのワクチン接種は一切受けていません。
176	定期接種になる前から海外の副作用事例等、気になってましたので、私自身も打った事ないし、不安材料のあるワクチンを自分の娘の体内に入れても良いのか？と疑問だったので、子宮頸がんワクチン接種を見送りました。学校からの手紙やTV、CM、(すごかった)その時期にかかった医者に「なぜ打たないの??」「この時期逃がすと有料だよ」としつこく言われ、この状況異様だなとさえ思っていました。私は専門科ではないので詳しい事、分かりませんが、今となれば、何の根拠もない自分の勘を信じて良かったと思っています。国は本当にこれからの社会を担う女の子たちの身体のことを思って接種を奨めているのかな？どなたかたちの利害のための定期接種かな？と感じます。副作用で苦しむ方、1日でも早く良くなってほしいなと思うと同時に、母親としての責任の重さを痛感した出来事の中の1つです。
177	子宮頸がんのワクチンの無料が高1までとなっていますが、今のワクチンの状況を考えると、接種はこわくて、できません。本人も接種した子から痛すぎて、失神してしまったときいたりしてうたないと言っています。もうすこしこのワクチンについての情報を公開してほしいです。
178	病気が神経に起こるものなので、主治医の先生からは、神経に関連する副作用が起こる例のある子宮頸がんワクチンB型肝炎の接種は見合わせた方がよいと言われており、未だ接種しておりません。持病の原因もわからず、疲れると神経痛のようなピリピリした痛みを訴えることもあり、こういう性質(たち)なのだと思うので、病気を誘発するのでは、という懸念があります。「子宮頸がん」も怖いですが。

179	質問4の②日本脳炎について。1期初回・1期追加は小さい時にありましたが、2期を受けるように言われ、受けました。確か学校からプリントが来たと思います。
180	受診しようとしたが、副反応問題が起こり、不安になり控えている。今後、どうすればいいのか考案中。
181	子宮頸がん接種による副反応の因果関係がはっきりしないかぎり、不安で接種出来ません。子宮頸がんよりも接種した事による副反応の後遺症の方が怖いです。まだ、学生であり、勉強もしなければなりません。(後遺症のある方が日常生活が困難で×、÷の計算も出来なくなったと聞きました。)副反応のないように接種出来るのであれば、接種したいと思います。より良いワクチンを研究してほしいと思っています。(副反応の無い)
182	100%接種の安全が確認できれば接種をしたい。
183	現段階では「子宮頸がん」のワクチンは恐くて接種させようと思いません。因果関係が明確になることを期待します。
184	本を読んだりして自分でも調べましたが、子宮頸がん予防接種は、まったく意味のない、むしろ、大きなリスクが伴うだけのものだと思います。このようなワクチンを推奨する自治体の気がしれません。
185	子宮頸がんワクチンは本当に安全性が確かになってから接種したいと考えています。
186	子供達に安全なワクチンをお願いしたいです。
187	子宮頸がんワクチンを接種した方が良いのかどうかわからず、何人かの医師にお伺いしたが、それぞれ意見が異なり私の考え方がまとまらず、接種していない現状です。
188	予防接種は積極的に受けていますが、子宮頸がんワクチンだけは、副作用が気になり受けていません。
189	どの予防接種でも副反応が全くないものはないとしても、あれだけ報道されているのを見ると、やはり心配になり考えている間に年が過ぎてしまった。早く何らかの答えがはっきり出るといいと思う。
190	副反応の報道をみて接種しないことにしました。報道があったのは娘が中学1年生の6月、丁度、予防接種対象年齢になった年でした。副反応の症状を知り、感染を予防するワクチンで、その後の人生を台無しにされる様な選択はしたくないと思いました。接種年齢を中学1年～高校1年に設定してみえますが、その年齢が本当に適切なのでしょうか？各個人の性に対する意識の差があると思います。あえてこの低年齢で公的補助を限定するのではなく、大学生まで広げ、それぞれに接種時期の選択ができる様にして頂きたいと思います。何故、ヒトパピローマウイルスに感染するのか、知識をつけた上で選択接種(補助あり)できるのが良いと思います。※年齢により副反応の出現率が違うのかを知りたいです。
191	私は特に副作用など体に異常は現れませんでした。
192	6年生の時、子宮頸がんワクチンを娘の友人達が受け始めていたのですが、子宮頸がんワクチンを受けた後、何年かたった後に、ちゃんと妊娠できるかわからない、とかデータがないというウワサをきいて、又、10台前半で男性と性交する人が子宮頸がんになる、なりやすいときき、娘と話し合い、娘には必要ないワクチンだと判断して接種しませんでした。女子に受けさせるよりヒトパピローマウイルスを女子に感染させる男子全員に受たせて、ヒトパピローマウイルスをなくさせるのが本当だろう妥当だろうと思います。
193	何でも国にすすめられるまま、アメリカにすすめられるまま、臨床のないまま「予防接種」という名の下に激薬を子どもに打つから、こういう事故が多発。受けて後遺症が残った子ども達に対し、どう責任をとるのか。
194	1、副反応(副作用)の報道を見て心配になって、接種は1度もしませんでした。2、ワクチンが2種あり、どちらを接種するかは「接種する側が選択してください。」と医師から言われ迷いもあり、接種しませんでした。
195	子宮頸がんワクチンを受けるメリットよりもデメリットの方が大きいと思う。それなのに、デメリットについては自分で調べなくてはいけないのはおかしい。無料で受けてくださいという手紙(学校から)や広報なごやを読んだ人は、疑うことなく受けてしまうと思う。きちんとメリット、デメリットを表記してほしい。この種のウイルスに感染するのを防ぐなら、性教育をきちんとすべき。
196	ある型の子宮頸がんウイルスにしか効果がなく、早くから海外ではその副作用や危険性が取りざたされていたのに、「無料」をうたって大々的に宣伝までして施行したのは早計ではなかったのか。確立されていない安全性、誰も責任を取らない構図、そこに「ワクチン利権」はなかったのか。まだ因果関係不明とはいえ、行政側が「知らなかった」では済まない事だ。異変がこれだけ起きたことももっと周知すべきだ。
197	生命に関わる病気を予防できるのであれば接種させたいとは思いますが、報道等を見る限り安全性に問題がある様に感じます。思い副作用により日常生活にまで支障がでてはワクチンを接種する意味がなんなのか親としては、よくわからなくなってきます。
198	子宮頸がんワクチンを接種すると何か副作用が出ると思ったので接種は一度もさせなかったです。
199	子宮頸がんワクチンは怖い物だと思い接種しませんでした。
200	子宮頸がんワクチンの必要性は感じますが恐くて受けさせられません。

201	ワクチンを接種させたいという思いもあるが、副作用で生活に支障が出ている子達がいるので、控えている。しっかり究明していただきたい。予防接種による障害は、親として本当にいたたまれない・・・
202	予防接種の知らせが届いた時、任意なので、考えました。本人が注射が嫌いということもあり、全て見送りました。元気ですが、もしも注射の後のことも考えると予想できなかったと思います。冬になる10月(2ヵ月前)～インフルエンザ予防のため、冬はマスクと紅茶でブロックします。副反応で私自身小学時代打った後、気分が悪くなったことからです。参考までに書きました。以上
203	注射を接種するにも病院につれていっただけでも大変ですし、3、4人で押さえて接種なのでうちの場合は症状も口答で言えないのでとても接種はできませんし、考えておりません。
204	子宮頸がんワクチンを打たせたいと思う反面、副作用のニュースを観て、もしあのようになつたら・・・と思うと怖くて打たせる事が出来ません。同級生の母親達と集まるとその話は出ます。皆、悩んでいます。
205	安全性の確立はどうなっているのか。受けさせたいが情報が無いため保留中。
206	社会の授業で「スクラップノート」というノートを書いているのですが、それで中3の私でも新聞を読むことが多くなり、この記事を見つけました。病気を防ごうとワクチンを受けたのに副作用が出て病気になってしまうのはとても苦しいです。自分と近い年齢の方がこのようなことになってしまっているの自分自身と照らし合わせやすく、接種したくないなと思いました。
207	副作用が恐いため受けさせられません。
208	子宮頸がんワクチンは安全性が確定するまで、接種しない。
209	娘(対象者)も原因不明の病気持ちです。手術もしましたしずっと装具をつけて生活しています。原因は不明だそうです。それでも父母としては「あのとき・・・だったら」「あのときのアレが原因だったら」と考えてしまいます。幸い娘は体育は苦手なもの(何しろまがった背骨の持ち主(進行中))友人に恵まれ、近所の大人や先生に恵まれ、前向きに「自分のできること」を目指しています。私は親として、そんな彼女を尊敬します。ご自身の愛する娘さんがある日突然身体に不可逆的な障害や疾病に類するものを得てしまい、その原因が「子宮頸がんワクチンの接種」かもしれない、と考えている皆様へ。お気持ちの一部は心より同感します。しかし世間には「本当に原因不明？」と思いつつ、医療や行政に憤りや限界を感じつつ、親の不徳に日々涙しつつ、この質問には、娘には少々重い内容がありました。それでも彼女は協力しました。苦しんでいる人のために。この8ページが、どれほどの重みをもつか、それをおうけとり下されば幸いです。ちなみに、私のおばは、戦後の混乱期に血液型不適合妊娠で産まれ、脳に重い障害を得ました。私は大学を卒業するまで彼女と一緒にくらしました。彼女はすべての権利を正当に使おうとする「ものいう当事者」で他界する寸前まで、色々な人に援助されながら自宅でのひとりぐらしをつづけましたし、立派な最期(がんでした)をとげました。彼女の障害は「原因はわかっている」けど「どうしようもなかった」ものです。それでも彼女は前向きに生き、くらし、旅立ちました。彼女は誰も責めませんでした。ただ、よりよく生きようとしていました。そんな人もいるということも理解して下さい(母)
210	母親の判断で娘に接種を受けさせませんでした。理由は私の娘時代にはなかったことでなくても健康でくらししておりますので!!初めから何か不信感があり、娘には接種を受けさせませんでした。そのことが幸いして本当に良かったです。今後もしっかりと自分で考え選択していきたいと思っております。5人の子どもを育てている母より
211	H9年生の娘は接種しており副反応は無く安堵したが、副反応の報道を見てからとても接種する気になれません。名古屋市の体制に協力したい。
212	子宮頸がんワクチンは副作用があると聞いたので恐くてうけません。
213	ワクチンの安全性が確認され次第、無料で受けられる期間を延長して、受てるようにして下さい。今のままではこわくて受けられません。
214	幸い、子宮頸がんワクチンを接種しなかったことで、今、健康に過ごしていますが、もし接種していたらと思うと、他人事ではないだけに本当に心を痛めています。できるだけ、解明し、助けてあげてほしいと思います。健康を、元の身体を取り戻してほしいと思います。
215	子宮頸がんワクチンの安全性を明確にしてほしい。接種させたいが、今の現状では、接種しない方がいいと思ってしまう。無料の期間を延長してほしいです。
216	TV等で副作用が出ていることを知り心配になり接種をやめました。まわりの方にも接種後はなんとなく体がだるいという話をきいたりしたので、これからは接種するつもりはありません。
217	子宮頸がんワクチンはまだ認可されてから日も浅く、副作用などの報道を見て心配なので打たずに様子を見ています。
218	すべての予防接種の副作用が心配です。どれだけ効果があるのかも、わかりません。インフルエンザなど・・・。
219	もし可能ならば、接種回数を分母にしたデータだけでなく、接種者数を分母とした副反応発生報告者数もデータとして出していただきたいと存じます。
220	子宮頸がんのワクチンを打った時は何も症状はでませんでしたでしたが、とても心配です。ワクチンを打ったことにより、子供が産めない(できにくい体)とかあるのか、知りたいです!!子供もやめておけばよかったと言っています!!

221	義母は、子宮頸がんワクチンを受けたか？と聞きました。義母は医療機関で長年勤めていたこと、自分の弟が幼少期の高熱で耳が聞こえないので、予防接種は推進派です。私は、アンケートの子供が3女です。長女が1才のころMMRワクチンがあり、3種混合は1回ですむ。という親のラクをしようという考えで、打ちました。その後1年病気がちになり、たいへんでした。そのこともあり、私は予防接種には、慎重です。3女の友だちは今回のワクチンがすごく痛く、うでもはれたというし、新聞に載っている副作用のこともあるので、私は今後もこのワクチンを打つ気はないと義母に伝えました。義母はその後も言いません。自分の目標達成までは何度も話しかけてくるのに、今回は何にも言わないということは、推進派の義母もこのワクチンはどうなのか？と思っているのでは、ないでしょうか。
222	上の子は受けていたので、受けないといけないういながら、時期をのがしていた。そのうち、受けた方の後遺症が問題になりだし、こわくて受けられなくなった。
223	子宮頸がんワクチンを接種しようと思っていた時に 副反応の記事が新聞等に出はじめたので、接種はやめました。
224	海外では以前より使用されていますが、副作用について公にされていないだけなのでしょうか？日本との差は何でしょうか？
225	副反応が恐くて 頸がんワクチンの接種をすることができない。
226	子宮頸がんワクチンに関しては副作用について不安な声があがっていたにもかかわらず、自治体が次々と無料化していた事に驚いていました。「唯一予防ができるがん」といわれていましたが、全ての原因ウイルスにきくわけでもなく、10年後の保障もなく…。娘の友人も「無料だから急いで打った」という人も多く、今後、副作用がでたら、「もっと強く打つのを止めればよかった」と悔やむことになるかもしれないと思っています。「無料にする」＝「自治体が推進する」という意味を深く感じてほしいと思います。
227	接種しようとした時、テレビで副作用のニュースを見て、子どもと相談し一生麻痺が残るか、将来ガンのリスクを考えてやめる事に決めました。
228	子宮頸がんワクチンの接種をしようと思っていた時に副作用の報道をみて心配になり接種をしていません。今後も接種をするのが心配です、接種をしないとダメなのでしょうか？
229	子宮頸がんワクチンを中学生になった頃接種を考えましたが、身近に副作用がでた例を聞き、接種をやめました。ウイルスの感染が公衆トイレの使用による話もききますが（現在社会人？）原因がはっきりしてくるとよいと思います。
230	接種をすすめる前の調査不足により、被害を受けた接種者への責任は、しっかりとって頂きたい。娘に接種をさせなくて、本当に良かったと思います。
231	子宮頸がんワクチンを受けても痛みなどもなく問題はありませんでした。
232	TVを見ていると、こわくて、子宮頸がんワクチンは受け入れられないです。
233	上の子にサーバリックス接種後に、高熱、だるさ、関節痛等の症状が出たため、接種はしていません。今後安全なワクチンができる事を待っています。このアンケートの結果等、正確な信頼できる情報を公開してください。
234	子宮頸がんワクチンは、他の予防接種に比べて、副反応が出る確率が高いと新聞で知りました。ワクチンとの因果関係がはっきりするまでは、接種を中止したほうがよいと思います。子宮頸がんについては、ワクチンではなく、検診を勧奨したほうがよい。ワクチン製造会社は、ワクチンの安全性をきちんと調査したのか、疑問が残る。対応が遅いです。新聞やテレビで副反応のことがとりあげられる前から、口コミやネットなどで、ワクチンの危険性が話題になっていました。
235	今すぐ子宮頸がんワクチンを中止にして、25才位から2年に1度位検診(かんたん出来る物にする)をさせる。
236	このアンケートの内容では子宮けいがんワクチンについて、くわしい結果が出ないと思います。接種しなかった人の意見を書くところがないからです。
237	娘は、インフルエンザやそれ以外の接種をした時に39度の熱が出たり、腕がしびれたりする事があった為、子宮頸がんワクチンを接種する時に、多くの方が副作用で、悩まされている事を知り、万が一接種して、一生悩まされるより、時期が来た時に(成人した時)に娘には、子宮がん検診をきちんと受ける事を勧めようと思いました。名古屋市は色々な助成があり市民としては助かります。その分副作用で苦しめられている人達の助成も充実すると、もっと良い市であると思います。
238	接種しようとした所、病院で、説明をうけ、中止にしました。今だに接種した方が良いのか？予防として接種したいのに、どうすれば良いか？分からないまま。一度も接種してないので、これからも、まよってしまうかも。
239	今のところ、子宮頸がんワクチンの接種は考えていません。もう少し安全というのが確実でないともまだ将来がある子供にワクチンを接種させたいとは思いません。
240	将来の為に、受けさせたいが、初期のワクチンでいろんな日常生活もままならず、受けたばかりに苦しんでいる人が、1人2人ではないと知ると、怖くて受けさせられない。早く次の安全なワクチンを作って欲しい。今高1なので時間もない

241	子宮頸ガンのワクチンの副作用報道が有り、接種を辞めました。安全が確定した時に無料接種期間が終了するのではと、残念なのですが、やはり報道を見ると、不安で接種できません。日本脳炎の時の様に対応して頂けると、有難いのですが。早く原因を知らせて、安心して接種させて欲しいと思います。
242	海外で沢山のヒガイが出ているワクチンを打つ様にすすめるのは信じられない。ネットで確認して打たないと決めましたが、打たなくてよかった。
243	子宮頸がんの予防接種は受けませんでした。
244	保護者です。副反応について、いろいろ出てきたあと、いつまでも接種を中止しない理由がわかりません。健康を守るために打ったはずのワクチンで、いろいろな症状で日常生活をふつうに送ることができなくなってしまったたくさんの娘さんたちが、かわいそうで仕方ありません。とても、健康とは言えない現状を、国や行政はしっかりと見て、聞いて、責任をとってほしいと思います。娘をもつ親として、人ごとではありません。1日も早い対応を願います。
245	子宮頸がん予防のワクチンを接種しようとして、小学校よりプリントが届きましたが、思うところあり、子どもに受けさせなくてよかったと、思っています、副作用がでてしまった方々へ、早くに治療方法が見つかることを祈ります
246	インフルエンザも含め全てのワクチンを受けるつもりはない。怖い
247	副反応が怖く、打つ気にはなれません。
248	学校の同級生に、子宮頸がんワクチンを受けて、歩けなくなり、大学に進学できなくなった人がいる。報道では、無関係だとハッキリ言っているが、身近にも被害者がいて、更に各地でも同じような副作用が多発しているということもあり、本当に無関係なのか、それとも「副作用になる人より、ガンになる人の方が多いために、ワクチンを受けるように言っているのか」真実をしっかりと伝えてほしい。よってワクチンは、なぜ副作用がこんなにも多発したのかという原因がしっかりと発表されるまでは受けるつもりはない。
249	受けた方が良いのか、悪いのかが分からず不安です。早く安心して、ワクチンを受けたいです。(副作用のないワクチン)
250	子宮けいがんワクチンは病院にて予約を取ろうとしていた時期に、色々な問題がメディアで取り上げられ、打つのをやめました。私自身(母親)が子宮けいがん検査にて何度かひっかかり、娘には予防をと考えましたが、今のところ、副作用の因果関係がはっきりしないので 打つ予定はありません。
251	子宮頸がんワクチンを接種しようとしたところに副作用の報道を見て、いろいろ考えすぎくなやみ接種することをやめました。今から楽しい人生をおくるであろう娘に、もし、副作用が出たらと思うとこわくてできませんでした。もしかして何年後かに後悔しているかもしれません。でも、報道を何度もみるとやっぱり接種することはできませんでした。今でもどうしていいのかわかりませんが・・・娘と何回も話し合っって接種することをやめました。
252	予防のために打つはずのものにこのようなリスクがあることに納得できません。多少のリスクはわかっていますが、割合が高すぎて不安です
253	始めから、副反応の心配があり、接種しない選択をしました。このワクチンに反対している団体や、意見を知っていましたから。
254	子宮頸癌のワクチンを使用し重度の副作用で数年たった今でも療養している娘の友人がいます。娘は子宮頸癌のワクチンはいっていません。どうしても射つ必要を感じないからです。必要性を感じず射たないと決めてから、上記の様に友人の副作用を知り、家族でこの決断をして良かったと言いました。
255	予防接種をするしないを保護者の判断の任せるのは止めてほしい。予防接種で生じた副作用症状は国が責任をもって対処してほしい。そうでないと、予防接種が必要であるとわかっているにもかかわらず受けられない。
256	質問2はこたえづらい。誰にでもある症状が多い。統計データに意味があるか疑問…。
257	子宮頸がんワクチンは、安全ですか？
258	副作用がこわくて接種できない。
259	副作用が打ってすぐ出るのではなく何年も(2年位)してから出る場合があると知り、打つのをやめました。安全が確認できた場合は打たせたいとは思っています。
260	副作用の件で不安に子どもも思い、1度も接種していません。結局、私達はどうしたら良いのか……。そう思っているうちに無料の期間が終わってしまいます。ほんとどうしたら良いのか、教えてほしいです！！だいたいこんな状況で期限があるのもおかしいです！
261	部活動の仲間が3人接種したが、「腕が上がらないことが1ヶ月以上続いた」「頭痛がひどく1週間欠席した」「体がだるくて部活動にしばらく参加できない」などの症状が起り仲間内で接種しないように、と話し合っていました。娘はインフルエンザの予防接種でも中1の時、頭痛の副反応が出たのでそれ以後、いっさい何の予防接種も接種していません。子宮頸がんワクチンについても早い時期に沢山の副反応報告があったはずですが、もっと早く中止すべきだったと噴りを感じています。このワクチン以後、予防接種に不信感を持っています。
262	現在16歳。子宮頸ガンワクチンの副作用がこわくて未接種のまま。結局、今後どのようにすればよいのかわからない。

263	子宮頸がんワクチン接種はいずれ受けようと思っていたが、副作用を知り、現在は受ける気持ちはないです。
264	子宮頸がんワクチン助成金があったので、接種を予定していましたが、副作用のTV番組を見て、取り止めました。筋肉注射で痛みを伴うのに安全性も確立されていない。国が接種を進めていることには疑問を感じています。
265	今まで子供の健康を考え、予防接種を受けて来ました。しかし、子宮頸がんワクチンは接種前に副反応問題が出、(国)積極的な接種勧奨を中止した為、接種を見合わせました。(親の積任で接種で副反応がでた時の事を考えると、恐ろしく接種できませんでした)
266	たとえ少人数でも、明らかな異常が出た人がいるなら、危険性のあるワクチンをすすめるということは止めて、予防や早期発見等に力を入れるべきだと思います。わが家ではインフルエンザも、返ってカゼのような症状が出て、ひどくなったことがあったので、接種していません。
267	今回のワクチンの接種は、対象年齢でご案内が届いたが、疑問も感じて、接種には、様子を見ていた。1番、疑問だったのは、2種類の製品を選択する方法のやり方だった。医師でもないのに、決めるやり方は、どうかと思った。また、初経も迎えていないのに、打っていいものか・・・とも、心配だった。身体が変化しやすい思春期に、この注射の接種は、少し年齢が早いように感じた。そう様子を見ていたら、ニュースで話題になり始めたので、ビックリした。最近の子は、初経が早くなっていると医師から聞いた事があるが、そういうのも、今回の問題の影響になっているのか、知りたい。
268	約10,000人の人が頸がんにかかっているとのことですが、やはり10代の女の子が多いのですか？10代の性交渉を経験する子が多くなり、頸がんが増えたと聞いたことがあります。それは関係ありませんか？ワクチンだけの問題ではないと思います。ワクチンでウイルスを予防するという簡単なものなのか疑問です。国や名古屋市が接種を無料にし、すすめられた時、安全かどうか慎重に考えていました。家族(とくに、おばあちゃん世代)には「まだ受けてないの？」と責められ、ごまかすのが大変でしたが、今は受けなくて良かったと思います。簡単にすすめるのはやめて下さい。
269	現在高2年生ですが、副反応が話題になり、接種勧奨をみあわせたので、無料対象年齢がすぎてしまいました。いずれ接種させたいので無料対象年齢の拡大をお願い致します。
270	子宮頸ガンはうけてなかったです。良かったです。なんでも早く打てば良いと思いませんからね。マイペースでいって良かったですよ
271	子宮頸がんの副作用が怖く接種するのを考えてしまいます。
272	今後接種は受けた方がよいのでしょうか。
273	副作用の可能性を考えると心配だし、かといって予防せずにがんになるのも怖いし・・・どちらを選択すれば良いのか、悩みます。
274	子宮頸がんは副作用があるかもと思うと接種できません。
275	子宮頸がんワクチンの副作用が怖いので予防接種を受けるのをやめました。
276	姉は3回とも接種しましたが、次女のこの子は、副作用の報道を見て、こわくなり、接種していません。
277	子宮頸がんワクチンを現在中3の娘に接種させたいと以前は思っていたが、今はがんになる事よりも副作用が恐くて受けたくないと思っていますし 娘もその様に考えています。
278	接種しない事を選択しました。中学校PTA主催の子宮頸がんワクチンに関する説明会に出席しましたが、接種ありきで勧奨する内容でした。一部で疑問視されているという事を事前に聞いたことがあり、質問すると、心配には及ばないということで、スッキリと納得出来る解答はありませんでした。また、いくつかある型の一部の型にのみ有効である事(もちろん、その型ががんの原因となる確率が他の型より高いという説明はありましたが)、接種しても完全に予防出来る訳でなく、健診も併用することが大切という話もされました。総合して考えたところ、副反応についてのしっかりとした説明などが示されなかったこと。健診で早期発見出来るものであるし、接種しても健診する必要があるのであれば、接種のリスクを負ってまでする必要はないと判断しました。様々な考え方がるので、勧奨一筋に偏った情報や説明の仕方でもなくリスクについても(未確認な部分があれば、その点についても)情報を出していただき、考えて選ぶことが出来るようにしていただきたいと思っています。
279	「無料だから、受けた方が良いよ」と周りの人たちに、すごく言われましたが、副作用について調べてみたら、かなりあったので、受けさせませんでした。安全性を確かめてから、接種を決めるべきです。
280	子宮頸がんワクチンを接種した後、副作用が出た人のニュースを見ると怖くて接種できない。
281	日本脳炎を3回目新しいワクチンを接種した時発熱があり心配しました。それ以来、ワクチンを接種するのがこわくなりました。
282	うけようとしたときに、子宮頸がんが もんだいになったのでうけていません。後い症がでると、こわいです
283	子宮頸がんの予防接種はリスクがあるかもしれないので接種していない。少しでも安全性に問題があるなら任意で良いのでは？原因を究明して早く患者さんを救済してあげて欲しい
284	副反応の報道を見て、怖くて接種を止めた
285	副作用があると聞いていたので接種しませんでした。卵アレルギーがある為接種は受けていません

286	副作用が多くの人に出ていて、不安になり、一度も接種していません。今後、副作用の出にくい新しいワクチンを早く作ってほしい。重症になり、歩行も困難、手足のけいれんをしている同じ年頃の子の姿をTVで見て、こわくなった。接種をすすめたご両親も、とても後悔されていて、医師のすすめや、親の判断だけでは、とても決められないと思った。がんになるリスクより、若い時の人生を不自由にしてしまうほうが、辛い。早急にワクチンの改良を願います。
287	製薬会社や医者立場でなく、子供たちのことを考えて決定してください。
288	子宮頸癌ワクチンで様々症状が出ている方が多いようなので、今後、受ける予定はありません。
289	ワクチンができた頃接種しようと思いましたが、「できたてのワクチンがもし後になって副作用でもあったら怖いと思い」接種をしませんでした。そして現在に至っています。一日も早く安全なワクチンができること、安全が確認されることを願っています。
290	今、高校1年生なので安全ならば、接種したいのですが、副反応が怖くてうてません。早く安全な新薬を出してほしいです。
291	まだ、H27.6に生理がきたばかりで、子宮頸がん接種は受けるつもりはありません。もう少し生理が安定するまで待つてからにしようと思っています。
292	まだ、子宮頸がんの接種は検討中です。とりあえず、今のところは必要ないかと思い、本人が大学生になってからにしようかと思っています。
293	親として、子宮頸がんワクチンは接種させたい気もちあります。が、後遺症あった事を聞き、みあわせています。安全性がもっと解れば接種させたいと思います。
294	子宮頸がん予防接種後に、様々な症状がおきた事例が報道されていましてし、接種をしても確実に防げるものではないとの報道もありましたので、子宮頸がんの予防接種はやめました。
295	子宮頸がんワクチンを有効だと思っており、接種したかったのですが、副作用？を心配して期間内に接種することができませんでした。原因解明を願います。
296	このワクチンは不安でまだ接種する気になれません
297	私の娘には、子宮頸がん予防接種は、急遽やめさせました。家畜の牛や豚などにうつ、避妊の成分が含まれていると聞き、クラスでうちの娘だけ接種していません。もう少し行政がきちんと成分のメリット、デメリットを、はっきり表示して分析していれば、このような措置にならなかったはずです。自分の子どもが当事者だったらと考えると、恐ろしいです。接種して副作用反応してない人でも、妊娠できにくい体になっている事は、間違いないでしょう。益々少子化になると感じます。
298	子宮頸がんワクチン接種しよう(中1)しましたが同じ体型の友達が(小がら)接種後腕が肩より上に1ヵ月以上あがらなかったと聞き、うちの子は●でダンスをしていた為接種をやめました。その後TVなどでいろいろみるようになり、久しぶりに(3年)3才年上のダンス仲間に出たら杖や車いす、関節の痛みetc症状が(高1から)出ていた為接種しません
299	TV・インターネットなどに出ている副作用の情報を見ると怖くて接種を受けさせられません。本当に必要性があるのならもう少しきちんとした情報が欲しいと思います。
300	海外で子宮頸がんワクチン接種後、不妊や副作用の危険があると知り、接種を控えました。
301	副作用がこわいのでまだ接種はしていません。本当に安全なのかわからないので接種する事は考え中です
302	20年程前にも、中止になったワクチンがあり、既に子どもに接種した後でしたので、大変不安になった覚えがあります。それも、今回、子宮頸がんワクチンは見送りました。副作用が出しまったお子さんも保護者の方も一生背負っていくのですし、ワクチン接種は慎重すぎる程の試験を重ねてから、決定して頂きたいと思います。
303	2010年頃からサーバリックスは危険だと聞いていました。行政はもう少し世界的に諸外国はどうしてるのか勉強してから接種にふみきってほしいです。今も害作用で苦しんでいる方がかわいそうで仕方ありません
304	子供達をモルモットの様な扱い方をする事はやめて下さい。子宮頸がんワクチンの危険性をもっと多くの人に知らせてほしかった。
305	上の子の時は副作用の報道がなく接種したが、その後報道されることが多く接種することでリスクがあるのであれば、接種する気はない。もっと早く正しいことを報告する必要があると思う。
306	子宮頸がんワクチンの費用の助成対象期間ギリギリに接種する予定でしたが、友だちの中で、腕が腫れたり、痛みが続く子がいることを聞き、副反応が心配で見合わせていたところ、接種勧奨が中止になり、未接種となりました。予防接種の費用を助成していただけるのは、ありがたいと思いますが、安全性を充分、確認した上で行っていただきたいと思います。
307	副作用は怖いので、今は、やはり受けさせたくないです。
308	接種しない理由も上記③です。早く原因をはっきりさせてもらいたいです。
309	子宮頸がんの予防接種を受けなかった理由は、まだ生理がはじまったばかりで体もまだ大人になりきっていない中、子宮の予防接種を受けることにギモンという、全く素人の考えで受けられるギリギリの年令で受けることを子供にも伝えてありました。その後、症状が出て人がニュースで多くとりあげられ、受けないことを選びました。

310	3つ年上の姉は、サーバリックスのワクチンを接種しましたが、特に問題のある症状はありません。姉と同じワクチンを接種させようと思いましたが、メディア等の情報により、安全面への不安があり、未接種のままです。
311	質問2 頸がんワクチン接種後の症状の質問なら分かりますが必要ですか？副反応が多すぎるしワクチン接種などやめれば良いと思います。
312	子宮頸がんの予防接種は、現行の状況では、接種に大変不安ありです。
313	子宮頸がんワクチンを接種しようと考えていた頃、TVで(副反応)報道されるようになりました。様子を見ていましたが、悪いニュースばかり流れ心配になり、まだ接種していません。どうしたらいいのかわかりません。もう、中3なので用紙の期限があと1年しかなく、困っています。
314	中1の時に子宮頸ガンワクチンの接種を知らせるプリントを学校からもらった時に婦人科に問い合わせました。その時、詳しい説明もなく、とにかく受けて、2種類もあるのにどちらでも良いぐらいの返事しかなく、不信感を持ちました。そこで、インターネットで調べた所、副作用の事、全てのウイルスを防ぐ訳ではない事、結局検診が大事な事等を知りました。海外では死亡例もある事を知り、接種を見おくれた所、一年後に副作用報道が始まりました。病院ではこのワクチンを既婚者にまで接種をすすめていたり(意味がない)金もうけにしか思えず、受けなくて正解だったと思います。
315	副反応が出る様な予防接種を無料で大量に女子に打つなんて、本当にこわい。
316	自身でワクチンを2種あるうちの1種を選ぶことも不安があった。どちらがよいか説明を受けても迷う。その間に副作用のニュースを知り、怖くて接種できず。特に必要性も感じず。若いうちに、人生台なしになる位なら、子宮頸がんになる確立の方が低い気がする。
317	安全性に心配のあるワクチンは受けたくない。危険だとわかっていてワクチンを受けることはできない。
318	子宮頸癌ワクチンが原因と思われる症状、出現確率等を公表して欲しい。自分の子供に接種すべきかどうか迷うが判断基準とたくてもする材料がなく、困っている。
319	日本脳炎の記入の仕方が不明。第1期1回目、2回目の標準的な接種年齢は9歳～13歳未満？
320	医療機関で「子宮頸がんワクチン」を勧められましたが、その時娘に何の注射と尋ねられ、「異性との性交渉で病気にかからない予防注射」と応えたら、「じゃあ受けなくても良いね」と断られました。応え方に問題があると思いますが、接種しなくて良かったかなと思っています。
321	私は子宮頸がんのワクチンの接種をしませんでしたが、予防接種があることを知らなかったからではなく、無料だし、接種することが勧奨していたから、むしろ受けようと思っていたけど、ニュース等で騒がれるようになり、インターネットで調べていくうちに不安要素が高まったので、あえて受けるのをやめました。中3の時、私の友達には受けたことで腕が上がらないや痛いなどマイナスな意見が多かったのを覚えています。
322	接種を受けた人が、副反応かもしれない様々な重い症状をテレビで見、接種を見送りました。
323	子宮頸がんワクチンは安全なのか、副作用の出る割合や年齢、症状等、もっとくわしく調べていって欲しいです。
324	私はワクチンを受けた記憶がありません。大きな病気もした事はありません。ワクチンはしないといけなんでしょうか。ワクチンのメリット、デメリットがよく分かりません。
325	副作用があるため、一切これまでに何の接種もしていません。結果として、良かったと思っています。
326	産まれつきの病気(先天性脊柱側弯症)があり、持病がある子が特に副作用がでやすいのでは？と、テレビでみてから心配になり見送っています。早く因果関係をはっきりさせてほしいし、無料で接種できる期間にうてるかわからないので、のぼすなど対応してほしい。
327	●さん等の書籍を読んだ以降、ワクチンは一切接種していません。色々な考え方がありますが、打つ、打たないはこれからも自由選択で(あくまでも任意)あることを、たくさんの人に知ってほしいです。行政もいかにも義務接種のような表現は慎んでほしいと思います。アンケート調査、ありがとうございます。結果をいい方向に反映して頂けると幸いです。
328	日本脳炎13.9.17、13.10.17、追加14.10.21
329	子宮頸がんワクチンとの因果関係が少しでもはっきりして欲しいと思います。親としては正しい情報(本当の情報)が公開される事を願っています。
330	子宮頸がんワクチンの副作用が心配です。家族の中では子宮がんになった人がいないので、今のところはワクチンを接種するつもりがありません。
331	子宮頸がんワクチンは結局どうなるか知りたい。副作用も心配だが、接種もさせたい。
332	副作用がないようでしたら予防接種は受けたい。
333	予防接種の副作用のニュースなどを見てから、予防接種を子供にうけさせるのをやめました。インフルエンザにかかっても、リレンザなどで、すぐ症状が良くなるので、予防接種をやめました。
334	3才違いの姉は何の疑問も持たず子宮頸がんワクチン(サーバリックス)を3回接種し、何も異常はなかった。本人が接種時期を迎え、2種類あるワクチンどちらにするか検討していたところ、副反応が強く出る場合があるという報道を目にして様子を見ていた。安全性が確立されていないうちは接種しない方向で考えている。姉とは体質が違うので、姉が大丈夫だったから、とは思えない。

335	子宮頸がんのリスクも怖いですが、ワクチンを接種して、娘の人生を棒にしよう方がもっと怖い。国がすすめたワクチン接種で、副反応、副作用で辛い思いをされている方々が、本当にかわいそうだと思う。これから、女性として輝く人生が送れたかもしれないのに…。
336	1年半前に、似たような症状で当時8才の妹が歩けなくなったことがあります。今は回復していますが、いろいろな症状にびっくりしてしまいました。今回の予防接種の事とは関係ないですが…
337	子宮頸がんワクチンは、何年も迷った末、接種をやめました。報道をみて心配だったためです。
338	タイミングを見ていたら副反応の報道があり、接種をすること自体をやめた。同じ考えで接種を見送った家庭が数件あった。その後の報道を見て、やめてよかったですと思いました。問2の設問の意味が分からない。子宮頸がんワクチンを打っても打たなくても答えるのか。
339	子供のまわりでも、1回接種したら1週間熱が出たとか、しばらく体調がくずれて学校を休みがちになったとか聞いたので、うちは接種させていません。
340	ワクチンの安全がしっかりしない限り接種しません。
341	怖いからやりませんでした。
342	副作用の問題があったため、こわくて接種をひかえました。
343	知人に頸がんワクチンの副作用と考えられる、全身症状がでて、学校に行けなくなった女性を知っている為に、子供には、打せない。具体的にはプライベートなので答えられない。
344	子宮頸がんワクチンを接種した方がいいのかもしれないけど、TVなどで副作用による症状がでている事を知り、今だに迷っている…というか、打てない。
345	保護者です。名古屋市から子宮頸がんワクチン接種のお知らせをいただいた時、始まったばかりのワクチンで説明の書類を読んで、不安が少し(副作用など)残る内容だったので、接種は、少し様子を見てからにしようと思いました。後日、副作用の報道を見た時、本当に接種しなくて良かったと感じました。副作用の出た方には、大変申し訳ない考えかもしれませんが、母親として正直な気持ちです。
346	テレビで副反応の状態を見たら、恐くて子宮頸がんのワクチンは接種できない。
347	全員が子宮けいがんワクチンを受けているという前提のアンケートですか？子宮がんワクチン調査であるなら、第一問にまず「子宮けいがんワクチンを受けましたか？はい、いいえ」があるべきでは？新しいワクチンということの不安から接種させていません。医者に相談したとき「よいワクチンですからぜひ受けて下さい」とすすめられても、我が娘には接種させませんでした。今となっては、自分のカンを信じてよかったですと思います。困りにも、体の不調がワクチンのせいでは？と心配している方が複数居られます。他人事ではありません。人生にかかわる問題とうけとめています。
348	副作用が問題となっているので、「子宮頸がんワクチン」を接種したくありません。
349	子宮頸がんワクチンについて必要かどうか迷っているの、正しい情報が欲しい。
350	子宮頸がんのワクチンは早くから後遺症についてのうわさがありました。危険を侵してまでの接種をすすめていることに疑問を抱きます。
351	名古屋市からのお知らせで、子宮頸がんワクチンを接種予定していましたが、接種直前で、昨年度に接種をした人々の副反応等の身体の異常があることを知り、急きょ取りやめました。もし知らずに接種していたらと思うと、とても不安な気持ちになっていたと思います。
352	特に情報を得たというわけではないのですが、なんとなく安全性に疑問があった事、痛みが強いと言われていた事もあり、少し様子を見てからにしようと思っていたら、あっという間に色々な症状がでていると報道されて、娘に接種させなくて良かったなと思っています。ここ十年位の間にとんとん色々な予防接種がでてきていて、良いのか悪いのか判断できません。予防という名のもとにむやみやたらに接種する事が本当に良いのか疑問です。
353	子宮頸がんワクチンも接種しようと思っていたのですが、他の予防接種も打っている間に、ワクチン接種後に具合が悪くなったという報道を耳にし、こわくなって見合わせました。
354	現在高1の娘が中学生の時は受けさせようと思っていたのですが、副作用の報道の多さを見て、受けさせない事に決めました。将来子宮頸がんにかかったら後悔するのかと心配ではあります。
355	副作用がこわいので受けさせられないです。(子宮頸ワクチン)(日本脳炎)
356	海外に滞在していた為、注射はスケジュールがちがっています。子宮頸がん予防接種の副作用で苦しんでいるご家族の為にも、このアンケート結果が全国区の活動の役に立てる事を願っています。
357	副作用のニュースをきいてから、接種をためらっています。今回の調査結果をみて、接種するか考え直す予定です。
358	子宮頸がんを受ける事に対し副作用の報道を見て一度も接種していません。中学1年生～高校1年生までは無料ですが、歩けなくなったり痛みで学校に行けなくなったり学校生活に影響するのがこわいです。私達の友達も受けている人、受けていない人とバラバラです。安全性がはっきりするまで考えたいと思います。又、前にくらべて情報が少なくなっています。強制接種から自己判断で接種に変わったからでしょうか？かかりつけの病院の先生も答えに困っています。本当の所どうしたら良いのでしょうか、わかりません。
359	危険な副反応があるにも関わらず、国はなぜ積極的な勧奨をしたのでしょうか。

360	日本脳炎のワクチン接種後に子宮頸がんワクチンを接種しようと担当医と相談していたところに、たまたまニュースの中のあるコーナーで話題にとり上げられたのを見ました。中学に入ってすぐ(平成23年4月)名古屋市から接種する案内と無償のチケットをもらい準備していた失先のことでした。担当の先生は「副作用はどのワクチンにもおこり得るので、本人やご家庭の判断で。医者としては何とも言えない」とのことでしたので、様子を見ました。けれど、娘の友達は接種後体育の授業に参加できない子もいたようで…。将来のことを親として考えての接種で、いくつかの事例のようなことがおきてしまうこと…とても気の毒で悲しいことです。接種せずにも…またちがう不安もあることを…接種啓発の運動をきいてしまっただけにぬぐいきれない(あきらめきれないこと)ことを、忘れないでください。
361	副反応が心配で接種できません。
362	危険かもしれない予防接種よりも直接産婦人科へ行く「子宮頸がん検診」の補助をして欲しい。若いうちから気軽に産婦人科へ行く事が出来るのは、自分の体を知る上でも良い事だと思うからです。
363	子宮頸がんワクチンは、まだ安全なのかどうか分からないので受けるのが不安です。
364	副作用がここまで報道されていなかったのに、2度接種しましたが、運良く何もなく良かったと思っております。ただ、接種後しばらくの間、うでが痛く、手を上げるのもためらう程でした。普通の(小さい頃から受けていた)とは違うなと思いました。
365	これからという若い子を対象にワクチンを打つのであれば、もっと慎重に副反応を調べるべきかと思えます。医者の子は、危ないの打たないと当時はっきり聞きました(医者の奥様から)。自分たちの子さえ良ければ、いいのでしょうか……
366	予防接種の効果及び副作用をはっきりさせ、接種をするかしないかの判断ができるようにして欲しい。
367	部活で激しい運動をしていたので、月経が2ヶ月程こなかつたり、1～2日で出血が止まったりしていた。引退すると急に量が増えて貧血ぎみになった。
368	副反応がこわい。このワクチンの予防接種が始まってすぐ報道を見て、他の予防接種に対しても(下の子たちの)医師より言われなければ進んで申込みなくなった。
369	子宮頸がんワクチンの予防接種案内をもらった直後に見なおしになり、病院からも見おくりを言われています。子供には受けさせるつもりでいました。接種後のリスクも承知した上です。副作用の強く出たお子さん、親続の方には、大変だとは思いますが、でも副作用もある事も、ご存知だったはず。副作用の内容、発症率等を明確にした上で、早く再開してほしいと思っています。
370	子宮頸がんのリスクが大きく報道され未だ副作用の原因がはっきりしないのになぜ予防接種を受けなければならぬのでしょうか。子宮頸がんにかかるリスクの方が低い(身内にいない)なら受けない方を選択する。
371	1回目接種直前で中止しました。
372	子宮頸がんワクチンは、かなり早い段階で危険だとうわさがありました(名古屋市でも無料になった頃)。その為インターネットで自分(母親)が調べ、迷っていました。知人の小児科医と内科医に聞いてみましたが、2人とも学会で危険な副作用の話はないと言っていました。最初に体が不自由になった女の子の話がニュースで出た時、「注射の痛みによるショック症状」という見解に驚き、やはり厚生労働省は信用できないと確信して、子宮頸がんワクチンは娘に受けさせず、将来たとえ高額でも安全なワクチンが開発されてからにしよう決めました。今までも薬害問題はたくさんあります。もっと早く中止していれば被害者が減っていたと思うと、かわいそうでなりません。一般人の私が情報を持っていたのに、国も名古屋市も危険だと知っていた人はいなかったのでしょうか…。今後同じ事をくりかえすのではないかと、他のワクチン(インフルエンザなど)も不安です。
373	副作用について、報道をみたため、予防接種をみあわせた。
374	子宮頸がんのワクチンは、情報が少なく、本当に必要なものなのかが分からないので、接種していません。どんなリスクがあり、それは、他の予防接種と比較してどんな程度なのか。一目で分かる情報が欲しいです。
375	副作用が怖くて接種できない。
376	後遺症が出るという危険性があるとニュースで流れていたのを受けておりません。結局のところいかがなのでしょう。
377	子宮頸がんについて、接種後の症状について怖くて受けさせていません。
378	最初接種しようとした時は、ワクチンがないという事だったので接種できず、接種させようと気づいた時は、無料の日が1日過ぎていました。電話してたのなのですが、ことわれ実費でとう事でした。実費は高かったので、少し悩んでいました。
379	子宮頸がんの予防接種の副作用を知ると、恐くて子どもに打たせられない。
380	副作用との因果関係が明確にならないうちは、接種は控えたいと考えてます。何かあった場合を考えるととても受ける気にはなれません。今後、きちんとした情報提供を希望します。

381	娘の中学の時から子宮頸がんワクチンが無料化され、受けるにあたりネットでいろいろと調べたところ、海外の医学博士の反対論や副作用、日本でも反対する専門医師等がある事がわかりました。不妊になる恐れもあったり、ワクチンの成分に殺虫剤と同じ様な薬が入っている事など指摘しており、子供を生まなくてはいけない大切な子宮に何かあってはいけないとの思いで接種を止めました。高額なワクチンなので辺りの方は受けていましたが、今私が心配していた事が起きていて残念でなりません。専門科の反対を真摯に受け取って、今後の方針を検討して頂きたいと願っています。
382	3歳のH13.5.15に日本脳炎の1回目の接種後、ウイルス性の熱が続き、肝臓の数値が下がって入院する。原因は分からないと言われたが日本脳炎の副作用としか考えられないのでその後は受けていません。予防接種は命とりになる事を忘れてはいけないと思います。
383	質問2の問いは生理中のものなのか、いつもの様子なのか分かりにくかったです。回答の「いつ頃か」は生まれてから「いつ頃」なのか6年生以降の「いつ頃なのか」どちらを回答するのか分かりにくかったです。担当の方はぜひ●を読んでください。
384	子どもたちが接種時期に副作用が大変取りざたされていたので、接種していない。持病もあり、予防接種は最低限度しか接種したくない。
385	何の予防接種も大きな不安の中で受けていました。子宮頸がんワクチンについては、効果が納得できず受けませんでした。
386	子宮頸がんワクチンは、副作用が怖いので、今のところ接種の予定はありません。
387	以前より子宮頸ガンの接種を受けた子の親より、接種後の副作用がひどい話を問題になる前から聞いていた為、我が家では接種しないと決めています。
388	子宮頸がんワクチンを受けようと思っていた頃に、肺炎にかかり入院したりしたことで時期を逃していたところ、副反応の報道があり止めました。
389	子宮頸がんのワクチンについては、当時国や高校、インターネットで打つように言われ、大変迷いました。小さい頃から予防接種をするたびに体調が悪くなり、化学物質により過敏に反応するのではないかと疑うようになりました。小学6年生の時、インフルエンザの接種をしてからさらに悪くなり、学校を1ヶ月程休みました。医師や保健所に相談してもすすめられましたが、私の判断で子供には受けさせませんでした。
390	以前より、子宮頸ガンの接種をした子の親より、副作用がひどい事を問題になる前から知っていたので我が家では接種しないと決めています。
391	中学生に子宮頸がんのワクチンは必要なのかと思っていました。今の年令だけお金がかからないと言われたらみんなあわてて受けると思う。私はワクチンが大丈夫か不安だったし、一生免疫ができるわけでもないから受けなかった。みんな本当に必要かあまり考えないまま接種したと思う。私も区役所に電話をしてワクチンの説明を聞いたことがあったけど、不安だったのでやめました。やめておいて良かった。体調が悪くなった子供たちが早く良くなってほしい。
392	子宮頸がんワクチンの重篤な副作用で苦しんでいる方たちを助ける方法はないのでしょうか？他人事とは思えません。
393	原因をしっかりとつきとめて。娘はとってもつらい思いをしています。ぜったい予防接種のせいだと思う。時期的にいっても！
394	子宮頸ガンワクチンは使用禁止するべきだ。
395	子宮頸がんワクチンは使用禁止すべきだ。
396	子宮頸がんの予防接種は、副反応について適切な情報が得られないので接種をさせる予定はありません。今後の調査結果等を冷静に対応したいと思います。
397	公費化する以前から海外での副作用例で重いものがあつたようなので、様子見をしていたところの中止でした。今後、他の予防接種も含めて、安全性とリスクとの慎重な判断をお願いしたいです。(保護者より)
398	子宮頸がんのワクチンは打たないと決めている。副作用の報道を見たから。
399	子宮頸がんのワクチンが怖くて接種させられません。
400	アトピー等アレルギーが有り、予防接種は検査したら受けることが出来ませんでした。今、にんしん中。子宮頸がんの検査をしましたが大丈夫でした。
401	子宮頸がんワクチンは、名古屋市が無料になったと聞いて受けさせようと思いましたが、受ける前に、ニュースでワクチンを受けた方に副作用が出た方がいるとの事を聞いて怖くなりやめました。今後も今の状態では受けさせないです。(母)
402	子宮頸がんワクチンは以前より副作用が強いと聞いていました。家庭における純潔教育が整っていれば、必要のないワクチンであると思います。国の税金を必要な所で使って欲しいです！
403	娘は、次の命を産み育てていって欲しいと思ひ大切に育ててきました。どうかその気持ちをわかっていただきたいです。
404	いとこがワクチンを受けてから、発疹、肩が痛い、うでが痛い等、今思えば、何か影響があつたかも？という事があり、こわくて子供にはワクチンを受たせなかつた。(いとこは現在17才。1年～半年症状が続いた)。病院に行っても原因不明、ストレスと言われた。現在は症状なく元気ではあるが…
405	子宮頸がんワクチン予防接種は、副作用の報道が多いので受けていません。その場合の処置など、何も言われていないので、今後どうしたらいいのかを公表してほしいです。

406	副作用がこわいので接種の予定は今後ありません。安全が確認されれば検討します。
407	娘が小児科の先生に接種を強くすすめられました。副作用が心配で接種させませんでした。受けてなくて本当によかったと思います。もし接種して副作用が出ていたかと思うとゾッとします。娘の一生を台無しにされた方を、本当にお気の毒だと思います。予防接種に限らず●の言いなりにならず、もっと国民の健康・命のことを考えてほしいと思います。
408	そもそも最初は接種させるつもりでした。サーバリックスかガーダシルを選ぶために調べました。もしもサーバリックスだけの時代でしたら調べることもなく接種していたかもしれません。けいガンワクチンについて効用を素人ながら調べましたが、けいガンの形(タイプ)が多数ある中(サーバリックスを受けても欧州に多い16、18型のみ、ガーダシルでも米国に多い52、53型のみ)にしかききめがでないようなので、それ以外の形にかかった時や、日本人に多いサーバリックスでもガーダシルでも防げない型(タイプ)にかかった時の効果のバリューと、副反応の恐しさやその確率がみあわないものだと思います。家族で相談の結果接種をみおくらせています。実現はむずかしいでしょうが、それよりも男性から原因がもたらされるのなら男性の側でウイルスをおさえられる方法を用いてほしいという意見もありました。(子供談)
409	接種させたいけど副反応が心配で接種してません。ワクチンも2種類あることも知らなかったです。どちらが安全なのか、どちらも副反応があるのか、どのような副反応なのか詳しく教えてください。
410	子宮頸がんワクチンは副作用の事を聞いて、接種をやめました。病院でも今は全く受ける人はいないと言われて…。本当は受けたい気持ちもありますが、どうしたらよいかわからないままです。国からもう少し情報や指針があればいいと思います。
411	TVなどで接種した人の後遺症を見ていると、恐くてとても接種する気になれません。
412	子宮頸がんワクチンを導入することになった時に本当に大丈夫なのか？とても不信感を持ちました。主治医に相談に行きましたが国が許可している点やがん予防できるワクチンの素ばらしさを説明されました。何となく納得が行かず、自分自身に置きかえて考えても子宮頸がん検診を30代より受けているので、それで良いのではと思ひ娘の接種は見送りました。その後、副作用のニュースを聞いて学校にも行くことができない子もいらっしゃるの。一番楽しいはずの青春時代をたった1～2度の注射で奪われてしまうのは本当に悲しいことです。親御さんの気持ちを思うといたたまれません。今後はもっと時間をかけて本当に安全性に問題のないものだけを取り入れて下さい。
413	子宮頸がんワクチンの効果が最長8年しか確認されていないものをなぜ摂取するのか！！？不妊症になる確率が高くなるものをなぜ大切な成長期にうたなければいけないのか！！あなたたちは、大切な子供達の人生を台無しにするおつもりですか！！海外の国とどんなとりひきをして子宮頸がんワクチンの接種を推奨されたのですか！！子供達の未来とひきかえに！！
414	報道にて、副反応についての事で心配になり現在、接種を見合わせている所存です。親としては、少しでもがんのリスクを下げたいと思いますが…。今の状況では安心して接種する事にとっても踏み切れません。
415	子宮頸がんワクチンを接種しなかった理由。副反応の報道をみて心配になったから。
416	子宮頸がんワクチンを接種しようと思ひました一週間前に他の同級生が接種後、体調くずしている様子をうかがい接種を取り止めました。取り止めて本当に良かったと思っております。娘が子宮頸がんワクチンは、殺人ワクチンだとうわさになっている事も聞きびっくり致しました。
417	子宮頸ガンワクチンについて一国で接種が始まった初年度に対象となりました(娘が)。海外での症例など調べた所、不妊等の原因の1つという情報があったため接種をしないことを決めました。周囲では、無料なんだから打つという子供が多かったのがとても気になりました。将来、もし不妊になった時、原因の1つとして考えられることがワクチンだということを考えてしまうと、親として、とりかえしのきかないことをしてしまったと思うと考えました。接種された方も、こんなに不安のあるものだと思ひ知らなかった。今何もなくとも将来が不安という親がいます。関東ですがワクチンの後、知りあいの娘さんが、今だにはいずって生活しています。気のどくでなりません。
418	子宮頸がんワクチンにつきまして、かかりつけの小児科の看護師さんに、2種類のうちどちらかよいかお尋ねし、保護者が、その有効性(すべてのウイルスに効果的ではない)とともに選択を悩んでいる中、その副作用が問題となりました。看護師(ベテランの方)さんも、自分のご意見として承認が早い、「サーバリックス」の方が、副作用報告が少しでもわかっているのが安心ではないかと言ってみえました。副作用のある方の、未永い救済とともに、原因の解明の程どうぞよろしくお願い申し上げます。乱筆すみませんでした。
419	日本脳炎を受けたらほっしんがでてぜんそくになった。接種は新薬だから受けたくない。
420	予防接種は新薬です。日本脳炎を受けたらほっしんがでてぜんそくになりました。
421	子宮頸ガンワクチンは接種を見送ろうと考えています。
422	副作用の話を聞き、アレルギー一体しつでもある為、接種を止めた。
423	子宮頸がんワクチンの案内を送付されましたが、接種による副作用の例を知り、母親の判断で接種を見送りました。
424	副作用の原因がはっきりするまで子宮頸がんワクチンは接種させません。
425	副作用がこわくて、出来ない。

426	周りの意見に流されず、正しい知識をもってよかったと思います。予防接種イコール正しい物、誤りのないものというふうに思っていました、100%正しいことはいわゆる接種することをやめました。がんのリスクもこわいですが、今大切な娘を苦しめるようになることはできませんので。
427	子宮頸がんワクチン未接種です。副作用が心配なため、接種を見合わせています。安全なワクチンの提供をお願いしたいと思います。
428	子宮頸がんワクチンの安全が世の中で認められたら接種したいが…
429	あれだけ重症な被害者がでていのに、いまだに接種をやめないことが理解できない。
430	まだ子宮頸がんワクチンをどうしようか迷っています。
431	子宮頸がんワクチンは副作用が出ると知識があった人達は接種していないので、もっとはやく中止するべきだったと思います。医者や娘さんに自分の娘は接種させないと聞き、副作用のことをネットで調べ接種することをやめました。正しい情報を知りたいと思います。
432	子宮けいがんワクチンには反対です。●で、ためしてないものを、日本の女子にうつのはどうかしてませんか？ 実さいに打って、歩けない子を見ました。前日までふつうの子だったのに…。やめて下さい！！
433	子宮頸がんが怖い病気であることは認識していますが、TVなどでなぞの副反応が出ている事例を見ると、こわくて接種できない。今もできていない。どうすれば良いのかわからない。
434	日本脳炎の予防接種も病院に行ったら接種時期が延期になったと言われた事があるような…。接種はなしに印をつけましたが母子手帳の「日本脳炎第1期初回第1回目」の半切れがあります。2回や3回に分けて接種するものは途中で中止になる場合が多かったと思います。(風しんも予定の日には書いてあるがワクチンシールがはっていないのは病院で中止を言われたものかと思われます。)子宮けいがんのワクチンについては部活(運動部)があったためワクチンをどちらにするか決めていたところに問題がおきたため無理に接種するのはやめました。親としては接種しろとは言えません。
435	調査結果がでたら必ずその回答結果を公表してください。見落としてました…。ありがとうございます。必ず見ます。
436	子宮頸ガンワクチンはできれば接種させたいと思っていますが、身近にもいらっしゃいますが多くの副作用に悩んでいる方がいると思うとそのリスクを負ってまで、将来かかるかわからないがんのために現在犠牲をはらわせることはできません。予防に関してもそうですが、実際障害者になってしまった方にもきっちり保障を考えてあげるべきだと思います。(重要)自分の子供がそうになったらどうするかをよく考えてください。お願いします。
437	子宮頸がんワクチンの接種がはじまったすぐから、外国では危険なワクチンとしてさわがれていたワクチンで、とって危険でまだどの様な害があるかわかっていない様なおそろしいワクチンなのに名古屋市はすぐに無料にして、「危険なものでもう少し調べて下さい！」という手紙を●の●のポストに入れておきましたがだれも調べなかった様ですね。学校へ保健所の方が来てみんなに打つように進めて、まったくひどい話だと思います。あんなに大量のアルミニウムが入っているワクチンなんて安全なわけじゃないじゃないですか！！赤ちゃんのワクチンも危険なので、強制的にすすめる事はやめて下さい。特にB型肝炎のワクチンも危険なのにわざわざ無料化にしないで下さい。ワクチンを無理に進めないで下さい。
438	子宮頸がんワクチンの副作用らしきものと、ワクチンによってえられる免疫等のメリットとのどちらが重要なかが、わからない。ワクチン以外での予防法もあるのではないだろうか？ 性交により感染するのであれば低年齢での性交をよしとしているのではないか？ また女子のみに感染予防をいっているのではなく、男子にもそれなりの教育などをしていくべきではないのか？
439	子宮頸がんのワクチンは、安全性がきちんと発表されるまで、がんへの効果があるとされていて副作用がこわいので接種させたくありません。
440	19才の娘の保護者です。0才～15才までに接種しなければならないワクチンについて質問する意味がわかりません。子宮頸がんワクチンについての副反応についての調査なのにどうしてでしょうか。また0才児の時に接種したものは保護者でなければわからないと思うのですが、“わからない”を記入してどういう意味があるのかよくわからない質問かと思えます。
441	保護者です。あの頃副作用についてほとんど説明が無かったのでネットで調べてみたところ少数であっても欧米では死者も出ていると知り怖くなって止めました。止めた事も正直健康に関わる事なので迷いましたが、ワクチンで健康被害が出たとニュースで知った時は止めて正解だったと思いました。副作用についてきちんと国から説明があったなら被害もある程度防げたのではないかと思います。被害にあわれた娘さん達の一日も早い回復をお祈りいたします。
442	6年生までにジフテリア破傷風混合、日本脳炎のワクチンを終えています。副作用が出ている子宮頸がんワクチンは心配なので受けていません。
443	子宮頸ガンワクチンは接種させません。問題が多すぎる。●を観たので全くうける気がしません。
444	薬の副作用をTVで観て、接種するか迷っている。

445	頸がんワクチンは余りにリスクが大きく全面中止が妥当です。添加物のアルミニウム、ホルマリン等のリスク。それ以前に遺伝子組換えワクチンです。遺伝子治療が、ことごとく治癒後がんになる。という臨床結果もあります。娘には遺伝子組換えワクチンと言うだけで絶対に打たせたくない。と考えました。その後、調べれば調べる程絶対に製造もしてはいけません。何しろ。打っても4~7割のウイルスにしか、効果がないのですから。残りのウイルスに感染した場合発がんプロモータになる可能性さえあります。インフルエンザも効果がないのに打っているし、とにかく利益最優先の恐ろしいワクチン。今すぐ製造中止をお願い致します。ついでに、インフルエンザも。最後に。利権のために、なんの罪もない少女達の未来が奪われてしまったことに、悲しみを禁じえません。良かれと思って接種されただけに、お気の毒でなりません。一日も早い回復を願っています。名古屋市さんは素晴らしい行政なので少女達へのお力添え宜しくお願い致します。
446	新予防接種はデータが出るまですぐには受けないようにしています。怖いので…
447	子宮頸がんワクチンは必要ない。副作用のリスクが高すぎる。
448	子宮頸がんワクチンを打たせたい気持ちと、ニュース等で副作用を訴える症状の女の子達の姿からためらう気持ちとで迷っています。
449	予防接種による副反応がこわくて接種しないままです。しかし、産婦人科で副反応がおこるのはごく一部なので接種をすすめられました。ごく一部というのがどの程度なのか、不安なままでは、接種にふみきれません。
450	接種による副反応が心配で接種していません。子宮頸がんて亡くなる方が多い中で接種をしたほうがいいのかとも思いますが、副反応のことを思うと、思いとどまってしまう。もっと安心して接種できるようなデータ、もしくは新しいワクチンについて知らせて欲しいです。
451	子宮頸がんワクチンは、医者と製薬会社の金もうけと言われる薬剤師もいる。不信感がある。
452	子宮頸がんワクチンの副作用について海外では当時重症化するケースもあり不安もあったため医師に相談。うつことをすすめられたが、歴史も浅いため、周囲の同級生は無料のうちうっている子も多かったが、我が子はうたないことに決めた。
453	子宮頸がんワクチンは副作用が怖くて接種できませんでした。
454	上の娘(現大学3年)の時は、無料接種がはじまったばかりで、その流れにのってあまり考えずに接種してしまいました。幸いたいた副反応はでませんでした。その後の様々な報道を目にするにつれ、娘にも同じ様なことが起こっていたかもしれないと思うと、とてもこわくなりました。しばらくして、下の娘にも接種券が送られてきましたが、今の状況ではとても受けさせる気になりません。1日もはやく調査が進み、何らかの施針がでることを期待しております。
455	安全なワクチンであればすぐにでも接種させたいです。
456	副作用はないのですか。あるのなら心配なので接種するのはこわいです。
457	子宮頸がんワクチンは打って良いという結果を聞かないので、副作用が強く怖くて、予防接種を受ける気もありません。
458	(20才の娘の母親より)娘がワクチンを打たなかった理由は、長男が「ネットでワクチンを接種した女の子が、今言われている症状が出て、大変な事になっている」と言い、絶対にうってはいけません！！と強く言ったからです。国・県・市等が認める時には、ネットも含め十分調査をしてほしいと思います。安全が確認できるまでは直ちに中止すべきです！！
459	子宮頸がんのワクチンをすすめられた時に、新種のワクチンでもあって、少し不安でした。家系にがんの発症例もなかったこともあって、子供に子宮頸がんワクチンの接種をさせてません。副反応の報道などを見て、接種しなくて良かったと思う。
460	●で受ける前日にワクチン自体が中止になったため。
461	我が家では子宮がんのワクチンを接種しませんでした。まわりの子達はほとんど接種した様ですが、痛がったり、腫れたりしてたのを耳にしたので親子で話してあえて未接種にしました。幸い重い副作用の子はいなかったようですが、ワクチンよりも、20歳を過ぎたら会社や学校など無料で気軽に定期検診に行けるような制度ができることを望みます。
462	子宮頸がんワクチンは接種させたいと思ってましたが、副作用の報道を見て心配になり見送りました。
463	子宮頸がんワクチンについて医師に相談した時に筋肉注射だと説明を受けました。日頃スポーツをしていたので接種する時期を考えていて結局接種はしていませんでした。もっと安全性が確立されてから接種をしたいと思います。今の段階では予防接種は考えられません。
464	子宮けいがんのワクチンは受けさせたくないと思いました。以前、テレビで副作用で日常生活に困難がみられる方の番組です。もちろん、けいがんにもかかってほしくないのですが、悩むところですが…。正直不安でワクチン接種は見合わせてます。大切なのは、わかっていますが…。
465	副反応が心配なので今後も予定していません
466	副作用がこわくて受けていません。本人の意志にまかせようと思っています。
467	子宮頸がんワクチンは、いろいろ安全か確かめられてから、自費でもいいから受けるつもりです。
468	HPVが原因とわかっているなら、HPVを保有している人の治療、予防法はないのでしょうか？(保護者)

469	昔の時代に比べ、予防接種の数が増えていることに不安をおぼえる。ワクチンに対しての人間の反応は、1人1人違うと考えるため、できれば最少限のものにとどめたいと思います。
470	子宮頸がんワクチンはなぜ2種類あるのですか？個人でどちらか選択して下さいと言われてどちらが良いか迷っている間に、問題が起り結局接種しませんでした。子どもの将来を考えると、がんのリスクを少しでも下げる為に接種した方が良いと思いますので安全なワクチンを用意して下さい。
471	個人的な考えですが、子宮頸がんはウイルスに因るので、性交経験がなければ何も心配する事はないという点からワクチン接種に関しては否定的な考えを持っておりました。但しウイルスは男性側に原因があります。将来好きな人が出来て、結婚した相手との運も有ります。娘とは、その点を話し合い接種を止めましたが、数々の報道を観て、その判断は間違っではないなかつたと安堵致して折ます。(患者さんには申し分けないです)。病気や死というのは、基本的には運命も有りますので何とも言えませんが、うちの娘の様にアトピーでなかなか接種ができない子もいます。打てる予防接種、打てない接種含めて元気な子もいれば、罹患して病気と戦う事も運命だと思ひます。
472	子宮頸がんワクチンの副作用がこわくて受けていません。
473	子宮頸がんの予防接種についてはニュースなどで様々な症状が副反応として出ている様な事を知り、心配もあり、今のところ接種をしていません。現在ではメディアなどからもその後の情報を知る機会が少なく、しばらくは頭から離れていました。今回こういったアンケートを記入しながら、いまだ接種勧奨されていないという事はやはり何らかの因果関係があるのかとますます心配になりました。調査結果もぜひこういった形(アンケートの様に)で個別に郵送してもらった方が必ず知る事ができると思ひます。
474	子宮頸がんの副作用？で体がおかしくなつた子を見て、自分の子に打つてよいのか不安で打つことができない！
475	子宮頸がんワクチンは副作用が心配で受けていません。
476	子宮頸ガンワクチンは接種していません。完ぜんに安全が保障できない現状では受たせたくないからです。
477	最初から、副作用の可能性もゼロではないと聞いていたので、必要ないと思ひ受けなかつた。
478	娘にはワクチン接種を受けさせませんでした。時期がきたら接種させようと思ひインターネットで調べた所、当時でも海外での記憶、歩行障害などの副作用の事が紹介され、日本の学者の人たちの副作用の危険を指摘する意見もありました。いろいろと考へてメリットよりも副作用の危険が大きいと思ひ、接種は見送りました。しかし、その後、マスコミでたびたびワクチンの有効性が取り上げられ、ワクチンを接種しない方がおかしいというような意見を聞かされた時に心がゆれ動き、法定接種になったら受けさせようかなどと思ひていました。日本での副作用に苦しんでいる子供たちの報道を見るたびに胸が痛みます。あれは自分の娘の姿だったかもしれないと思ひます。心因性のものであるような障害になることはありえないと思ひます。行政はワクチン接種を推進してきた責任を重く受け取め、副作用に苦しんでいる人たちに手厚い救済の手を差し伸べてあげて欲しいと思ひます。
479	副作用
480	副作用がこわいので、子宮頸がんワクチンは受けていません。
481	ワクチン接種に疑問を抱きます。
482	対応が遅い。副作用を訴えている人に対して誠実に対応すればすむ話。日本が混乱するほどの人数ですか？
483	副作用の報道で心配になつたので接種しませんでした。
484	日本脳炎や子宮頸がんのワクチンは中止されたり自己責任(保護者の判断)となつたがその後の方針や指導等がないので不安である。専門知識のない保護者の判断に委ねるのではなく、専門科による判断と国・名古屋市による明確な指導を望んでいる。
485	副作用の報道を見て心配になりました。
486	子宮頸がんワクチンのニュースを見て、ワクチン接種を中止しました。日本脳炎の時もそうでしたが、不安になります。薬害などのニュースも、もし自分がそうなつたら…と不安になります。
487	ジフテリア、百日せき、破傷風は、H12.12,H13.1,H13.3,及び第1期追加接種としてH14.6に打つています。麻しんは2回、日本脳炎は、H15.5,H15.6,H16.7に打つています。さらに第2期H21.10さらにH24.8に打つています。それらの情報をアンケート用紙に上手く記入できたのか？不安でした。
488	子宮頸がんワクチンで苦しんでいる子供達を行政担当者は、真剣に逃げずに救つてください！！
489	H25の3月に、子宮頸がんワクチンを娘に接種させようと、予約を入れてあつたのですが、接種予定日の数日前に初めて新聞で副反応が出るかもしれないという記事を読み、直前でキャンセルしました。副反応の原因が早くはつきりするといひですね。
490	子宮頸がんワクチンを接種したいとは思ひません。がんに対しての効果はあるかもしれませんが、副作用の心配があります。
491	平成23年から不登校で心療内科に通院しており、体調不良のため子宮頸がんワクチンは受けていません。統合失調症の薬を服用しています。
492	接種するか、まよいます。どうしたらよいでしょう。

493	結局、このワクチンは、薬品業者が儲かるためのものであり効果は期待出来ません。期待出来ないどころか、副作用の影響が高く、良いことは1つもありません。オレオレ詐欺でしたら、金を失うだけですが、このワクチンは、健康を失います。インフルエンザワクチンについても全く効果はなく、逆にインフルエンザになりやすくなるものです。では、どうしてこのような害になるものを政府は勧めるのでしょうか。それは、利権が絡むからです。今回も●の議員の夫が薬品会社関係者である事もわかっています。AIDS問題や、最近の高血圧剤の事件のように要は患者は、どうなってもいいのです。天下り先の確保、関係者も自分達が潤えばいいのです。もう、常識となっていますが、これを読まれた方が参考になればと思い、書かせて頂きます。インフルエンザワクチンは、なぜ全く効果がないかですが、ウイルスでも変形するタイプとしないタイプがあります。しないタイプのワクチンは、有効ですが、インフルは変形します。薬品会社は、この形になるだろうと予測して、卵を使って培養します。半年以上前かに予測して作ったワクチンが、変形したワクチンに一致する事はありません。では、効目がないという事を医者も知っていて、何故するのでしょうか。それは、予防接種を1人すると数千円の収入が医者に入る為黙認しているのです。私の会社でもワクチンをした人に限って、インフルで休んでいます。何故かというワクチンを接種すると逆に体が無防備の状態となり、抵抗力がなくなるのです。昔は、みんなだまされていました。現在は、素人でもインターネットで調べる事が出来ます。日本の医療制度では、開業医一日60人の患者をみないと採算あわず多忙を極め、最新の医療知識は乏しいです。たまに病院に行く私の方が、詳しいケースが多いです。連日医療費増大いわれていますが、こんなの調査するまでないでしょう。
494	子宮頸がんワクチン接種を考えている時に、副反応の情報が報道され子どもと相談し、ワクチン接種を見送りました。又日本脳炎も3回目を接種しようとしたら副反応の報道があり、2回までしか接種していません。
495	娘のためにとワクチン接種を予定していましたが副作用のリスクが高く感じ未接種のままです。女性の体を守るためには必要な重要なワクチンだと思っています。副作用の少ないワクチンの開発を強く求めます。
496	子宮頸がんワクチンに関しては当初接種するつもりでおりましたが、ニュースなどで副作用などとりだたされておられ接種する不安がつのり接種自体見合わせているところです。
497	子宮けいがんワクチンの期限が切れてワクチンは受けていないが、4歳下の妹とはワクチンを受けた(2回)で3回目の時に報道があったので止めた(18才)
498	現時点で子宮頸がんワクチン接種を見合わせている状況ですが、早く副作用がなくなる安心な新ワクチンが出来ないか、心待ちしています。がんリスクが少しでもなくなるのであれば早急にワクチン改竄して頂きたいです。
499	早い段階で、海外での死亡例や失神などの情報があったのでしばらく様子をみてからと思い、接種を見送っていました。
500	子供に子宮頸がんワクチン接種をさせたいと思っているのですが、報道で副作用のことを知り、まだ、一度も接種させていません。どの様にするのが最善なのか、早く知りたいと思っています。
501	安全性が確認されたら、接種させたいと思う。(母)
502	自分はまだ子宮頸がんワクチンを受けていないのですが、やはり受ったほうがいいのかがよく分かりません。ワクチンの副作用が気になるので、まだうってはいません。母
503	副反応の報道が出る前に、ネットでワクチンの副反応の注意書きが見れたので初めから接種するつもりはありませんでした。外国のワクチンを日本人に人体実験されるみたいでとても不愉快です。
504	●です。娘のワクチン接種は予定していましたが、直前に接種による事故報道がなされ、接種を中止しました。運が良かったとさえ思っています。国の調査会は、体の不調は心身の問題、と言っていますが、明らかに、接種が原因でしょう。国と製薬会社のからみがあるのの解答でしょう。早期に事故にあわれた娘さん。ご家族に、保障を上げてください。これは公害問題と同じですよ！
505	調査頑張ってください！このアンケートが有効に活用されることを願っています！
506	子宮頸がんは検診で防ぐことができると聞いています。安全性に不安があるのならば接種の推奨は控えるべきだと思います。いくら副作用の救済制度があっても、そこで人生の夢は断たれてしまいます。
507	副作用の原因が分からないうちは接種予定なし。(今後)
508	副作用が恐ろしいので接種はしません。複数の異性との接触がなければ発症の危険性が無いようなので予防接種をすすめるより倫理教育を強化した方が良いと思います。
509	ワクチン接種は、必要最小限にしています。入学(小学校)前接種のみワクチン接種の副作用にして存じております。任意にすべきだと思います。全てのワクチン接種に関して任意を求めます。接種後不自由になられた方が気の毒だけでは済まされない筈です。
510	予防接種を受けるか受けないか、親が判断するのは難しい。副作用を考えると、必要なだけ受けさせたい。なかなか信頼できる医りょう機関もない。国を信用できない。
511	はっきりした安全がない限り接種は、考えられません！安全な事をはっきりさせて下さい。
512	子宮頸がんワクチン接種しようか迷っています。

513	子宮頸がんは、問題があるとの事で、接種していません。何もなく育てている子供にワクチンにより障害が出て、学業はもちろん、社会に出ることが出来なくなったお子さんもいるとの事各報道をみて知り、とても怖くなりました。また、障害が出て、ワクチンによるものか因果関係がわからないと、補償されていないとも報道されていて、ワクチンを接種する気持ちがなくなりました。
514	子宮頸がんワクチンは、この先も接種させるつもりはないです。
515	判断するのに本当に困ります。
516	性交渉を経験したこともないような10才くらいの年齢から、さも良いことのようにワクチン接種を推奨されても、保護者として何が本当に良いことなのか不明な点が多過ぎると思います。周囲では小学生のうちにワクチンを接種された家庭もありましたが、私は自分なりに勉強をしてあえて娘には接種を選びませんでした。その時点では現在ほど副作用について報道されていませんでしたが、ワクチン接種ありきでは無く、原因・予防・検診についてもっと家庭でも学校でも(保護者も本人も)きちんと勉強して理解を深めることの方が重要だと思います。
517	子宮頸がんワクチン接種について副作用で苦しんでいる方がいるのをニュース等で知り、ワクチン接種に低抗があります。
518	子宮頸がんワクチン無料接種が始まった時には、すでに、ネットに副反応のこととかたくさん出てました。接種推しよする前に本当に安全なものかきちんと調査したのか疑問です。
519	子宮頸がんワクチンを受けさせたかったが、副反応の報道を見て、予約をとりけした。今でもそれが正しいかどうかかわからない。
520	副反応もおきず、予防することのできるワクチンができることを望みます。
521	私はサーバリックス、ガーダシル共に海外で重篤な副反応が出ているのを知っていましたので、娘に聞かれても接種させませんでした。これを打ったからといって絶対に子宮頸がんにならないという保証はありません。製薬会社のデータを丸ごと信じてよく検討もせず無償化に踏み切ったのは間違いです。役所から連絡が来ると義務のように感じてしまう人が多いのです。万が一、副反応が出て大変なことになっても因果関係の証明はものすごく難しいのです。被害に遭われた方にこれからの生活の支援をして上げてください。
522	子宮頸がんワクチンを接種したら必ずがんにならないのですか？ならないのであれば是非接種したいです。
523	子宮頸がんワクチンは絶対に受けさせません。必要ありません。毎年、定期的に検査(検診)を受ければ、ほとんど防ぐことが出来ると思います。私自身50代ですが、子宮頸がんにはなっていません。そのワクチンを接種した為に、様々な副反応で苦しんでいる若い女の子(女性)達が気の毒でなりません。周りの、10代の女の子をお持ちのお母さん達にも、受けさせてはいけないと伝えています。母
524	現在高1、中学の時、学校でパンフレットを頂いたので、接種するべきとの認識でした。平成24年日本脳炎等接種の後どちらのワクチンにするか調べていた頃、このワクチンが原因で？の報道を広く見る事になり、不安になり、娘と相談し接種をやめました。中学までは医療費無料でしたので、たいへん有難く思います。現在は、医療を負担し、最近6,000円程の支払いで出費が増えました。このワクチンが原因かもしれず、調査中かもしれませんが、つらい思いをしている母娘がいると思うととても心が痛みます。精神的に、経済的に援助出来る機関が早く整いますように。9月30日までの返送でしたので、いそぐことなく遅くなり失礼しました。アンケートが生かされて皆さんがすごしやすい環境でありますように深く願います。どうぞよろしくお願ひ致します。
525	もう少しすっきりと答えやすいアンケートにした方が回答率が上がるのではないかと思います。特にワクチン接種を受けた時期など答えにくかったです。
526	子宮頸がんワクチンは副作用が恐ろしくて、受けさせられない。
527	子宮頸がんワクチンは安全性に疑いがあったため、接種していません。(副反応の話聞くようになる前から)子宮頸がんになるリスクより接種した場合の副反応のリスクの方が大きいと感じます。
528	子宮頸がん予防接種に不安があります。予防接種で予防できるなら打ちたいが、打った事で後悔することになるのも不安です。安全性は絶対あるのでしょうか？
529	子宮頸がんワクチンは、接種した人が皆すごく痛かったと言っていたので、本人が嫌がっていて、接種しようか迷っているうちに問題(副作用の)が出てきたので、接種しなくて良かったと思っています。
530	中1の時、クラスの友達が受けたら、受けた後、吐き気と痛み(腹)、立ってられなくなった(1回のみでやめた)病院で休んで帰ったときいたり、みんな注射が痛いと言っていたので怖くて受ちたくなかった。
531	子宮頸がんも心配ですが、副反応問題に一定の道すじが出来ないと、やはりこわくて予防接種を受けさせられません。調査の結果の取りまとめだけでも大変かと思いますがどうぞよろしくお願ひ致します。
532	副作用がこわくて、受けていません。予防接種が、どんどん増える事がこわいです。大切な子供達だからこそ、もっと考えてください!!
533	子宮頸がんワクチン予防接種は、本当にいさみ足でした。リスクをきちんと説明すべきです。

534	本人が高校生の時、名古屋市は無料で子宮頸ガンワクチンを接種できるとお知らせを受け、一度は住まいの近くの婦人科をたずねましたが、ワクチンが無いと断られ、結局無料のワクチン接種は受けずじまい。その後、後遺症が出たお子さんが少なからずいらしゃるとニュースで見て「こわい!!」と思いました。今、親である私が49才～子宮頸ガン検診でひっきり以来3ヵ月ごとに婦人科での検査を続けており1年半程になります。定期的な検査の方が安全という点から見ればより良いのでしょうか。
535	平成2年、平成10年生まれの子が2人いますが、子宮頸がんワクチンを打たせなかった事を、安心しております。早く、副作用にかかった人達の補助を確立してください！
536	子宮頸がんワクチンにつきましては、予め、インターネットでの情報で気になる内容(まさに、今回の質問2の項目にある症状を訴える方々のツイッターでした。)を目にしたため周りのお友達が次々に受けていく中、我が家だけ受けない事に不安を感じながらも、受けさせなかった次第です。普段、そのような情報の真偽を疑っていますが、それらをうまく利用し、自分で決定し、責任を持つことの重要性を感じます。
537	ワクチンを受けるか、受けないか3年考えています。日本脳炎も同様です。どうしたものでしょうか？
538	平成12年生まれですが、日本脳炎第1期追加接種がなくなったと思います。その後、第2期接種用(20才までに)というものが届いています。子宮頸がんは接種したいと思っています。
539	どのようなワクチンも今後受けさせるつもりはない。何が入っているかわからないものを健康な子供にわざわざ接種させたくない。
540	今後ワクチンを接種させるつもりはない。正直言って国は信用できない。インターネットで情報を入れて、親が真剣に考えることだと思う。副反応の子供達の事を思うと本当に心が痛む。
541	疑わしいことがある限り、接種を中止してほしいと思います。何十万何百万人に一人の副反応でも、親としては、心配です。子宮頸がんのウイルスの一部に対しての効果しかないことを知らない保護者の方、重篤な副反応が出ることを知らない方がたくさんいらしゃいます。どうか、安全かどうか、じっくり検討していただきたいです。決して急いで結論を出さないでくださいお願いします。
542	接種を受ける前に副作用の報道を見て打つのを止めました…現在もそのワクチンが安全なのか打てるのか分からず病院でたずねた所、ガンになりやすい細胞の種類は13個近く有りその中の2つに対してのワクチンと聞きました。それ以外のウイルスには効かない様なら(インフルエンザ)と同じで型が違ったら何のためのワクチンかと…予防の為に分かってはいますが副作用のこわさを知ったら迷います。それなら若い時期から定期的検査を受けさせようと思います。
543	子宮けいがんワクチン、日本脳炎は新しいワクチンなので接種を見合わせていました。様子を見ていた間に報道などがあり接種させなくて本当に良かったと思いました。自分の身は自分で守らなければなりません。国は信用できません。
544	子宮頸がんの予防接種は受けたいと思います。でも後遺症は怖いです。安全なワクチンを接種したいです。
545	接種の予定をたてていましたが、副反応があるとの報道を受け、自分たちなりに情報を集めて接種を見送りました。娘のクラスに副反応が原因(?)で学校に来られない子がいます。今後も接種するつもりはありません。どうか苦しんでいる子どもたちを救ってください。
546	調査をすすめて頂き早く回答を頂きたいです。子宮頸がん接種は今迷っております。
547	子宮頸がんの接種について、受けるべきかどうかはっきりと示して下さい。受けない場合にどれだけのリスクがあるかどうか…。その他の予防接種についても同様だとは思いますが、実際、一部のものは、かかった人はめったに聞きませんので必要性がどの程度かは不明です。又、仮に接種をしなかった場合で病気になった時治療することが無理だったり、困難なことがあるのでしょうか。
548	4才年上の姉は子宮頸がんの予防接種を受けましたが、(副作用なし)副反応の報道を見て、当人は予防接種を見合わせています。自分(親)も含めて、周囲も「接種するのは(副反応が)不安。しないのも(ガンが)不安。」という状態です。
549	子宮頸がん(ガーダシル)ワクチン2回注射しました。子宮頸がんなる確率有りますか！
550	最初報道でワクチンができたとき聞いた時、母に「今はモルモット段階だからやめておけ」と言われ、その後副作用で辛い思いをしている人たちをみたとき、しなくて良かったと思った。もしかしたら今のように結婚できなかったかもしれない事、妊娠できなかったかもしれない事を考えると本当に最後まで行くくらいがベストだと思いました。
551	子宮頸がんが確実に予防できる訳ではないので、予防接種ではなく、20才から子宮がんと共に2つの検査をするように、呼びかけた方が、良いと思います。
552	このアンケートの質問のし方が子宮頸がん予防接種と関係?があるとは思えない。この調査は何の目的ですか
553	子宮頸がんのワクチンを接種したいと考えていましたが色々問題が起こるので、今は、考え中です。この先、安全であるとわかれば良いのですが、どうなるのでしょうか？
554	子宮頸がんワクチンはしません。子宮頸がんになるより、ワクチンを受けて副作用を受ける確率の方が高いのではないですか。子宮頸がんワクチンを受けて、子宮頸がんにならないという確率も保証できません。日本人と米国とは違います。ここにお金を使うよりも、もっと必要とするところへ使ってください。
555	姉は3回ワクチン接種し、注射が痛かったこと、副反応の心配があり、下の娘は見合わせた。

556	子宮頸がんワクチン接種を反対します
557	子宮頸がんワクチンは、させません
558	受けたほうがいいのかわからない。副作用が心配で受けられない。
559	副反応の事例と予防接種との因果関係が分かればうけたい。それまでは不安です。
560	アンケート回答者に●とか配ってほしいです。
561	早期に安全な子宮頸がん予防接種を受けさせたいと考えています。どうかこのアンケートがお役に立ちます様に。
562	子宮頸がんワクチンについては、接種をかなり迷いました。副作用の報道を何度も目にしたからです。ワクチン2種類のどちらかを親に選択させるのも、「全て親の責任」という感じで怖いと思いました。判断材料も示されていませんでしたし。今回のアンケート実施は評価します。結果を興味深く拝見したいと思います。
563	子宮頸がんワクチンは、ひどい副作用の実態があるので、やるべきではないと思います。
564	姉2人は接種しましたが、不安でできません。でも中には先生に聞くと接種したほうがいいですといわれます。
565	インフルエンザワクチン接種にて、腕が異常に腫れるため、テレビの放送を見て、万が一を考えて子宮接種を諦めました。
566	無料のうちに受けようと思っていたら、いろんなこと勉強している人から、子宮頸がんのワクチンを受けると将来、妊娠できなくなるよと聞いて、迷っているうちに副作用の問題がでてきて、受けなくてよかったと思いました。なんの根拠でこのようなうわさが出たのかわかりませんが、しっかり調べてほしいと思います。
567	副反応がこわくて本人が拒否しています。長女は、副作用の事を知らず子宮頸がんワクチンを終了しています。姉妹でも受けている子と受けていない子がいる事に親は不安を感じています。将来の事を考えれば接種させたいと思います。アンケートの結果をしっかりとねて有意義に使う結論をだして欲しいです。
568	子宮頸がんの公費負担が終わってしまう前に受けたかったのですが、副作用のことを考えると見送るしかありません。姉2人は受けてなんともなかったのですが、テレビなど報道を見て本人も怖がっているの、がんになることリスクと天秤にかけてもやはり無理に受けさせられません。
569	ワクチンで予防する事よりも、定期健診を受ける事や若いうちから、不特定多数の異性と性的な関係を持つ事の愚かさをしっかりと啓蒙して行くべきだと思うます。延いては、それが一番の予防になると考えています。逆を言えば、ワクチンを受けているので大丈夫だと思い、みだりに安易に性交渉を助長しかねない。このワクチンが登場した当初よりそのように思っておりました。この様なワクチンは推奨されるべきではありません。
570	子宮頸がんワクチンは、必要な接種ワクチンと思っていますが、安全が確認できないと接種するのは不安です。
571	子宮頸がんワクチンは副作用が怖すぎて、受けさせられませんが、近くの病院でも接種しないと聞われました。(接種をすすめられない)
572	子宮頸がんワクチンが始まった時、まわりの母親達は「いつ接種させようかな」と、接種を当然のように話していました。皆、子どもをガンから守りたいと願う、一途な思いのためです。私も子どもの健康を願う気持ちは同じです。が、同時に新しいワクチンへの副作用も良く知らないまま、我が子に接種させるのもいやでした。今、子宮頸がんワクチンが原因とされる健康被害がマスコミで取り上げられ、我が子に接種させなくて、良かったと思っています。今回の調査を元に、ワクチンが原因で健康被害や障がいなどおこしたご家庭には、一日も早く、医療費手当など、社会をあげての支援をしていただけますよう、心よりお願い致します。また、それと同時に、新しいワクチンに対しては、完全な、安全性の確保につとめていただきたいと強くお願いを致します。子どもには、ワクチン接種ではなく、定期的な健康診断、検診をと、説明をし、理解をえております。
573	筋肉痛等の症状なら改善できますが、ケイレン、脳症もしくは脳炎その後の機能障害に対する副作用等の報告が確立するまで、安心して接種できません。副作用発生の報告及び可逆、不可逆的な変化の報告をお願いします。その他●以外に対する効果の評価報告お願いいたします。副作用が作用を上回る予防接種は臨床的意義、もしくは公衆衛生上意義なし。医療費のムダ使いとなりますので御遠慮下さい。妻に頸がんワクチン接種してありますが、子供に主に副作用発生しておりますので、年齢別の副作用発生頻度、病状について発表して下さい。可能ならメカニズムお願い致します。
574	子宮頸がんワクチンは副作用がこわいので、接種するのは、迷うというか、まだ、したくありません。
575	子宮頸がんワクチンは副作用があると聞いていました。医師の意見も分かれているという情報を得ていたので、子供には、接種させませんでした。
576	今はまだ子宮頸がんワクチンは接種していませんが、がんになるリスクが少しでも軽減できるならば、接種したいと思っています。アンケート調査の結果で、接種時期を考えたいと思います。
577	特にありません。データ集計ご苦労様です。色々な因果関係がデータより明らかになって、今、苦しんでいる方のお役に立つとよいですね。

578	娘の友人が中学2年生の時に、頭の病気で4～5ヶ月学校を休みました。ちょうど子宮頸がんの予防接種をした後の出来事であったため、大変心配しましたが、現在は元気になり高校へも通っています。因果関係があるかもしれませんが、しっかりと調査お願い致します。娘は副作用の心配があるため予防接種は受けていませんでした。
579	私は報道を見て、とてもこわくなり、娘に予防接種をする事をやめました。副作用が原因だと思われる人が、たくさんいると思います。はやく認め、せめて、医療費の全額補助など、してあげてほしいです。名古屋市はさすがが違うな！と思われる対応の実現を期待しています。
580	副反応の報道を見て接種していません。今後、安全なワクチンが開発されても、無料接種は出来ないのでしょうか？
581	今回の調査は重要であると思います。これをきっかけに不必要なワクチン接種による被害がなくなるように望んでいます。我が家では、子宮頸がんワクチンについては誰が推進してきたのか、また、裏にどんな思惑があるか、どのように宣伝してきたのか、誰が関わっているのか、わかる範囲ですが調べて、国の将来を考え、知人には接種しないようにお話してきました。今現在苦しんでおられる方がいら
582	子宮頸がんワクチンの副作用が怖くて高1までに接種できませんでした。現在も悩んでいます。予防接種の次に有効な予防策を周知してもらえるとありがたいです。
583	子宮頸がんワクチンを打つより、検診の無料化に移行してほしい
584	ワクチン全般について接種するかどうかの最終的な判断を保護者にゆだねられることに非常に不安を感じます。
585	子宮頸がんワクチンですが副反応(テレビを見てこわくなってしまい)がこわくて受けて良い物なのか？悩んでおります。
586	予防接種は全廃すべきだと思います。難しいのであれば、自己責任として、被害をもっと広く伝えて下さい。「タバコ」の様に…。ましてや推奨するのはやめて下さい。
587	予防接種は全廃すべきだと思います。それが難しいなら、せめて、自由接種、強く推奨するのをやめて下さい。何かあっても責任を取らないのに、被害の広報がなすすぎます。
588	子宮頸がんワクチンを接種した方がいいのかどうか判断できません。
589	同世代の子を持つお母さんから「子宮頸がんワクチン予防接種は痛いらしい」と聞き、わが子への接種は見合せました。知的障害があり、痛みに耐えれないと考えたからです。その後、接種後に手足のまひ、記憶障害がおこったケースがあると報道で知り、ますます、見合わせる気持ちが強くなっています。
590	予防接種は廃止すべきです。自己責任というのであれば、もっと広く被害、後遺症を告知して下さい。子宮けいガンワクチンなど、すでに海外で被害が報告されていたのに、異常なほどの推奨ぶり、おかしくないですか？「ワクチン」についてもっと検証すべき、もしくは、被害を広く告知すべきです！
591	副反応が怖いので、子宮頸がんワクチンは接種させていません。
592	テレビ等ニュースで子宮頸がんワクチンの副作用を知り、発がん率を下げるメリット以上に背負うリスクの方が不安だった(自分が薬アレルギーがあるのも考えて)ので、ワクチン受けていません。年もギリギリなのでもう無理なのかもしれませんが、本当に必要、安全であれば娘の為にも受けさせたかったと今でも思っています。
593	本当は子宮頸がんワクチンを接種させようと思っていました。でもニュースで障害が出ている子がいると言うのを見て迷った結果、接種をあきらめました。子宮頸がんになる事は可能性として高くなるかも知れない、でも、まだ10代の子供に万が一でも障害が残るような事があったらと考えあきらめたのです。私以外にも同じように考えた親はたくさんいると思います。ワクチンの安全性、副作用についてもっと、考慮して公表していただきたいと思います。
594	これだけ副作用の報道がされているとなると、こわくて子宮頸がんワクチンは接種できませんでした。しかし、このままで良いのかどうか不安が募るばかりです。はっきりして欲しい。
595	接種を考えましたが、副作用の報道を見て受けていません。
596	副反応が こわいので 本人が 受けたくないといっています。
597	子宮頸がんがワクチンで予防できる様になったと聞き、さらに無料でできるということで、必ず接種つもりでしたが、テレビなどの報道で、信じられないような副作用の出た子供達が何人も現れ、耳を疑いました。全員に副作用がでるわけではないけれど、その数少ない不幸な子供になるのがこわくてとても打つことができません。もちろん子ども自身も「あんな風になったらこわいからイヤだ」といい、同じ意見の友達も何人もいます。ぜひ、さらさらに研究を重ねていただき、今とは異なった、恐ろしい副作用が極力少なくて安心のできるワクチンをぜひ開発していただき、又無料で打てるチャンスを下されば、喜んで接種させてやりたいと思っています。そして、副作用の一日でも早い原因究明と苦しんでいる方々のご快復を願っています。
598	子宮頸がんの予防接種受けたいと思ったけど、テレビなどで副作用が出ると知りました。そして予防接種を受けるのがこわくなり、諦めたので、早く安全なワクチンを作してほしいです。

599	子宮頸がんワクチンには重とくな副反応がある情報を得ていたためあえて受けさせませんでした。個人でも得られる情報であったにもかかわらず、市が確認できなかったのでしょうか。実際まわりにも学校からの案内がくるので、なんの疑問も持たずに接種させている親御さんがたくさんいらっしゃいました。無料、定期接種と言われると打たない決断をするのは勇気がいるものです。もっと尊い子供達の安全を考えていただきたいです。
600	子宮頸ガンの予防にワクチンが有効なのは、理解しています。ワクチンの安全性をしっかりと調べてほしいと思います。
601	報道を見て、接種はしませんでした。
602	子宮頸がんのワクチンをうてば100%子宮頸がんにならないのか？違うならどのくらいふせげるのかを知りたい。もっと知識がほしい。
603	子宮頸がんワクチンはしませんが去年、妊娠を機に検査はしています。
604	子宮頸がんワクチンを接種しようと思った矢先に、副作用が問題になり、接種を見送っています。少しでも早く国の方針が決定し、ワクチン接種で子宮頸がんを防ぐことができたらよいと思います。
605	娘は子供の時からアレルギー体質があり、ぜんそくや原因不明のじんましんで薬をのんでおります。てんかんの症状もありました。ですから、他の予防接種は受けておりましたが子宮けいがんの注射はネットでまだ研究段階との情報があり高校の時様子をみていました。その後打った人が血管がいたいとか車いすになったとかいう記事を見ますと絶対うたたくないと思います。子宮ガン検診をうけるようにします。打ったとしても100%けいガンにならないとは限らない他の型もあるしとか雑誌で読んだ気がします。思い返すと娘が高校1年の終りに通っていた高校の保健の先生から電話がありました。「みんな受けているが、どうして受けないんですか？理由は？」と聞かれ「しばらく様子を見ます」と答えました。「どれくらい見るのか？」心苦しい思いをしました。打った方がいいのかすごく迷いましたが、小児科の先生は、任意だからと言ってくれました。今思うと打たなくてよかったと思います。
606	母(私)が「サーバリックス」を3回受けました。接種後3回とも膀胱炎になりました。現在の症状は、身体がつねにだるい。すぐ疲れる。光をまぶしく感じる。めまいがする。(これは現在は落ちついていますが)長く寝る。物覚えが悪い。簡単な計算がすぐにできない。簡単な漢字が出てこない。例えば「顔」という字の左側「彦」が左か、右か分からない時があり、しばらくしたら思い出せた。という感じです。43才なのですが、接種したのは数年前、出はじめてすぐです。接種してから膀胱炎になり、現在は全くありません。年のせいもあるかもしれませんが、子どもに接種させなくて、ほんとうに良かったと思っています。私は病院勤務(リハビリ助手)で、看護婦さんたちみなさんサーバリックスを接種していて「打った方がいいよね」と打つ方が自然な雰囲気でした。迷わず打ちましたが、まさかこわい結果になるとは思わず、もう少し世間の様子を見てからにすれば良かったと後悔しています。勤めている病院で打ちました。(料金は支払いました。)
607	母が副作用が心配だから、ワクチン(子宮頸がんの)は打つつもりないといったのですが、実際のところ、副作用ががおこるのはごく一部の人だけだから、やはり子宮頸がんの予防のために打ったほうがよいのか悩んでいます。でももうすぐ対象の年齢からはずれてしまうので、どうしたらよいでしょうか…。
608	副作用の報道を見て心配で受けなかった。
609	子宮頸がんワクチンの接種が開始されたとき、周りの医療関係従事者の友人達は皆、まだ副作用が心配だから接種しないとの判断でした。自分も含めてです。
610	3才上の長女は子宮頸がんワクチンを近所の内科で接種したので、同じ病院で予約しようと電話したら、もう子宮頸がんはやっていないと断られました。理由を聞くと、今は接種する人が少ないのだと言われた。迷いましたが結局止めました。
611	ワクチンの認可はしんちょうにお願いします。(特に子供に関するもの)
612	子宮けいがんワクチンを接種しようと、かかり付けのお医者さん(内科)に相談したら、丁度副作用で問題になっていた頃だったので、お医者さんは「知的障害の子には副作用が強く出るかもしれないから」と言われた。でも友達は大丈夫の子もいます。でも婦人科ではそんな事は言われていないがどうなんのでしょうか？もう年齢的にもムリですが早く教えてほしいです。
613	副作用が心配で1度も接種しておりません。1日でも早く安心して接種できる様にして頂きたいです。
614	子宮けいがんワクチンはH12.4～13.4月生まれの子は名古屋市内で何人くらい接種しているか知りたい。
615	子宮頸がんワクチンを娘に接種したいと思っておりますが、副作用の問題とワクチンが2種類あり、それを知識のない親が選択しなくてはならないという問題があり踏み込めません。もう少し丁寧に教えていただきたいです。
616	もし接種したらどれくらいワクチンの有効効果が得られるのか(期間)数年なのか、一生なのか？
617	今後の方向性は？今の段階ではどのような状況になっているのかよく分からない。書面での情報がほしい。インターネットばかりではなく、ちゃんとした書面で。
618	子宮頸がんワクチンの副作用の報道を見てワクチンの接種をさせませんでした。(保護者より)

619	副反応がおこる可能性が高いので接種をやめました。安全だと十分理解できたら、本当なら接種をとてもしたいです。早く安全な接種ができるといいと思います。私(本人の母親)は子宮頸がんで、今、通院中です。
620	小学校から反抗期。学校では多少は反抗有か、むしろ無しに等しい。しかし、私(母)には、究極常にイライラし、カッターを投げつけ、包丁を付きつけて収まりましたが、ワクチンなど以前の話という状況です。退学し、自分の思いのままです。あまり参考には、ならず申し分けありません。
621	日本脳炎の予防接種を3才で1回目を接種したら熱性けいれんを起こし2日間入院しました。以降日本脳炎は接種するのをやめました。
622	安全性が確認でき、無料で接種できる日を望みます。
623	副作用の原因が、よくわからない為、恐くて接種していません。
624	なぜ女性だけが接種しなければいけないのでしょうか。男性も接種をうながした方がより良いと思っています。
625	母親と4才で死別。父親1人で子供3人、祖父母2人の面倒があり、ワクチンまで気がまわらなかった。子宮頸がんワクチンは、1個上の姉もうたなかつたので、やめた。
626	子宮頸がんの予防接種は受けるかどうか迷っている。子宮頸がんになる可能性と、副作用(重度)のリスクを考えると親として決断できない。
627	副作用が怖くて接種できません。
628	定期予防接種になり無料で接種していただける事になりましたのに、接種の勧奨がされなくなり、接種をした方がよいと思いながら、不安もあり、接種できていません。一刻も早く勧奨していただき、定期予防接種の時期を少し延長していただきたいです。
629	子宮頸がんワクチンについては、同級生のお姉ちゃんが接種した時に、ひどく痛かったらしく顔色も青くなってひどく気分が悪くなったというのを聞いたり、新聞NEWSなどでの副作用の報道を見て、接種させるのがとても怖くなったので受けさせてはいません。
630	現状での子宮頸がんのワクチンの接種には、反対です。
631	友人の子どもが受けた後、調子が悪いと聞いたので、接種を見合わせました。その後一年程して、ニュースになりました。対策遅い！
632	子宮頸がんワクチン、副反応がこわく接種をさせていません。副反応がどうして起こるのか、どのような状態の時に起こりやすいのかくわしく知りたいです。
633	副作用がでるとニュースとかでやってたのでやめました。でも、実際受けた方がいいのかわかりません。そんな簡単に子宮頸がんなるのが心配です。
634	3人の娘がいますが子宮頸がんの予防注射をうけさせるつもりは、今のところまったく無い。
635	子宮頸がんワクチンは副作用がこわく接種が出来ずにいます。
636	無料で接種をうけられる制度が始まった時点では、娘が対象年齢になったら接種しようと思っておりましたが、それまでの期間に副反応の報道をよく見るようになりとても心配になりました。迷っているうちに積極的な接種勧奨を一時的に中止ということで、接種しないことに決めました。
637	子宮頸がんワクチンを接種した方が良いのか？又は接種しなくても良いのか？わからない。接種した場合、副作用がこわい。現状、接種するつもりがない。
638	H.8生まれの姉には受けさせましたが、その後の情報でリスクが大きすぎる為、下の子には受けさせませんでした。
639	子宮頸がんワクチンの副反応がこわいので打つ予定はありません。
640	副作用が心配で、子宮頸がんワクチンを接種できません。
641	現状において、まだまだ保障の面や、ワクチンの疑念など納得いかない点があるので、がん唯一の予防接種ではあるが、受けさせたいとは思わない。
642	安全性のエビデンスが不十分であると感じるので今のところ打つ予定はありません。
643	副反応が怖いので接種をためらっています。接種を本人、保護者に任せるというのは判断し辛いです。公的には、指導いただけないのでしょうか
644	子宮頸ガンワクチン、日本脳炎ワクチンの副作用の報告を聞くと恐ろしくて、打つ事が出来ません。
645	子宮頸がんの予防接種を受けに行こうと思っていたやさきの、副作用のことが問題になって その副作用の様子をテレビで報道されているのを見た娘はこわがってしまって接種していません。親としても万が一大変な副反応が出たら・・・と思うと安全と言われても接種させようとは思いません。
646	報道をみて心配だったので子宮頸がんワクチンは接種をやめました。
647	副作用がありそうなので、子宮頸がんの接種をやめました。
648	ワクチン接種に病院へ行き、そこで接種するかどうか判断する、というほどギリギリラインの学年の子で、同級生で接種済みの子もいます。できれば接種したかったが、やはりリスクを考えると恐くてできませんでした。早く安心して接種できる時が来てほしいです。
649	接種後、日常生活を普通に送れない状態の子がいる現状では、娘に接種をすすめることは親として出来ません。安心できるワクチンを希望します。
650	子宮頸がんのワクチンは、副作用の報道がこわいので、受けるのをやめました。

651	私や、その近い人たちは、あまり接種に積極的ではありませんでした。突然、国から接種をすすめても、何か別の利権が働いているとしか思えず、うさんくさかったからです。
652	ワクチン(子宮頸がんに限らず)危険性を知り、受けないことにしました。
653	子宮けいがんはこわくてうてない。途中でなくなったりした日本脳炎、1期のみうったが効果あるのか知りたい。このアンケートと子宮けいがん予防接種との関わりをきかせてほしい
654	子宮頸がんのワクチンは先進国で副作用のため接種が中止されているのに日本は続けるのですか
655	ワクチンに問題があるとか、良くないとか色々な事を聞くのでまだ打っていません。
656	子宮けいがんのワクチン接種はさせたいが、まだこわくて受けさせるのは無理
657	子宮けいがんのワクチンを接種しようと思いましたが副作用の事がテレビで見てこわくなり接種しませんでしたはどうしてよいか迷っています。
658	子宮けいがんのワクチンを接種しようと思いましたが副作用の事がテレビで見てこわくなり接種しませんでしたら、どうしたらよいか迷っています
659	子宮頸がんの予防接種は筋肉注射のため、接種時に神経を傷つけたのが 副作用、後遺症の原因ではないかときいたことがあります。テレビで後遺症に苦しむ女性の姿を見ておそろしくなり、娘には受けさせたくないと思いました。
660	子宮頸がんワクチンは、打った方が良いのか、打たない方が良いのか、はっきりさせて欲しいです。
661	副作用の報道を見て不安になり、子宮頸がんワクチンを接種してません。それ以前は、ひんぱんにCMやTV番組で接種するよう宣伝してたので、娘に受けさせるつもりでしたので、受けない選択をしましたが病気への不安もあります。海外のワクチンでそこでも多数の副作用による問題が出ていたと記事で読みました。なぜ、問題のあるワクチンを日本で実施したのか、疑念をもちます。
662	副作用の報道を見て、こわくて接種していない。
663	必要以上のワクチンは不要ではないのか？
664	子宮頸がんワクチンより男女共に性教育をきちんとすればーと思います。
665	うちの子は子宮頸がんワクチンを受けさせていません。副反応が怖くて、とても打たせる気になれません。早く原因をつきとめていただき、副反応で苦しんでいる方に、治る方法を見つけてあげてほしいです。新しいワクチンが出ても、うちは受けさせないと思います
666	子宮頸がんワクチンは、接種させて何かあったらと心配でしていません、本当に接種させた方が良いのでしょうか？
667	子宮頸がんワクチンは迷いながらも接種していません。安全なものができるのを期待しております。(今も安全かもしれないが)
668	ワクチン接種をすすめておきながら、副反応を思われる状態がでたら、それを心因反応だと言い切る所が国に有るのは怖い事だと思います。製薬会社とのやりとりや、医師会との関連で、誰かが利益を得ているのではないかと素人でも感じます。若い女の子が背負ってしまった障害に真摯に向き合い補償して欲しいと思います。また、原因をはっきりさせ、公表し改善して欲しいと思います。
669	接種しようと思いましたが、副反応の報道を見てこわくなり、接種をやめました。
670	子宮頸ガンワクチンについては、まだ研究が足りないと思っていて、沢山の症例を得てから、接種をすすめるべきだと思っています。安全性をもっと高めてほしいです。
671	子宮頸がんはこわいですが、ワクチンの副作用が出たらと思うと、接種する気にはなりません、子供はアレルギー体質なので特にそう思います、もしも…と考えてしまいます。
672	子宮頸がんワクチンは、他のワクチンに比べて副作用が出る確率が高く、症状もひどいと聞きます。以前は子宮頸がんを予防できるワクチンなら受けさせたいと思っていましたが、副作用のことを聞き、受けることをやめています。大丈夫だということが、はっきりすれば、受けさせたいです。推奨するのか中止にするか、はっきりしてほしいです。
673	子宮頸がんの接種は因果関係が証明されていないとはいえリスクが高いので今のところ接種するつもりはありません。
674	子宮頸がワクチンは、副作用の報道があったので未接種ですが、今後どうすればよいかわからないので困ります。
675	子宮頸がんワクチンの副作用の確率や症状が断定できるまでは安心して子供に接種はできません。早期の実態解明を強く望みます。
676	任意と定期の違いが良く分かりません。任意でも推薦されてるのが不思議です。注射しなくても、ならない、なるというのは分かりますが注射を促す文ばかりでもう少し接種しなくてもこうですよという安心する文が欲しいです。又、統計等発表して欲しいと思います。(例えば何%接種してどれくらい発症して、接種せず どれくらい発症したとか 乱文失礼致しました。
677	日本脳炎も、1度接種を中止する事があったので、その時も、接種してません。子宮けいがんは、上の子がすごく痛がっていたし、問題となったので接種しませんでした。予防できるのは喜ばしいですが、リスクを負うのは嫌です。活動に制限されていまいと困る。やりたい事があるみたいなので。
678	中2か、中3の時に、ニュースで、体調をくずした人の話を見て、予防接種を受けるのをやめました。(中2ごろから、片頭痛のような症状が出るようになったので、受験に体調不良で支障をきたすといけないと思います)

679	接種後の症状をみると軽いものから重いものまでありますが、接種後そうなるかもしれないのならこわくて接種できません。子宮頸がんは予防できるかもしれないけど、普通に生活できないならイヤです。
680	子宮頸がんワクチン接種には副作用が心配で結局接種していませんが、これでよかったのか、逆に心配にもなっています。もっと早く現状を知りたかったです。母
681	子宮頸がんワクチンにて苦しんでるお子様を助けてあげてください。国は認めるべきです。母親の顔がわからなくなる・・・そんな現実を受け止めてあげて下さい。私は保護者の立場で副作用が出る事を考え接種をすることを様子見てました。
682	子宮頸がんのワクチン接種は、全く必要ないと思う。接種しても、がんにならない確立が100%になるわけでもないし、毎年、がん検診を受けていれば、早期発見できる可能性も高く問題ないと思う。子宮頸がんのワクチン接種に予算をまわすよりも、本当に生活に困っている方々を、助成してほしい。
683	子宮頸がんワクチンを接種した方がよいのか、しない方がよいのか 判断がつかず迷っています。
684	長い。
685	子宮頸がんワクチンの副作用に苦しんでいる人達に早急に対応してほしい。子宮頸がんワクチンは必要ない。製薬会社が利権がほしいだけではないかとおもいます。このような副作用に苦しむ人を困らせるようなアンケートも不愉快。税金の無駄遣い。
686	質問4の②日本脳炎に関しては、第1回接種時に本人の体調がすぐれず受けていませんでした。その後、ワクチン接種のリスクと効果を考え合わせた上で接種を受けるかどうかを選択するようになりましたので①の子宮頸がん、⑦インフルエンザ(高校受験時のみ接種)⑧その他のワクチンについては、親からの推奨はしておりません。元来口や呼吸器等を経て入ってくるウイルスを(弱めているとはいえ)直接血管や筋肉にうつということについては慎重に考えたいと思っております(保護者より)
687	子宮頸がんワクチンを受ける(接種)為に予約をしましたが、それによって 体に異常が出たというニュースをみたので、予約を取りやめました。小さい頃より病気がちで予防接種をするとその影響で体調が悪くなる(特にインフルエンザ)事がよくあったので、今後も受けないようにしようと思います。
688	子宮頸がんワクチンはワクチンが開発されればよい方へ行くのか頸がんをワクチンで予防しようとする事がすでに問題なのかまったくわからないです
689	予防接種は怖いです。
690	子宮頸がんワクチンはずっと迷っています。副作用が現実としてある以上、ガン予防とは理解していても接種できないのが事実です。"万が一"の事を考えてしまいます。すごく悩みますし、迷います。今現在は一度も接種していません。
691	姉が子宮けいがん予防とインフルエンザ接種直後突発性縦隔気腫になったので妹はやめた。
692	子宮頸がんワクチンはとっっても大事と聞いていましたが、テレビ・ニュースなどで副作用もたくさんの方が出たと聞き、今でもとっっても迷っています。今後、注射をしても大丈夫と報道をたくさん聞いたりしたら後押しされ、カクゴが出ると思うのでそういった違うワクチンが出来たらとてもうれしく思います。
693	接種対象年齢ですが、副作用の報道と、その後の政府の心ない対応を見て心配になり、ワクチンを接種しておりません。今回名古屋市の英断でこうした調査が行われることを、市民として誇りに思うと同時に、現在副作用で苦しんでいらっしゃる方々への救済措置策定に結びつきますようお願いしております。
694	たとえ少数とはいえ、接種後に体に異常が起こったという例があるのは、親として悪い可能性を考えないわけにはいけません。0.000.....1%でも、異常がでた子の親の気持ちをもっと真剣に考えて下さい。その子の将来が...誰が責任をとれるのかおしえて下さい。
695	ワクチンをリスクありと思うけませんでした。リスクをかくして、薬をうるのはあたりまえでありそうゆうひがいはへらない。
696	まだ子宮頸がんワクチンは受けていないのですが、受けた方が将来に良いのでしょうか。なぜなら母が子宮頸がんの初期段階で手術を受けておりわか家は祖父母も含めがん家系なので心配です。姉はワクチンを受けており安全性は分かっているのですが、マスコミ等での話や映像によって接種するのをためらっております。本当に良いのか、悪いのか、お知らせ下されば、ありがたいです。
697	母親が5才の時に、死別。父親1人で子供3人、祖父母2人の面倒を見ており、ワクチン等まで気がまわらなかった。子宮頸がんワクチンは本人と相談して、うたない事にした。
698	2才の時に母親が亡くなり、父親が子供3人、祖父母2人とくらし、ワクチンまで気がまわらなかった。子宮頸がんワクチンは、姉2人もうってないので、うたない予定です。
699	子宮頸がんワクチンの接種直後は、今まで受けたどのワクチンとも比べものならないほどうでがいたく、上がらなかつたようです。(しばらく続く)幸い現在は何ともありませんが、やはり安全性が保証されないと次女には受けさせていません。
700	受けさせたい気持ちはとてもあるのですが、安全性が保証されないと不安で受けさせていません安全性が保証された時点で自費でもかまわないので受けさせます。
701	子宮頸がんワクチンは副作用がこわく、接種させる意志がありません。

702	既に副作用の件が話題になっていたのに、子宮けいがんのワクチンは接種するつもりは全くなかった。調査票の記入はめんどろですが、必要な調査だと思うので、名古屋市ガンバレと心の中で応援しています。
703	承認されるまでの期間が、あまりにも早い気がして、接種を見あわせていたら、こういう事態でびっくりしている。原因究明や、治療法ができるようになんぼしてほしい
704	子宮頸がんワクチンについては接種がはじまるまえから危険性について、ネットでは話題になっていました。その為接種自体ははじめからするつもりはありませんでした。
705	子宮頸がんのワクチンを受けさせたいが、現状では非常に不安である。安全なワクチンの開発と早期に正確な判断を示してほしい。専門知識のない保護者だけの判断は難しい。
706	子宮頸がんワクチンは本当に大丈夫なのですか？
707	副作用がこわくてまだ子宮頸がんのワクチンを接種していないが迷っております。接種年齢をもう少しのばしてほしいです。
708	かんが予防できるなんてうれしい。とてもありがたいとおもいました。娘を守りたいでからね。ですが、テレビ等で接種後、副作用が出て、日常生活が困難になったり、学校に通えなくなった子供さんに多かったのが「アレルギーを持っていた」と言うのを聞いて 我娘もアレルギーを持っている、急に怖くなりました。現在、何人の方が接種して、副作用が出て辛い思いをしている方が何人いるのかもわからず… 打てばがんにならないかもしれないが、打ったことで日常生活が困難になったり、たとえ軽い副作用でも常に気になる様なことが残るとしたら、親も子も後悔します。本当に安心安全でなければ健康であるための予防にはならないと思います。まだ打てずにいます。
709	母から、副作用がかなり出ているみたいなので接種をしなくてよかったと思っています、体になにもふじゅうがないのにワクチンをうってしょうがいが出たら子どもも保護者も家族全員がとてみたいへんな思いをしなればいけなくなると思うと…がんになるかくりつとしょうがいをかかえるかもという思いどちらをえらばいいのか病院でけんさをさせるといせんたくと今はしたいと思います。
710	子宮頸がんのワクチンが少女達に悪影響を与えたのは、間違いありません。行政が非を認め、彼女や家族の負担を軽くしてあげて下さい。このアンケートが有意義に使って頂ける行政であって下さい。
711	子宮頸がんワクチン接種を検討していた時に副作用の報道があったので接種を見送っていた、ワクチンの影響をはっきりさせて接種の事を考えて欲しいが、こんなにいろいろ副反応の報道(情報)があると不安で接種することは心配です。
712	子宮頸がんワクチンを安心して接種できる様になるまでどれくらいかかるのでしょうか？今のままでは恐くて接種させられません。又、無料で受けられる制度の延長も望みます。早急に新しいワクチンの開発が原因究明を望みます。
713	子宮頸がんワクチンを接種すればがんの発生率が低くなるが必ず発生しない訳ではないにも係わらず、死亡や障害者になる可能性もあるのなら接種しない方が安全に生きられると思うので今後接種するつもりもない。
714	子宮頸がんワクチンは接種していませんが、副作用の報道を見て、とても不安になりました。もし、自分の子供がなったらどうしようと思うとリスクが大きすぎて、接種しようと思えません。
715	子宮頸がんワクチンは、今のような問題が出てくる以前に、親の判断で、何故うつ必要があるのか？ワクチンは身体に害があるかもと感じ、接種していません。本当に接種しなくて良かったです。今後も接種するつもりは100%ありません。その他のワクチンについても、子供の頃(幼児)本当に必要なものしか接種していません。そのおかげか、特に病気もせず今まで来ていますが、ワクチンには、疑問が多いので、接種していないものも多々あります。
716	婦人科の先生に相談したら絶対にワクチンを接種した方が良いと言われましたが、副反応がこわく、未だ接種していません。もしも自分の子に副反応がでたらと思うと接種できません。でも子宮頸ガンもこわいです。。。
717	子宮頸がんのワクチンを接種する予定は今のところありません。副作用の内容が怖いので。子宮頸がんの副作用が大丈夫ってなってから考えます。
718	注射を極度に嫌がる、(痛い・怖い)インフルエンザワクチン・採血時。父子家庭の為知識が少なく、横のつながり(他の父母とのつきあい)も少なく不安です。
719	同世代の娘を持つ身として、副反応(かも)というかたの苦しんでいる姿を見ると心が痛みます集計も大変かと思いますが頑張ってください。
720	子宮頸がんワクチンについて接種しようとしたが、いろいろ世間をさわがせていたので、やめました。本当に効果があるのかも含め、はっきりしてほしい。
721	子宮頸がんワクチンを接種させたいと思いますが、副反応が怖く娘に接種をすすめられません。
722	子宮頸がんワクチン接種したいのですが、不安な情報ばかりでふみきれません。調査の経過をもっときちんとした形で公開して頂きたいです。
723	子宮頸がんワクチンについて、子供は接種を希望していますが、親である私たちが、こわくて接種させられません、はやく、安心して接種ができる様になればと思っています、私たちも、子どもの為に接種がさせたいのですが…不安です。
724	副反応がこわくて接種はしません。同時に検診の推進に力を入れて下さい。

725	今年20才になりますが、接種を受けられずにいます。どうしたら良いのか結論が出せずにいます。
726	子宮頸がんワクチンは接種した友だちから、熱が出たとか、痛いとか腕が腫れた、部活の時期に腕が上がらないとか聞いたので本人の意志で打ちませんでした。
727	予防接種は受ける派だったので子宮頸がんも接種予定でしたが、さすがに怖くて接種をためらっているうちにこのような状態になりました。ほぼ安全だと信じられない間は接種可能ななっても受けさせたくありません。
728	本人も親も副作用が出た女の子の映像をT.Vで見たので、こわくて接種するは止めようと話し合っ決めました。
729	今までの予防接種で副反応が起きた事がなかったのに一回目で激しい頭痛、めまい、はき気、ふるえが起きましたが、主じ医から受けた方がいいとのことだったので2回目以降は医院の中で様子を見る時間を長くして頂き3回受けました。後からリスクの高い接種ときいてこわくなりました
730	接種するか迷っている所でした。この結果で決めようと思います。早急に発表して下さい。現在高1です、補助期間を延長してもらえると助かります。
731	現在高2の娘の母ですが子宮頸がんワクチンの副作用がこわくて接種してません。本当は無料で受けたかったです。安全となりましたら接種したいと思います。早めをお願い致します
732	子宮頸がんワクチンの副作用が心配(マヒとか、若い頃にあつたら、その後の人生にかかわるから)大人になって、自分で考えて判断すればいい、必要と思えばお金を出しても接種すると思う。
733	MRワクチンだけ打ちそびれてしまい、そのままになっているのが気がかりです。
734	引越後、母子手帳が見つからないのでワクチンの接種を受けてないものもあるがどれだったのか覚えがない。ワクチンの接種は、何年か前にも問題があった事があるので受けなくなりました。
735	子宮頸がんワクチンを接種後された方で、重い症状がある方はもちろんのこと、軽い症状の方たちにも救済の手をさしのべることを願います。あれほど推奨していたのに、知らないふりは許せません。健康を守るはずのワクチンに人生を台なしにされた娘たちがいる事を重く受け取めるべきです。
736	子宮頸がんワクチン、副作用が怖くて受けていません。
737	上記、予防接種は●●在住中で受けており、名古屋市での接種はありません。
738	子宮頸がんワクチンの副反応がでたら心配なので接種させたいが納得してからと思っています。このアンケート結果を参考にさせていただきます。
739	無責任な接種奨励はすべきでない。我が家は自分の判断で接種せず、結果助かったが、当時、接種しない判断も勇気がいった。副反応で苦しんでいる子達の話を知ると、本当に胸が痛む。
740	妹が子宮けいがんを打ち体調がおかしいです。回答を求めるなら学生の時に学校でアンケートを書く時間を作ってほしかったです。一秒でも早く妹が元の元気な身体に戻れる様こちらからも協力していただきたいです。一早く治療法を！！
741	子宮頸がんワクチンを接種して、副作用が人生が変わったら、怖いですね！
742	姉が子宮けいがんワクチンを打ってから体がおかしくなってます。姉が普通の生活を出来ずにいます。進路も変更し今はバイトを少ししてますが親は病院代の為に多くの仕事を遅くまで働いてます。なのにお金がない。助けて下さい、お願いします。このままでは自分も進学するお金を親にたのめないです。
743	月経無ですのでアンケート記入できないのでよろしくお願いします。
744	子宮頸がんワクチンの副作用が心配で、接種させていません。長女(21才)は、半年に1回、定期検診を受けています。
745	ワクチンを打たれた方は、予防への意識が高く、子供を思って親としてできることをしてあげたいという気持ちのある方々だと思います。今回、ワクチンの安全性が揺らいでいる中、国はしっかりとした状況を判断していただきたいと思います。私も(親です)、かかりつけ医から“すごくいいワクチンができました”と子供にすすめられましたが、他の友人から副反応が強いらしいとたまたま聞いていたことや、定期検診をしっかり受けることで早期発見は可能ということなどから、数年は見送り、接種状況を把握してリスクを見てからでも遅くはないかなと思ひ打ちませんでした。副反応や、予防%など、具体的な医師からの説明はしっかりされる必要があると思います。(接種すると決めてませんでした、私には医師からはそのような話はなく、いいワクチン、と言われただけでした。)
746	副作用のニュースを見て接種をやめました。
747	安全性(原因)が確認(特定)できれば接種を検討したい。
748	子宮頸がんワクチンは子供と話し合い接種をしない事にしました。理由は、軽い副反応(はれるなど)が友人等に多くあり、報道などの重い副反応がでている為。
749	めんどくさい。いちいち覚えてるわけないでしょ。もう回答したくない。
750	娘は先天性心疾患があります。子宮頸がんワクチンに、心臓病であった子が亡くなったという記事(小さい記事でした。)をネットでみたので、娘と話し合い、もっと大きくなってから、接種をしようという事にしました。その後、副反応の報道が増えてきました。
751	副作用報道をうけて、迷っているうちに無料接種期間がおわってしまいました。いろいろな事がはっきりして、安全が確認されたら、救済措置で、また無料接種期間をもうけてほしいです。よろしく申し上げます。

752	子宮頸がんのワクチンは2つの理由、①新しいワクチンで、接種に強い不安を感じた(報道を見る前から)②接種しても100%防ぐわけでなく、検診を受ければよいと思った。特に①の理由で接種を無料になった後もひかえました。
753	危険とわかっていてうつことは出来ません。うとうとしていた頃に副作用が発覚してよかったと思っています。
754	娘はアレルギーがあるため、子宮頸がんワクチンの接種をしませんでしたが、ニュースを見たりツイッターなどを見ると、ひどい副反応で苦しんでいるお子さんがいて、他人事ながら心苦しくなります。薬の副作用は、多かれ少なかれあるものと思いますが、現実起こっていることを否定することのないよう、手立てを打っていただけたらいいなあと思います。
755	国からの補助が出てすぐの学年でした。親はすぐに接種しよと進めましたが娘が嫌がりました(痛いのが嫌)まあ急がずとも良いや…と思っていた所、インターネットで数々の副作用の報告を見て接種をとりやめました。まだ、騒がれる前です、この病気はキャリアもしくはキャリアとの性行為によって移されると聞くので正しい性教育(コンドームの着用)が効果的だと思います、何故、こんな副作用で多くの女の子達が被害を受ける事になったのでしょうか。外国の製薬会社の圧力か利権がらみかと憤りをおぼえます。●の時の様にしっかりとした責任、断罪を求めます。日本をこれから背負っていく母となる女の子達は本当に不幸です!!!
756	子宮頸がんワクチンは、こわくて受けさせれない。本人もこわいから受けないと言っています...
757	原因がはっきりするまで接種をしない。一種類のがんにしか有効的ではない物をリスクを背おって接種はしないです。
758	子宮頸がんの予防は、したいですが、後遺症の事を考えると、接種することが不安でしていないのが現状です。
759	まだ将来があるので怖いです。安全性を確かめてからにしてほしいです。
760	現状のままでは、接種をするのか、しないのか、判断ができません。一日でも早く、全ての対象者が安心して接種できるように改善策を取ってほしい。
761	子宮頸がんワクチンは副作用の報道を聞き接種をやめました。
762	接種させる前に一時期中止になってしまったので、接種していないが、実際必要な予防接種なのかどうか、受けるにしてもなん歳までに受けたらよいか教えてほしい。
763	もう少し具体的に接種した時の症状がでる原因を知りたい。よくわからないまま推奨されても不安で受けられない。
764	子宮頸がんワクチンの安全性に不安がある為接種は、見送っています。日本脳炎の追加接種の時も、接種後異常のあった男児があったので、わが子の接種を見送りました。ワクチン接種はとても不安です。
765	上の子は接種(副作用など何も説明や、副作用が表に出ていない時だったこともあると知らずに接種していて今思うとこわいです。)して何もなくなすが下の子は安心できないので接種したくない。
766	対象年齢(期間)がのこり1年となりました。現在中3で受験なので副作用を考えると、とても、子宮けいがんワクチンの接種は考えられません。どうしたらよいか困っています。
767	途中迄は色々まじめにうけていましたが、子宮けいがんは、ワクチンをうけなかった時のリスクとうけた際のリスクを検討して、子宮頸がんワクチンは娘2人ともやめました。あまりに、びんかんすぎるとおもいます。予防は普段の生活習慣とたべもの、心が大切だとおもいます。
768	いちばん、いい時をすごすべき少女達の苦悩をテレビ共で見ても同じ年頃の子を持つ親として、子宮頸がんのワクチンを接種できない、(原因でなくても)もう少し、慎重に進めてもよかった気がします。たぶん、この先、うける事ないです。
769	子宮頸がんワクチンについては、副作用の問題があり信頼性が低く、接種を受けることに抵抗感があります。このアンケートへの回答率が低いのは、質問項目が多く、一時的な症状は含めないなど、判断が難しかったり、回答するのに時間がかかる人がいるためだとおもいます。このような意見でお役に立てるなら、と思い返送することに致します。
770	このような調査大変有意義ですが、遅いような気がします、当時学校からものすごい量のパンフをもらい、“今なら無料です！”というように書いてありました。国の責任を追及してほしい。
771	子宮頸がんを予防接種で感染を予防できるため、副反応と予防接種の因果関係が早くわかって予防接種が無料で早く接種できるようになって欲しい。安心、安全に行えるようお願いいたします。
772	子宮頸がんワクチンは親子で話し合い接種しませんでした、理由は海外での接種後の死亡事例等があるにもかかわらず、問題点を伏せて国があまりに大々的な接種キャンペーンを行っていたので、懐疑的になったからです。又、新しいワクチンで接種後の長期に渡る健康調査がないものを、育ちざかりの中学生にうつ事に非常に抵抗を感じました
773	この調査を実施して下さり、ありがたく思います。女の子を持つ親として、子宮頸がんは怖くワクチンで予防できるなら...と思っておりましたが、副反応の強さに、接種はやめておこうと思っています。が、この調査等で原因が明らかになり、副反応に苦しんでいる人たちも救われることを願うし、ワクチンの安全性が進むことを願っています。保護者

774	子宮頸がんワクチンは打つつもりでしたが打った後に気持ちが悪くなったという友達が複数いた為、部活動を終えた頃打ちに行こうとしたら、何回か打たないといけなと言われ日にちが合わず打てませんでした。でも今、副反応の事を色々聞いているので打たなくて良かったと思っています。
775	親せきの者から、子宮頸がんワクチンは危険だと聞いていましたし、子宮頸がんのワクチンは、小さいころの予防接種よりも危険だと思い、やめることにしていました。この子の姉がじんましんが出て、ジフテリア、などの接種の相談に●病院に行った時には、予防接種をする危険をとるか、しない危険をとるかは、親が決めて下さいと言われ、しない危険をとりました。
776	ニュースを見てこわくなり、注射の予約を病院にしに行こうとしていたが急きよやめました、ここまで成長したのに副作用が出て一生不自由になるのはイヤなので止めました。
777	子宮頸がんワクチンを接種したいのですが、副反応の報道を見て心配になり、接種できません。
778	子宮頸がんのワクチンの副作用の報道を見て、心配になり一回も受けていないのですが、本当に大丈夫なんでしょうか？ワクチン接種しなのも心配なので、ちゃんと安心したいです。
779	子宮頸がんは性交渉によりかかるので、純潔を守り親が子供に婚前交渉をしない様ワクチンをすすめるよりも正しく教育することの方が大切だと思います。のでうちは接種しませんでした。
780	女子中高生に人生がかかわってしまうような副反応が出るワクチンは受けさせたくありません。必要なものであれば“安心”とわかってから必須にしてほしかったです。(保護者)
781	子宮頸がんワクチンはまだ接種していません。副作用が他の予防接種より多くの人に出ているようで恐いです。
782	予防接種は受けたのですが、受けた後の副作用が怖くて受けられません、また、子宮頸がんのウイルス全てに効果があるわけではないようでなので、受けるかどうか、悩んでいます。因果関係など、はっきりされて頂きたいです。
783	日本脳炎と子宮頸がんの予防接種がさわがれたあとの安全性、必要性がよくわからないので接種していない状態です。
784	小6か中1の時、子宮頸がんの予防接種の通知が来ましたので、病院に予約をしたところ、薬がきれているという事で受けられませんでした。その後何の連絡もないままです。
785	必要の無い予防接種は受けさせるつもりはありません。
786	病院の先生には、接種する様、すすめられましたが不安で接種出来ていません。アンケートの結果、正しく公表していただきたいです。
787	子宮頸がんの予防接種は最初は受けさせるつもりでした。受ける前に副作用などについて調べようと思いついて調べたところ、接種したところでもがんが防げる訳ではないこと、海外での死亡副作用などのワクチンによる被害を知り絶対に受けさせるのはやめようと思いました。予防接種を推めるばかりで副作用について知らせないのは、無責任だと思いました。子供のためと思って予防接種を受けさせ、娘に副作用が出た方には、行政がきちんと出来るだけのことをしてほしいです。原因をつきとめて、元の体調にもどれるようにしてあげてほしいです。
788	この先、こんなおそろしいワクチンが再開されないことを望みます。我家は、当初から外国でもたくさんの副作用で苦しんでいる方が出ていると聞いていたので、接種は絶対しないと決めていました。回りの方々何人か受けた様ですが、受けなくて良かったと心から思います。
789	子宮頸がん予防接種を受けようと思ったのですが、受けさせようと思ったのですが受付で今は皆さん考えてもらっているので、と、でもその後、テレビの報道など見ているとやはり、受ける気になれず、止めました。子宮頸がん発症した場合は運命だと思いついてその時にできる治療に頑張ろうと思います。
790	子宮頸がんワクチンはウイルスの1部の型の感染予防とのこと。打った方が良いだらうという程度のワクチンならリスクを背おってまで娘に打たせたくないです、自己感染予防、定期検診など推奨することは他にもあります。
791	小6で月経不順はあたりまえだと思うのですが…。
792	このような調査が行われることは大変有意義だと思います。それにしても2年もたっているのに、その間苦しんでいる方々にとって遅すぎると思うので、国の責任も含めて、しっかり(当時ものすごい量の“無料”(今なら！という特典的な感じ)というパンフを学校からもらいました！！)追求して欲しい。我が家は一切接種しませんでした、副作用等恐かったので。
793	DPT1回目H12.1、2回目H12.4、3回目H12.7、DPT追加H14.4
794	子宮頸がんワクチンを子どもに接種させようとした直前に知人から、副作用のことで、接種したらいけないと言われ、取りやめました。その数ヶ月後、マスコミで副作用についての報道があり、接種しなくてよかった気がしますが、十分な副作用の説明を受けずに、後遺症が残ってしまったお子さんがいるかと思うと、心が痛みます。少しでも情報が出ていたのであれば、報道が遅すぎたのではないかと思います！本来は良いワクチンかもしれませんが…
795	副反応(副作用)が怖いので打てない。
796	子宮頸がんワクチンを、そろそろ接種しようと思っていた所で、副反応問題が出たので、とりあえず接種しなくて良かったと思っています。今はまだ不安なので、接種する予定はありません。
797	まだ、後遺症が怖いので、接種してないので、データなどを公表して下さると嬉しいです。

798	子宮頸がんワクチンを接種したいが、後遺症が心配でできない。今、中3なので、接種可能な機会もあと少し…。ですが、受験も控えており決断できず、母娘ともども悩んでいます。(母)
799	安全面で心配なので、受けていません。本当は受けさせたいのですが。せめて、高校3年生まで無料で受けられる様にしてほしい。
800	子宮頸がんワクチンの副作用が心配で、とても受けさせることができません。
801	ワクチンの副作用があるかもしれないと、すぐに接種しないで良かった。10代で性交渉する前提のワクチン接種より、安易に性交渉しない、婚前交渉しないことも話していくことが大事だと思いました。ワクチンに副作用があっても、人の一生がかかるといわれるような重大な障害が残るような副作用はないようにしてもらいたいです。
802	3才の頃、ギランバレー症候群になり、軽度で済んで心配はいらなかったのですが、以降、予防接種には慎重になりました。予防接種で病気になったわけではないのですが、不要な接種(インフルエンザ等)はやめ、子宮頸がんワクチンも、接種を見合わせているところでした。
803	子宮頸がんワクチンは、紹介(副作用の状態や、リスクを知らせるべき)しても良いが、奨励するべきではない。責任とれないです。
804	予防接種と副反応の関係がはっきりしていないので、不安がある。親として、分からないものを子供に接種しようとは思えない。
805	知人の娘さんで子宮頸がんワクチンを中学生のときに接種して、体調が悪くなり、学校生活を送れなかった人がいます。きちんと調査してほしいです。予防接種を受けて、副作用が出て苦しんでいる人がいることもきちんと公表してほしいです。
806	産まれてから、色々なワクチンを射つたびに発熱や発しん、体がだるいなどの症状が必ずあり、その度にワクチンはこりごりと思っていました。かかりつけ医に相談しながら慎重に考えて射つ事が多かったです。子宮頸がんワクチンについては、副作用、副反応の症例を待ち、(2~3年)娘と話し合いながら、無料の時期だからと言って急がずに、実費でも安心、安全なワクチンとなってから接種する事に至りました。子供の頃からアレルギーがあり、同じ様なお子様のお母様達と相談しました。
807	副作用が心配でとても接種させる気になれません。
808	安全だと言う保障がないのに。まだ若い娘に安全じゃないワクチンは打てません。人体実験みたいなことしないで!!!
809	子宮頸がんワクチンについて、副作用や、接種直後に発熱などがあるときいていたので、親の判断で接種しませんでした。当時、接種しなくてよかったと思っています。
810	無料の間に受けたいとは思いますが、安全でないのに親の責任で受けさせるわけにいきません。副反応が怖いので受けさせられません。子供本人も、ニュースなどを見て怖いと言いますし。H12年生れの子供には多いのではないのでしょうか。受けていない子も多いのでH13年生れの子供達が安全に受けられるようになった時、H12年生れの子にもう1度対応してもらいたいです。
811	副作用が心配で、受けさせることはできません。
812	子宮頸がんワクチンのこの型は、あまり日本人がならないガンだと聞きました。あと副作用があまりにもリスクが高く接種するメリットがなさすぎです。もっと副作用のこと、日本人には、あまりかからない型のガンのワクチンだと言うことをみなさんは、しらすぎるのできちんと説明すべきだと思います。
813	子宮頸がんワクチンを接種しなかった理由は、①猫などの不妊治りょうの薬にも使用される成分が含まれる②●の古いワクチンを大量に買った(●が)③すべての子宮頸がんのウイルスに効くわけではない④一生(長い期間)効かない…ということを知ったからです。苦しんでいる人がたくさんいます。どうか何か支援して下さい!
814	子宮頸がんの発生は、性交渉で感染します。ワクチンで予防することより、そのような関係を早い時から、また不特定多数もたないようにもっと自分を大切にするように、小さい時から教育していくことが大切だと思います。
815	原因がわからないままでは、こわくて接種する気になれません。副作用が出た人のワクチンに不純物が入ってたのでは?とか、注射する人がへたくそで神経がやられたのでは?とか、想像してしまいます。何もわかっていないのに、最近またすすめてくる医者がいて、不信感が増しています。いくらもうかるの?
816	副反応が心配だったので、一回も受けませんでした。
817	副作用の可能性のあるものは、子供には、受けさせたくありません。
818	子宮頸がんが具体的にどのようなものか理解していませんが、ウイルス的なものがもとでなるんだと思いますが、もし、精神的なもの(ストレス)などがもとで子宮頸がんになるとかいうようなことはあるのでしょうか?(めんえき力が低下とかで…) そのような場合、ワクチンをして意味はあるのでしょうか?あと、やっぱりワクチンをして子宮頸がんになる可能性はありますか?子宮頸がんのワクチンは良くないと聞いたことがあり、どんなふうにも良くないのか詳しく知りたいです。
819	子宮頸がんワクチンに関する重大な副作用のニュースがあまりにも多く、接種をひかえています。万が一を考えると、娘の人生すべてがだいなしになってしまいそうで、悩みます。ワクチンの有効期間はどのくらいなのか?打つのと打たないのとでは、どちらのリスクが高いのか?わからないことだらけです。

820	2才上の姉の副作用と思われる。月経停止と、ワクチンに対する情報などを受けて、ワクチン(子宮頸がん)への信用が薄れ、怖さが強くなり、接種はやめました。
821	子宮頸がんにかかると大変な病気だと知りました。けれど接種後のいろいろな諸症状について、子宮頸がんワクチンのせいかどうか結論が出ていないのだからワクチンではなく検診を無料もしくは安く受けられるといいと思います。将来、子宮頸がんにかかるかもしれない、すすめられた時期に子宮頸がんワクチンを打っても副反応はでなかったかもしれないけれど、「打ったら、しばらく腕が上がらないから剣道できないよ」という友人(先輩)の話をきいて、迷っているうちに報道が流れ、今に至ります。ちなみにその先輩はその後痛みはなくなったそうです。今は打たなくてよかったと思っています。今回のアンケートの結果の公表を正しく行って下さい。よろしくお願いします。
822	子宮頸がんワクチンを接種しない方のアンケートもとるべきだと思います。接種した後の副作用に大なり小なりありますが、小さな副作用として接種部位がとても腫れ、筋肉痛がひどい。鉛筆が持てないほどだけでも、接種することにちゅうちょします。小6生はまだ腕も細く、そんな腕に筋肉注射はとても痛かわいそうです。わが子が接種したら、痛みで、貧血や、呼吸困難になりそうで、怖い予防接種だと思っています。接種年齢を18才以上にあげるべきだと思います。(性交渉の心配は個々家庭によるもの)
823	産婦人科のHPなどにも、接種すべきであるようなことが、書かれてありますが、重い症状のでておられる方が多くみえる現状において、とても、おそろしくて、子どもに接種させることはできません。ワクチンの有効性を否定したいわけではありませんが、ウイルスの一部の型にしかかかないこと、副反応が重いことを考えると、なぜ、今だに、病院等で、推奨され続けているのか、理解できません。このように、アンケートをとっていただけること、とても、ありがたく思います。ありがとうございます。苦しむお子さんが、これ以上、でられないことを願ってやみません。
824	子宮頸がんワクチンの副反応が恐く、今だに受けていない。受けないことによる影響(がんにかかりやすくなる)を心配している。
825	1人目の娘に子宮頸がんの予防接種を受けさせましたが、その後のテレビでの副作用に不安があり、2人目には受けませんでした。アレルギー体質のため、何かあっては困るので…1人目は何の副作用もなく、良かったです。
826	本当は、子宮頸がんのワクチンを接種させたいが、もし副作用で障害がのこるような事があったら…と思うと接種させるのが怖い。年齢的に、無料で接種できる期間がギリギリで、中1の時から、どうしようか悩んでいる間に、今日に致っています。安全だと分かれば、今すぐにでも接種させたい。
827	子宮頸がんワクチンについては、あまりにも普及させるスピードがはやかった為、怖かった。リスクについて何も情報がなく、よい話ばかりだったので。私は、子どもの性殖機能に、人工的に、手を加えることだけは、とても嫌だったのでワクチンの接種は、見送りました。
828	日本での接種前に既に欧米での危険性と効果が疑われていたので、接種しなかった。
829	日本での接種以前に、既に欧米で危険性と効果が疑われていたので、接種しなかった。
830	記入者の保護者です。子宮頸がんワクチンを無料で接種できるようになり、接種しようかかなり迷いましたが、このワクチンの歴史が浅い為、副反応の事が気掛かりで、結果として接種をしませんでした。接種を受けた事で、その後の生活が一変された方の事を思うと、同じ年頃の娘をもつ親として、胸が痛みます。このアンケートは、辛い思いを抱える方々にとっても重要なアンケートだと思います。アンケート結果を是非、詳しく、広く公表し、今後に役立てて頂きたいと願っております。
831	接種前に副反応の報道を見ていたので、一度も接種しなかった。
832	子宮頸がんワクチンは、小児科ですぐ打つよう進められましたが、あわてて打たなくて良かったと思っています。健康だった女の子が重い副反応に苦しんでいると思うとかわいそうでなりません。早く注射との因果関係を調べてほしいと思います。
833	上の子の時は、副反応もなく特になにも異常はなかったが、最近になつての副反応が心配で今だに接種することができない。
834	今後、子宮頸がんワクチンを接種した方が良いのでしょうか？
835	子宮頸がんワクチンを接種すべきか悩んでいます。
836	因果関係は、はっきりしていませんが、副反応が重大であるとのニュースを見て接種を控えました。道徳的な教育の方が大切と考えております。
837	子宮頸がんワクチンをうけて副作用に苦しんでいる人たちを、救済してあげて下さい。副作用の件が出はじめていたので、子宮頸がんの予防接種は受けていませんが、もし受けていたらと思うと、心配でたまりません。
838	頸ガンワクチンの副作用がもし出たら…と思うとこわくて子供に接種を受けさせようかどうかなやみ、今のところ接種していません。打たせたいのはやまやまですが…。
839	子宮頸がんのリスク因子およびワクチンの効用年数から考えて、中学1年生～高校1年生という接種年齢が適切とは思えない。
840	子宮頸がんワクチンの副作用のことを考えると、接種することを決断できないため、親として、悩んでいます。

841	子宮頸がんワクチンは、様々な症状が出る事があると放送されたのを見こわくて接種していません。安全が確認できたら接種したいです。
842	早く原因がわかるようにしてほしい。注射してからの効果もあるのか(本当に)
843	子宮頸がん予防接種が無料で受けられることになった時、子供に接種させるつもりでいました。ところが、副作用の報道が流れるようになり、心配になって接種することを見送ることにしました。はっきりとした結論がでていない現状で接種すべきかどうかとも迷っています。無料であるなら接種させたいという思いでしたが、このように迷っているうちに期間もどんどん過ぎていって、無料で受けられない年齢になってしまったら、結局接種をやめるハメになりそうでなんと複雑な気持ちです。
844	副反応で苦しんでいる方々の一助となれば幸いです。宜しくお願いいたします。
845	子宮頸がんワクチンは、副作用が怖くて、接種は今のところするつもりはありません。安定、安心してましたら接種はもちろんしたいと思っております。
846	どうすべきか本当に悩みます。守るものができたと喜んでいたら、守るものが一変してしまいます。しかし、何もおきなければ将来を守れるもの、早く解明して下さい。
847	副作用の問題がクリアになるまでは接種させないでおこうと思う。
848	接種をした方が有益なのかわからない。このアンケート調査を受けてどうするか考えたい。
849	後遺症がある限り、そのワクチンは接種したくない。
850	副反応が出るということで、接種することを考えております。もう少し、くわしい説明など、あらゆる情報を知らせてほしいと思います。
851	予防接種券は母子手帳に初めから添付ではなく、時期になったら郵送されてくる形の方が間違いもなく接種をのがす事もないと思う。予防接種の意味、あり方を接種する子どもたちの身になり、もっと考えてほしいと思う。保護者
852	子宮頸がん予防接種は我が子に受けさせるつもりは一切ありません。あのような症例を報道で見てしまった以上、0.1%でも可能性として考えられる以上…到底打つことはできない。将来そう(頸がん)ならないようにと打ったのに、一生取り返しのつかない痛を背負うことになるなんて…どうしてそんなワクチンを考えたのか、本当に考えただけで怒りしかない！！娘は打ってなくても、本当に人事ではない怒りを覚える！ワクチンで解決しようとか、ボタン一つで何でもできるようにと考える大人に本当に憤りを感じる。”子宮頸がん”にならるようにはどうしたらいいのか、子供たちの心のケア、教育をしていくことを考えるべきだと思う！大人たちはもっとしっかりするべきだ！！子供たちの心の病は全て大人の責任だ！本当に世の中どうかしてる！ワクチンを打って一生台無しにしてしまった子供たちの責任を重く、重く、重く、重く受け止めろ！！
853	予防できるなら予防したいという考えから、予防接種は時期をみて全て接種してきました。子宮頸がんワクチンも接種しようとしていた矢先に様々な副反応による障害がたくさん報道され、不安に思いちゅうちょしている間に積極接種推奨が中止され、その後なんとなく接種しないままとなってしまいました。様々な見解や報道がある中で判断がつかない状態です。かかりつけの医師からのお話で大丈夫であろうと思いつつも、ばくぜんとした不安をふっしょくできず、という状態です。
854	体に悪いと言う事を聞きやめました。
855	まず大人が注射を打ってから子供達に打つべきでは……。
856	子宮頸がんのリスクが抑えられるワクチンは、とてもすばらしいと思い娘にも接種する予定でした。でもニュースで娘と同じ位の子が副作用で思うように体が動かさなく、学校へも行けなくなって、その子のお母さんが、すごく後悔しているのを見て、接種するのをやめました。(怖い)2年以上原因がわからない事も気になります。あのニュースで見た子達は今は回復しているのか？今でも副作用で苦しんでいるのか？も分からない。この調査でいろいろ分かってくる事を願い、きちんと発表してほしいと思います。
857	子宮頸がんの予防接種勧奨に対して大反対！！やめるべきです。ほんの一部の型の感染を予防できるだけなのに、(TVで専門家が話していた)無料で必ず接種しないとイケないように書類等が届き何もわからないままに接種して、副作用によって、苦しんでいる娘さん達の事を思うと本当にかわいそうで気の毒でなりません。早く、副作用であることを認め、治療の援助等をしてあげ、元の元気な姿に戻してあげて欲しいです。(外国の副作用の比率等も調べて下さい)
858	お仕事頑張ってください
859	実際に子宮けいがんワクチンを接種した人がとても痛いというのを聞きうつのために。TVで副作用の方の番組を見た、100%安全なものではないと感じた。
860	接種しようと思った頃に副作用のことをきき、結局接種しないままになっています。接種で予防できるのであれば接種したいと思っておりますが、もし、報道されているようなことが、起こる可能性があるのなら、と迷っています。実費でもかまわないので、原因が解明され、はっきりした後、安心して接種したいです。年齢のことを考えると早く結果を知りたいです。
861	平成25年に1回目を接種しようと思い病院に予約の電話をする頃、副反応の報道があり止めました。
862	予防接種をやるのでしたら、しっかりと安全性があるものをお願いします。

863	子宮頸がんワクチンの数年後の効果についてデータもなく、副作用についても不十分過ぎる段階で推しよし、わが子と年のかわらない子ども達が、ひどい副作用にあっていることはとてもつらいです。あと数ヵ月後には接種を考えていたところだったので、今考えると、もしも・・・と思うとゾッとします。日本脳炎も問題がありました。もう、安全性をうたっても、我が子に接種させるつもりはありません。そのかわり検診を無償化、または補助するべきではないですか？
864	報道を見て、副作用が心配なので、接種することをためらいます。
865	子宮頸がんワクチンは接種を高校生になってからと考えていましたが、副反応の報道を見て止めました。必要性和安全性の正しい情報が得られないので、今も接種は考えていません。
866	卵アレルギーがあるので予防接種は受けませんでした。
867	子宮頸がんワクチン接種の予約を2回するも、都合が悪くなり受けなかった。その後、医者より、受ける必要はないと言われ受けなかった。(性交によりうつるので、普通の子は受けなくてよいと言われたので)
868	安心して接種できるワクチンを作ってください。副作用で苦しんでいる子供たちを救ってください。
869	子宮頸がんワクチンを受けようとしたところ、病院側からオススめない言われました。今はどうなのでしょう？親に判断を委ねられても、よくわかりません。
870	兄弟がいて上の子は予防接種をうけても、下の子の時は副作用が問題になり、一時的に中止になったり、積極的にうつ感じでなくなったりして接種していないのがでてきている。副作用で、何かあるとわかってうつのはできずにいる。
871	子宮頸がんの予防接種について、無料で接種を受けられる制度を開始する際、十分な説明はしましたか？その必要性和、注意点、自治体などが開始する際に説明会など開きましたか？保健所でも、説明会はしましたか？保護者と本人出席で、学校内で説明会を開きましたか？「無料ならば受けよう」と思うのは日常あり得ることです。病院へ行き、最後に保護者(本人)の自筆のサインで接種します。副反応と言われるものに、医師の責任は問われない、これの承諾の為ですが、今も接種した後の体の不調に悩んでいる方がいる中、まずその人たちへの対処を十分にして頂きたい。それもできないのに、その後の進展も何もありません。本当に予防接種が必要なのでしょうか？年間3000人の方が亡くなっている中、年齢別に数字を見るとどうなのでしょう？検診の無料は聞いたことがありません。子宮頸がんという病気の知識も十分に教育、指導はしていますか？子どもに「知ってる？」と聞いたら「知らない」と答えました。子どもの成長期には個人差があり、体調の不良も子どもは気がつきにくいものです。知識不足を解決すべき方法を考えて下さい。私自身、子供が突然学校から接種の紙をもらって来て、内容もよくわからない状態だったので、周りのお母様方に聞き、接種をどうしようか考えている途中で、接種勧奨の手紙が来たので辞めました。ですが、考えている途中、再度、「積極的な接種」の用紙が届き、「接種していない保護者様、お子様」迄に手紙が送られてこれば、人の心理として「接種した方が良いのかなあ？」と思います。自分の周りでは、保護者もワクチン接種に関する内容をよく知らない人が多かったです。
872	日本脳炎接種後、主治医より「次は子宮頸がんを」との指示がありましたが、報道で二の足を踏み、予防接種自体ストップした状態になっています。がんは怖い、でも副作用も怖いという不安を解消できるような情報提供を望みます。
873	子宮頸がんのワクチンの安全性が未だはつきりしない為。ワクチン接種を迷っています。6才上の長女の時は普通に接種して、何も問題も無かったので今となっては一安心ですが。現在は問題視されている為、下の子(H12年生まれ)は受けずに情報を待っている所です。
874	副作用やもしも？と考えてしまうので、ワクチン接種は打たない方向で考えている
875	メリットとばかりが報道されていますが、不自然です。必ずデメリットもあるはず。正しい判断、選択出来る様開示すべきです。これからも“ワクチン”については疑問を持ち続けなければならないでしょう。大切な命がかかっています。
876	質問(特に質問2)の内容がわかりにくく、答えづらかった。
877	子宮頸がんワクチンを接種しようとする時に、副作用の問題が話題になり子供がいやがった。その後接種できるのか、できなのかよくわからない。できるならうけさせたい。
878	子宮頸がんワクチンは、有効性の確実性と副作用の確率を考え、接種しませんでした。
879	ちさいときに、にほんにいないから●でうまれてにほんではなし。ワクチンのかくにんができない。
880	子宮頸がんの予防接種を受けたいが副作用がこわいので受けていません。無料で受けられる期間で接種が出来ればと思うのですが。それを過ぎてしまうと、負担額が大きいと思うので、安全に受けられるようになったら、金額面も考慮していただけたらと思います。早く、安全に予防接種が受けられる様お願いします。
881	子宮ガン予防接種の副作用のことが問題になっていると知り、受けるのを止めました。しっかりと現状報告と説明をして欲しいと思います。
882	質問5で、何故1回も受けていない人に質問が無いのか。どうして1回も受けないのか回答したい人はどうすれば？副反応が心配になったから一度も受けていません。今でも、どちらが良いか迷っています。

883	やはり副作用の報道を見て心配になりました。接種前、副作用が出るか出ないか簡易なテストがあれば、子宮頸がんワクチンを接種したいと思います。
884	検討している内に報道があり良かったと思います。予防できるなら打たせたいと思うので結論を早く聞きたいと思います。
885	現在中学3年生ですが、副反応の報道を見てから心配でまだ1度も子宮頸ガンのワクチンを接種していません。今からでも接種した方がいいのかなやみます。
886	名古屋市が無料で接種を受けられるようにする前から、ワクチンの安全性に疑問の声は多くあったと記憶しています。娘は、家族で相談し接種しませんでした。知識のないまま無料になったから打っておかないと接種したお子さんが娘の周囲には沢山いたような気がします。名古屋市からの接種の案内は説明が不十分だったと思います。子宮頸がんにならなくなるワクチンと言う前にどうして子宮頸がんになってしまうのか全く知識のない人間が接種するのかわからないのかを選択出来るような案内が必要だったのでは、あの当時でも調べれば副反応の事例が沢山あり、名古屋市がなぜあの時期に無料接種にしたのか疑問です。
887	中学以来部活、勉強と大変忙しい毎日だった為、ワクチンを打つ時間は元よりお友達から、痛くて腕が上がらない、腫れるなどの症状が多々あると聞き接種は止めました。
888	予防接種のワクチンが、母子手帳に記載されているスケジュールとは変わっているので何をうけていなければいけないか、把握しづらいので、学校を通して、又は個別に定期的に一覧表を配布して頂きたいです。
889	予防接種は副作用が怖いので、最低限のものにしています。日本脳炎は接種しようと思っていたのですが、再開してすぐに、大変な副作用が出た子がいて不安です。副作用のことなどかくさずに公表していただいたり、新しいものは、前とはどこがちがうのかをしっかりと説明したりしてほしいです。
890	安全であることが確認、もしくは接種後に起きた様々な症状の原因が解決されなければ積極的に接種しない方が良くとかかりつけの医師も言っていました。本来であれば接種してもいい年齢ではありますが、本人も怖いと言い接種はしないと…。何かあってからでは遅いですし、これから未来のある子供に対して接種した後の体の異変があっては遅いです。早急に調査していただきたいです。
891	子宮頸がんワクチンを、接種したかしてないかをまず聞いてからのアンケートにしたらどうかと思う。接種していない人には関係ないアンケートのようだ。
892	副反応の報道を見たので、合わない薬がある娘には、接種させる予定はありません。
893	今後、どういう方向になるのか？アンケート調査をしたのなら、結果だけではなく今後、将来どうなるのか、ワクチンは無料で接種できるのか？早急に対応をおねがしたい。
894	姉(平成6年7月生)が、子宮頸がんワクチンを3回接種したが、1回目の時、10～15分位意識が無くなったので今、思えば怖いです。その為この子は未接種です。
895	最近、私の勤務する眼科に子宮頸がんワクチンを接種してから筋無力症になり、眼瞼下垂の為来院した20歳の女性がいらっしゃいました。娘の接種の予約をした直後でしたので、しばらくそっと様子を見ていました。お母様に付き添われて弱々しい様子で歩いて帰っていかれました。手足もとても細くて、怖くなって予約をキャンセルして接種はやめようと娘に話しました。現在、すべてのウイルスに効果があるとも、何年有効かとも分かっていませんし、後遺症が出て保障が不明で何より娘の体が一番大事です。それなりの年頃になったら年に1度の検診を勧めます。
896	子宮けいがんワクチンの悪いイメージはなくなってほしいです。けいがんワクチンの安全性をきちんと理解した上で、国民に呼びかけたり、声明をだしたりしてほしいです。
897	子宮頸がんワクチンは全ての人に有効なものではないですし、ここまで副反応の人が出てしまう前に中止にはできなかったのかと思います。
898	子宮頸がんワクチンは副反応が問題になっているので、受けさせていません。ワクチンの副反応に関して早く、明確な見解が出されることを望んでいます。
899	娘には、子宮頸がんワクチンをあえて打たせませんでした。主人がネットで調べた際に「確かインドでは死者がでていのに、日本は隠してすすめるのはおかしいと、打つべきではない」と判断したからです。(主人は約3年前に亡くなったため、確認できません)娘と同じ年の姪は、打ったのですが、一年後あたりから、目の調子が悪くなり、地元の病院だけではなく、京都の病院までかかりましたが原因わからず、現在に至っています。眼科だけではなく、MRI(脳)も調べたようですが、大学受験に影響がでており、かわいそうでなりません。
900	絶対受けるべきと思い、受けましたが、高熱を1日だが出してしまいました。
901	外国で副作用で危険とされているのに何故子宮頸ガンの予防接種を、学校を通してまで接種をすすめるのですか？その副作用で、苦しみ、将来がある子の未来をまっ暗な将来にしてしまったことに対して国はどうするのですか？本当のことをちゃんと国民に伝えるべきでは？？？
902	子宮頸がんワクチン接種の副作用がこわくて受ける勇気がでなくて受けませんでした。
903	子宮頸癌のワクチンを打とうと予約を考えていた所副作用が多いと聞き、アレルギーもあるので、予防接種を受けるのを中断し、時期を考慮中であるので、正確な情報を知りたいです。
904	小学校6年生の時にサーバリックスを接種しました。1回目と2、3回目と病院がちがうので、1回目の日はわかりませんが、2回目22年4月9日、3回目22年8月9日に接種しました。

905	子宮頸ガンの予防接種によるメリットがわからない。体にいいことをしているのか悪いことをしているのかわからない。副作用の報道を見てから、他の予防接種を受けてもいいものかためらう。もう少しワクチン自体の完成度を高めたり、人体実験や追跡調査などした方がいいと思います。副作用が出ない人もいるなかどういふ人が出ないかとかも知りたい。それによって受けたりする人がふえると思います。
906	子宮頸ガンワクチンの副作用が問題されており、原因究明されなければ無理に接種をする必要はないと考える。接種をしてもなるときはなるし、パーセントが低いというだけ。毎年の検診でいいのではないか。副作用で一生だめにするのはおそろしい事である。
907	ワクチンに副作用があるのは理解していますが、何分の1に娘がなるのが不安です。接種したほうがいいとは思いますが、安心、納得できる説明がほしいです。不安で正直ためらって接種する事がこわいです。
908	現状では、子宮頸がんワクチンは接種の予定はありません。副作用の問題が解決したら、再考したいと思います。
909	安全でないワクチンを子供達に接種させることをやめて下さい。海外でも報告があるのに子宮頸がんのワクチン接種をどうしてしたのですか？子供達をお守りください。
910	ワクチン接種は「効果がさだかでなく、危険性が高い、必要性がない、事前の説明が十分でない、税金の無駄」であると●をネットで読み、今後も接種しようとは思いません。
911	子宮頸がんワクチン接種による副作用はたまたまネットで見て知りました。もともと予防接種というものに懐疑的であった為、娘には接種させませんでした。無料だからうけさせておこうと思うのは当然のことで、接種した方に非はないはずなのに理不尽な副作用で苦しんでいる方々が少なくないことが驚きです。国の方針に従うばかりでなく、各自治体がそこに住む住民に本当に大切なことを選択することを考えていくべきではないかと思います。何の為の予防接種なのか、誰の為なのか、憤りを感じます。
912	子宮頸がんの予防接種は、まだ恐くて受けられないです。しっかりして下さい。
913	父です。娘は若い時に妊娠し、出産しています。子は現地にいます。
914	ちょうど打つ時期、お知らせも届いて、ワクチン接種に連れて行こうと思っていた矢先に色々、報道が出る様になり、危険だから接種の中止？のような流れで、ずっとそのまま、今に至りますが・・・一体どうなるのでしょうか？打つべきか、打たざるべきなのか・・・報道も見なくなりましたしわかりません。
915	麻しん、風しん混合ワクチンを受けた後に副反応で熱が出た事があり子宮頸がんワクチンの副反応が気になり接種するのが怖い。
916	周りの方の接種後の体調不良を聞くにつけ、接種させたくないです。
917	安全な子宮頸がんワクチンが早くできることを望みます。
918	ワクチン接種による副作用のリスク、また、接種しないことで起こりうるリスクをしっかり知りたい。接種をしないのなら、どんな方法でがんの予防が必要かなどを子供たち本人が理解をし、意識できる説明を知りたい。(聞きたい)
919	今、娘は15才高1ですが接種しようと思った矢先に問題が発生してしまい、一回も接種していません。できれば予防で接種したいと思います。早く問題を解決していただきたいです。
920	接種を受けようとしていた直前に、副作用があると報道があり、見合わせました。
921	子宮頸がんワクチンを接種したいと思っていましたが、副作用の報道を見て不安になり接種していません。もし接種して副作用があるとりかえしがつかない為安全とわかったうえで接種したいと思っています。
922	なぜ今さらなのでしょう？私もテレビなどで見て一度は打たなくてはと思い考えましたがやはりやめてしまいました。すべての人がそうではないと思いますが、人に打つ前にもっともっと考えてからおこなった方がよかったですと思います。その人たちは一生なのですから・・・
923	子宮頸がんワクチンを接種した方がよいのか悩んだが、接種してもし副反応が出たらと思うと接種する気持ちになれなかった。報道をみても政府の対応に疑問がふくらむばかりです。
924	物議をかもした際、自分なりに書籍、文献などを読み、日本人女性に過敏反応が出るのがわかったので、接種していない。そもそも、費用対効果の程は？サーバリックス、ガーダシルできくウイルスは限られる。子宮ケイ癌の定期検診をすいしょうする方が、費用対効果もよいのでは？大切なわが子を、病気でもなく、予防接種で、後々に障害の残る可能性のあるものをやすやすと接種する気にはどうしてもならない。行政はリスクとベネフィットをきちんと市民に公開すべきだと思います。
925	子供が予防接種(子宮頸がん)を受ける年れいになる前に副作用が出始め様子見で打たなかった。いどこで子宮頸がんになった事があり、そのこわさもわかるが、副作用の方がこわいと思った。
926	意見させていただきます。この調査は「子宮頸がん予防接種調査」ですよ？でしたら質問の順番が違うのではないですか？まず質問4を表紙に持ってくるべきではないでしょうか？子宮頸がんワクチンを受けたことのない女子には、その他の質問は無駄ですし、答える必要の無いものだと思います。ですから、その他の質問にはお答えいたしませんでした。
927	日本脳炎においては、幼稚園の頃に問題が起きたのもあって、第1期追加から接種していません。今さら・・・とか思ったり、病院に言い出せなかったり・・・でそのままです。6年生か中1の頃にこのアンケートのようにチェックシステムのお手紙があってもよかったかも・・・

928	娘が小学校2年生の時母親が子宮筋腫で子宮を全摘しました。両方の祖母も筋腫があり、また両方の親類に子宮ガン患った者がおります。婦人科、小児科両方の医師に相談したところ「ワクチン接種よりも対象年齢に達したらリスクが高いことを話して定期検診を受けるように」と指導されました。
929	こうしたアンケートをぜひ有効に(被害者救済の為に)使っていただきたいと思います。高額な費用をワクチンの製造、販売会社に支払った事実は確かなわけで、その上に副作用があったとなれば行政がしっかりと賠償金を請求して欲しいです。頑張ってください。
930	姉は3回とも受けました。生後2ヶ月の時に川崎病にかかりました。その為ガンマグロブリン、アスピリンの薬を使用しました。その影響はないのか心配です。
931	子宮頸がんのワクチンを考えてましたが、副作用の報道を見て心配で、していません。やはりがんは怖いので、防げるワクチンがあれば接種をしたいのですが、安全性が気になります。
932	子宮頸がんワクチン接種を無料で受けることができる期間の頃、すぐにワクチン接種の予約がとれなかったため、行きそびれて、まあいいやという軽い気持ちで接種をやめてしまったが、当時もっと子宮頸がんについての危険性やなりやすさなど、高校生(あるいは中学生)に分かりやすく教えてほしかった。指導してほしかったと思う。
933	子宮頸がんワクチンが無料で接種を受けられる制度があった時、接種させようとした頃に、全身の痛みなどの症状を訴える事例が報道され接種をやめました。安全性が確認されれば接種させたいと思っています。
934	母親からのメッセージ 子宮頸がんワクチンよりも、結婚前の性の乱れを抑制する教育に力を入れて欲しいです。「結婚するまでSEXしない。自分と自分の子供を守るためにも。」と教育して欲しいです。(幸せな人生を送るためにも)
935	子宮頸がんワクチンを接種した事で苦しい思いをされている方がかわいそうです。国はきちんと賠償すべきです。安全が確認されるまで接種するつもりはありません。国のやる事が信用出来ないです。
936	子宮頸がんの予防接種は受けさせない・・・と考えています。もし我が子が、その全身痛に悩まされるのでは?と考えただけでこわいので・・・。子供にも伝えていきます。
937	子宮頸がんワクチンは、いろんな型があって、日本人の型にあっていないものが接種されているとの情報も見ました。どうして、打ち急いだのか理解できません。しかも、性交渉もしていないような少女たちを 対象にしたのかも、理解できませんでした。今後、健康被害を考えて慎重に対応して下さいをお願いします。
938	副作用の心配が大きく、まだワクチンを接種することを控えています。安全であることを確認できるように、今後の様子を見ていきたいと思っています。
939	子宮頸がんワクチンは副作用の情報があったため接種しませんでした。
940	推奨するならば、しっかりデータをとってからにして欲しいと思います。
941	なぜ性交渉もしていないような少女たちに子宮頸がんワクチンを接種しようとしたのか理解できませんでした。しかも、そのワクチンは、日本人にはあっていない型のものだったとの情報も見ました。無料にしてまで接種をすすめたのが理解できません。健康被害にあわれた方々に対する補償をきちんとしていただきたいです。
942	あまりにも身体が小さかった為30kg台だったので受けてないです(子宮頸がんのワクチン)今、大学1年生でまだ50kgにもなってないですが・・・今から受けた方がいいのか考え中です。
943	子宮頸がんワクチンは本当に大丈夫なのでしょう? 一部の子供の体調が悪くなったニュースがありましたが子供にはがいがいがないのか心配でまだ、接種していません。
944	副反応の報道を見て、子宮頸がんワクチン接種ができなくなりました。心配ですが、接種した方がいいのでしょうか?
945	子宮頸がんワクチンを接種する年齢の少し前から、副作用の事が特にニュースになった気がします。1つ上の学年の友達を受けたと聞き、どうしようか、随分悩みました。結局、作用が心配でやめました。報道はある一部の人達の副作用だとは思いますが、因果関係がわからないなら、もっと早く中止して欲しいと思いました。親として判断をせまられるのは厳しかったです。
946	TV等で副作用の様子を見て、娘に問いましたところ、運動だけが取得の娘はあーなったら死んだ方がましだと答えました。今のところ予約はしましたが受けるつもりはありません。安全なワクチンが出されることを願っております。
947	母親が子宮頸がん経験者であります。このワクチンができて娘に受けさせたいと思っていたが、これだけ副反応が強く身体に障害が出るのでは、とても受けさせる選択はできません!! リスクが大きすぎる。早く一刻も早く、リスクが減ったワクチンができるのを願ってやみません。
948	子宮頸がんワクチンを接種した方がいいのか副作用の事があるので悩みます。そのことについて 皆同じだと思うので知りたいです。
949	以前、インフルエンザの予防接種を長女(本人の姉)が受けた時、効きすぎて白血球数が異常に上がり起き上がれない事があった。それ以降 予防接種が怖く、集団接種ではなく●病院にて個別で自費にて受けた。子宮頸がんワクチンもイギリスで接種した子に問題が発生していたので、子供と相談して接種を見送った。

950	子宮頸がんワクチンの接種による副作用で障害が残る可能性がありながら あいまいにしていくのは問題だと思います。大切な人の人生に賭けなど出来ないはず。障害が残ったら医療費で対応するなどとするくらいなら、20才以上の女性が毎年検診を受けられるようにするなどの方向で是非考えていただきたいと思います。このようなアンケートの機会を与えて下さったことに感謝いたします。
951	子宮頸がんワクチンは絶対反対です。一体誰が副作用で苦しむ娘さんや家族の方々につぐない出来るのですか。ワクチンの大義名分をもって人体実験をしているとしか思えません。
952	子宮頸がんの予防接種については色々副作用があるということで、結局、接種しないまま今に至っていますが、接種するべきかどうか迷っています。市からきちんと説明があると有難いです。よろしくお願いします。この調査も無駄にして欲しくありません。
953	子宮頸がんのワクチンを接種したいと思っていますが、副作用のことが気になってなかなか行けません。でも早く打たないと無料の時期をすぎてしまうので困っています。
954	アレルギーのためワクチン接種はしません。
955	子宮頸がんワクチン、たまたま受けていない時に情報を得たので良かったが、もし、受けて悪い副作用が出ていたらと思うと本当に恐ろしいです。対処方がないというのにどうしてすすめていたのか、本当に恐ろしいです。
956	安全が確立されるまで、接種見あわせようと考えます。
957	効果等、考慮した上で、子宮頸がんワクチンの接種は、親の判断でやめました。報道で副反応の件を見て、受けさせなくて良かったと思ってしまいました。怖いと思いました。
958	接種が再勧奨となった場合、公費接種期間が過ぎていたとしても、公費接種対照としてほしい。接種させたいが副反応の心配が大きすぎる。
959	ウイルス対策なら、なぜ男子も接種しないのか、不思議です。
960	母子手帳が見つからず予防接種の時期がわかりません。子宮頸がんのワクチンをしていないので気になっております。現在18才です。やらなきゃと思った時期に副作用などが問題になっていたの で.....
961	この先、子宮頸がんワクチンを接種してもいいのかわからない。
962	子宮頸がんワクチンは、下の子が接種した時に、1日中腹痛をうったえていたので上の子は接種をやめました。
963	質問4を読みまちがえました。修正してあります。すみません。
964	ワクチンを受ける必要性がないと感じております
965	よくわかりません。
966	ワクチンをまだ接種していません。今後も費用の助成は有効ですか。安心してワクチンを接種できる様に、副作用の原因究明をきちんと欲しいと思います。
967	提出遅れてすみません。子宮頸がんワクチンに限らず、むやみなワクチン接種には疑問を大いに感じます。本当に有効かつ安全で必要を訴えるならば、国の政策の一環として無償提供されるべき。
968	頸がん予防ということで、小学校卒業時に接種を考えていましたが、報道を見て止めました。ウイルスの一部の型を予防というだけで、あまりに大きなリスクがあると思います。国が接種を義務化しても、私は子供に受けさせません。そんな中途半端な予防ワクチンを受けるくらいなら、毎年検診して早期発見、早期治療の方が適切と考えます。
969	娘が子宮頸がんワクチンを知った頃、新しいワクチンだった為、副作用が出たらと言うのと、急いで打たなくてもいいのではと思いつつも受験もあるし、先送りしてました。少し過ぎてまわりが異状もないので受けようと思っていたら、重い副作用のニュースが流れ、再び、心配になってますが、高校を卒業したら受けた方がいいかなと思ってます。(保護者より)
970	子宮癌ワクチンは怖いので受けていません
971	子宮頸がんワクチンは打ちたい(打たせたい)気持ちと副作用が怖いので打ちたくない気持ちで迷っている。はっきりと副作用の心配はないから打って欲しいと自信を持って勧めてほしい。その根拠が
972	副作用がこわくて、接種をためらっています。
973	母子手帳を紛失しており正確な正月を返答できずすみません。中学の頃、日本脳炎と麻・風しん混合の追加接種だったと思いますが同時に接種されました。子どもは口びるが柴になる程、体調が急に悪くなりました。子宮頸がんの接種は絶対しません。予防接種というものは2度というものは2度させるつもりはありません。
974	上の娘の同級生が子宮頸ガンワクチンの副作用で、高校も休みがちで、大学受験も出来なかったのを、目の当たりにして、家族で話し合い、下の娘はワクチン接種をやめました。(上の娘は、全く副作用はありませんでしたが・・・)提出が大変遅くなり、又、母子手帳が現在出せない場所にあるため、ワクチン接種の時期が記入出来ず、誠に申し訳ありません。(ワクチンは全て接種しています)
975	予防接種も大切かと思いますが不特定多数の人との性交渉をしない教育をしていく様にすることも大切かと思えます。
976	子宮頸がんワクチンは副作用がこわいので接種できません。

977	子宮頸がんの予防接種は、受けた方がいろいろな症状を訴えるという事例をテレビなどで耳にしたので、抵抗があり接種をうけておりません。接種するかどうか今後のためにも情報提供をよろしくお願い致します。回答が遅くなり申し訳ありません！
978	副作用がこわくて受けさせられない・・・(母より)
979	子宮頸がんワクチンの接種は副反応が怖い為、接種させたくありません。
980	子宮頸がんワクチンの危険性について、言われているのに、なぜ接種をすすめたのか。薬メーカーと政府の関係に疑問。
981	予防接種を推奨する前に、もっと慎重な検討を。
982	子宮頸がんワクチンは副作用が心配で、結局受けていません。報道もすべてではないと思いますが、副作用についての情報は曖昧で、がんのリスクとの判断が難しいです。
983	子宮けいがんワクチンは、考え中です。上の娘は打ちましたが・・・。
984	子宮頸がんの接種をした方がいいかわからない
985	子宮頸がんワクチンが安全か分からない状態で接種を進められているのが良くわからない。
986	●でアレルギーになりました。
987	高い子宮頸がんワクチンが無料で接種できるということで、母親達が、しっかりと情報収集しないまま予約に慌てていた。リーフレットにも、良い事ばかりが書かれていて、リスクについての事が何もなく、接種するお医者様も、子宮頸がんワクチンがどういうメリットとリスクを持ったワクチンなのか？などという事もしっかりと理解できていなかったと思います。当時はサーバリックスのワクチンで、ガン型の2つに対応するタイプが主で、この型から外れた型でガンになると、ワクチンを接種したものの、子宮頸がんになる可能性が0でない事もお母さん達は知らない状態。公的なところからの、発信だったために親は安心してしまったのかもしれない。子どもを思う気持ちがこのワクチン接種について調べる事ではなく、接種するを選択してしまった方が多かつたし、情報が少なかったし、期限(接種)があった為、慌てて接種されたお子さんが多かつたのは・・・後悔されている方は沢山いらっしゃる様に感じています。接種しなかった方の意見がわかる質問がないのは残念でした。我が家はリスクのところをしっかりと子供と話し合い、接種しないという選択が出来て良かったと思っています。
988	ワクチンに関しては手元に母子手帳がない為記入が出来ませんでした。
989	これが、ワクチンのせいだとわかれば、これからどうすればすっきり治るのか教えてほしい。人生が狂ってしまった。
990	接種させたいと思っていましたが、副作用のニュースを見て、怖くなり、まだ接種していません。安全性が確認できてから、検討したいと思っています。
991	今後、確実な安全性が証明されない限り、接種は考えられません。
992	副作用は怖いので、よく調べてから接種してほしい。一生を左右する問題です。
993	子宮頸がんワクチンは注射が苦手な副反応が心配なので接種はしていない。
994	子宮頸がんワクチンを接種するつもりでおりましたが、副作用の割合のあまりの多さに心配となり、取りやめる事にしました。不安を抱える中では接種は出来ません。はっきりとした因果関係も発表されぬ中、このような調査がされる事を評価させていただきます。
995	副作用の話などがあり、気をもんでいます。早く安全性を、明確にして頂きたいです。また、どんな状況だと副作用が出やすいのか、なども知りたいです。安全性がはっきりとしない間は接種するのが怖
996	私の所では子宮けいがんのワクチンを迷っています。できることなら接種はしないつもりです。やはり副作用がすごく心配です。
997	副作用が恐くて、子宮けいがんワクチンを接種できずにいます。どうしたら良いのか、今の悩んでいるところでした。就学や就労にさしさわりがあつたらかわいそうと考えています。
998	子宮頸がんワクチンについては、お医者さんに聞いてもどうしたらよいのかははっきりせず、結局接種しないまま助成時期を過ぎてしまいました。自己判断と言われても困るので、やる/やらないを国がはっきり決定して欲しい。
999	今の学校は予防接種がないの為、やらなくていいと思っている。昔(昭和時代)は必ず学校で受ける義務があつた。予防接種の代金が1回につき5000円～3000円。高額すぎて接種できない。
1000	子宮頸がんワクチンは、とても不安を感じて接種しませんでした。
1001	副反応(副作用)が恐くてうけれません。
1002	べ切日寄りすぎてしまいました。もしもお役に立てるならと思ひましてお送りさせていただきます。お役に立たぬ時は遅くなり、申し訳ありませんでした。
1003	子宮頸がんワクチンのリスクが高いと思ひ、接種させていません。副作用など、はっきりしていないのに、無料接種を始めたのは国の責任である。
1004	子宮頸がんワクチンは副作用がこわくて接種させられません。
1005	関係ない事ですが、遅くなり申し訳ございません。

1006	娘は現在16才接種しようと考えていた頃にいろいろな話をニュースで聞き相談し受けない事にした。しかし子宮頸がんにならない予防のものならば、接種したいとも思います。原因が少しでもわかればと思います。一人の母として、今現在、症状がでてしまっている女性をどうぞ、助けてあげてください。よろしくお願いします。
1007	これから、やりたい事やかなえたい夢がある若い女の子達が、諦めなければいけなかったり、後悔するような副作用の出ない薬をお願いします。このままでは怖くて予防接種を受けられません。
1008	これからやりたい事やかなえたい夢がある若い女の子達が諦めなければいけなかったり、後悔するような副作用の出ない薬をお願いします。このままでは怖くて予防接種を受けられません。
1009	子宮頸がんワクチン・・・不安がなくなったら接種したいと思っています。今はまだ、さわがれてるってことは不安です。今後、なんらかよい案がでるといいな・・・。
1010	子宮頸がんは、娘は接種させたいと考えておりましたが、色々な接種後の後遺症との関係の不明なニュース等を見て、現在まで悩んで接種出来ておりません。接種は、今後も悩んで進められないと思いとて残念に思います。
1011	調子が悪かったので、子宮頸がんワクチンは受けませんでした。(受けた友人が、すごく調子が悪くなるよと言っていたので)
1012	子宮頸がんワクチンに関しては、副反応の懸念から接種を控えております。推奨される産婦人科のドクターもみえましたが、かかりつけの内科のドクターはご自身の娘さんの接種も3回完了せず終了してしまったとのことでしたので、参考にさせていただきました。日脳のように、安心して接す出来る時期がくるのであれば、措置期間を設けていただき、公費で接種できると嬉しく思います。
1013	しっかり調査して頂きたいと思います。
1014	子宮頸がんワクチン接種を考えた事もありましたが、その頃から色々心配な事などを聞き、受けるのをやめました。これから、どうなるのか関心があります。4人子供がいて3人女の子なので子宮頸がんにならなくて副作用もないのなら受けさせたいと思います。
1015	子宮頸がんワクチン、副作用の問題がニュースに取り上げられたこともあり、子供に接種させるべきか今だに迷っています。
1016	子宮頸がんの予防接種公費助成に期限をもうけないで欲しい。(中3の今現在1度も受けていない)子供が受けようと思った時に受けれる様にして欲しいです。
1017	姉は経がんワクチン無料、初年度実施→サーバリックス接種しています。妹(当人)は保留しています(未接種)→接種迷っています。ワクチンを打って副作用の出る確率を打たないで子宮頸がん罹患する確率を公表してほしい。
1018	当時、接種をしないことで、ずい分、周りにも「どうしてうけないのか?」と言われましたが、本当に接種をしないことにして良かったと思っています。製薬会社と金の癒着は、いい加減にしてもらいたいですね。所詮、薬は科学的に作られた「毒」以外の何ものでもありません。体内に異物を入れて、いい影響が出る訳がありません。素晴らしい頭脳があるなら、人類救済、世界平和のためにぜひ、使って頂きたいですね。
1019	副作用が恐ろしく、まだ受けていませんが気持ちとしては癌は怖いので受けてみたいです。副作用のないものをさがしてください。お願いします。
1020	②③④(質問4)については、保育所からの案内に従って、月齢で決められた時に接種しています。母子手帳で確認をする時間がとれず、申し訳ありません。
1021	医師に子宮頸がんワクチンの接種を勧められましたが、副作用がこわかったので、接種するのをやめました。
1022	ワクチン接種が勧奨されていた当初は、子宮頸がん予防のために接種を受けるつもりでいました。しっかりと原因究明がなされることを願っております。本来の子宮頸がんにかからないための最善の予防方法が見いだされれば、1日でも早く、予防処置を受けたいと思います。子宮頸がんにかからないということが一番の願いです。
1023	子宮頸がんのワクチンが、子宮頸がんに100%有効ではないのに、全員接種は暴力!!まず、性教育を男!!女して、20代から、検診で、十分だと思えます。なので未接種にしました!!
1024	私の娘、現在高1です。大学2年の兄がおりますが、その同学年の女子の方の世代で、この子宮頸がんワクチン接種による問題があがるようになりました。娘が接種時期に大きな問題になっていたため、知人の接種経験のお母さん方に自分なり、何人か意見を聞きました。当時、近所の小児科医の先生にもおたずねしました。しかしはっきりした副作用の返答はがありませんでした。「はれるのは、はれるよね～」とおっしゃったのを覚えております。娘は元々、アレルギー症状あるため(この他の治療含め)よく考えて上で、子宮頸がんワクチン接種をしないことを決めました。しかし、ワクチン接種による病気を防ぐ効果もちろんわかっておりますので、決してすべてのワクチン接種を否定はしません。国に対して十分な副作用の研究を望んでおります。このようなアンケートを実施された名古屋市に感謝します。返信遅くなりすみません。
1025	子宮頸がんの予防接種は副作用がこわくて、親の判断で見合わせました。(親世代ではこのような予防接種はなく、家族、周囲にもこの癌患者がいいために)もう少し安全性がしっかりしていたら打っていたと思います。
1026	子宮頸がんワクチンをうけようとして、日にちを迷っていたらTVで報道があり、止めにした。

1027	Q4の回答の際、別紙はあまり役立ちませんでした。母子手帳を参照しながら、記載するにも、小6が、平成何年かすぐにわからず、少し苦労しました。何年生まれだと、小6は、平成〇年以降接種といった対照表があると良かったです。それと日本脳炎は推奨接種スケジュールと記入欄が合いませんけど・・・？
1028	副作用が怖くて受けてません。受けた方がいいのかわからないです。
1029	新しいワクチンが出来た時は1年以上副反応の様子をみてから受けるようにしている。アレルギーもあるのでかなり慎重になる。両ワクチンの副反応を何度もネットで調べた。今回の子宮頸がんワクチン副反応の特集を数々みているが、うやむやにされない様救済される事を望みます。運が悪いとか本人のせいなどではすまされない。
1030	多くの特集記事やTVをみえています。娘達と同じ年頃の子供達が大切な青春時代を奪われてしまっている事にとっても胸が痛みます。早期対応、解明、よい治療方法が見つかる事を祈ってます。未だ接種が可能であることに疑問を感じます。国や製薬会社が利害を考えず早急に補償すべき。
1031	上の姉がワクチン接種あと体調不良となり保健所に相談に行きましたが相手にされませんでした。なのに今更何でアンケートという思いが強り返信遅れました。
1032	子宮頸がんワクチンは、副作用があると聞いていたので接種しませんでした。
1033	子宮頸がんワクチンを受けた方がいいのか迷っています。
1034	子宮頸がんワクチンが「筋肉注射で痛い」と聞かされていたので、本人は嫌だと言って打つことはありませんでした。その後、数々の問題が浮上したニュースを聞き、今では打たなくて良かったと思っています。娘の周りではほとんどの人が接種しました。後遺症も発症した人はいません。でも、今後も娘に接種させる事は有りません。どちらかと言えば性教育をしたいと考えています。
1035	日本脳炎→1回目→H15.9 2回目→H15.10で接種したのですが、その頃副作用が問題になり、中断しました。落ち着いた頃に追加接種をしようとしたのですが、期間がかなり開いてしまったので、また1回目・2回目(上記)と接種し直しました。なので合計5回接種しています。
1036	子宮頸がんワクチンにはまだ副反応が心配で接種させる勇気がありません。でも現在、私(母)が、子宮頸がんのうたがいで、不安な日々を送っています接種すべきかとても悩みます。
1037	怖くて子宮頸がんのワクチンを受けさせられない。接種したら、色々な症状がもし出たら取りかえしがつかない。安全なワクチンが早くできる事を望みます。その際もひき続き無料で受ける事ができる様願います。
1038	当時、父が医師だったので、早く子宮のワクチンを接種した方がいいと言っていた。それを思うと恐いです。
1039	このアンケート結果を何らかの形で報告いただきたい。当該ワクチンの正しい情報をきちんと公開いただきたい。メディアでの不安になる情報しか入ってこないため非常に不安。
1040	子宮頸がんワクチン接種により障害が出る事例をいくつかテレビで見ると、とてもじゃないけど接種させる気にはなれません。予防になるなら受けさせたいのはヤマヤマですが・・・
1041	子宮頸がんワクチンは受けないつもりです。リスクを考えると受けるより受けない方が良いでしょう
1042	子宮頸がんワクチンの副作用で苦しんでいる方の記事を目にするたび人ごととは思えず、なぜ接種を推奨したのか行政に憤りを感じます。健康は戻りませんが最大限の補償をお願いいたします。
1043	受けた方がいいのかどうかのかわかりません。はっきりわかると良いです。
1044	子宮頸がんのワクチンの副反応の報道を見てとても恐くなり予防接種は(はじめは受けさせるつもりでしたが)、受けさせておりません。数々の報道を見る限りとても子宮頸がんのワクチンとの因果関係は無関係とは思えません。担当部所の方は決して他人事と思わず、自分におきかえて原因求明していただき、100%安全が保障できるまでワクチン接種をしないでいただきたいです。
1045	一般的に接種を促されているものは、すべて決められた時期に接種を済ませてきたつもりです。子宮頸がんワクチンもそのつもりで日程を考えていた頃、症状発生の報道があり、見合わせました。見合わせて本当に良かったと思っています。外国での副作用は少なくとも、現に日本人には突出した作用が出ているのですから、他のワクチンと同様の安全性が発表されるまで、断固、接種は禁止すべきです。同時に接種され副作用に苦しむ方の徹底した救済を心から望みます。
1046	子宮頸がんワクチンが危険だとの情報を新聞etcで見て知ってからワクチンの対象年齢だったため、事前によく考えることが出来、打たせなかった。そういう情報を得る前なら深く考打たせたかもしれない。現在被害にあわれている方には心より手厚い支援をしていただきたいと思っています。
1047	子宮頸がんワクチンによる副作用など海外でも問題になっている事を以前(国内での接種以前)より耳にしていたので、中学校からの案内が来た時から接種させるつもりは、ありませんでした。
1048	何も問題なく健康です。
1049	新しい予防接種は何があるかわからないため、心配で様子を見ておりましたが、やはり打たなくて良かったと思います。早く安心なワクチンができると良いです。
1050	どのワクチン接種がまだなのかわかりません。保健所へ母子手帳をもって行けば教えていただけますか？
1051	欧米では、副作用があるため、子宮ガンワクチンは接種されていないのに、なぜ日本では簡単に接種をすすめるのか……。不妊になり易いと聞いていますが。

1052	子宮頸がんワクチン、日本脳炎ワクチンともに、危険性がささやきかけた頃が接種時期でした。受けな いと言うと病院でも友人からも非難を受けました。結局、そのあとすぐに日本脳炎も接種が止まりまし た。新しい日本脳炎ワクチンも、まだ様子を見ています。正しい情報を早く出してもらえたら、被害も もっと少なくなると思います。子宮頸がんワクチンについては、名古屋市は一生懸命対応してくださっ ている事が見えるので嬉しく思います(母)。宜しく申し上げます。
1053	子宮頸がんワクチンの重篤な副反応かはっきりせずとも、報道されている様な症状が副反応の可能 性があるうちは予防接種を中止した方が良いと思う。それより子宮がん検診をすすめてほしい。

## 質問6 その他、ご意見等

### ①「子宮頸がんワクチン接種あり」と答えた方のご意見等

1	質問4のワクチンについての質問項目の⑧のその他が何を答えてほしい間なのかわからない。
2	HPVは副作用報告が重大なものが多すぎる。HBワクチンを男女共補助し接種した方が公益性があると思う。
3	原因がはっきりするまでは、引き続き接種勧奨中止すべきだと思います。
4	日本脳炎の第3期の接種案内は、この先届く予定があるのか、よく分からない。(現在高3)
5	3回目になるにつれて注射が痛かったです。
6	小学生までアレルギーなどが出たりしたので、予防接種は受けていないものが多いです。
7	腕が痛くなった。
8	副作用はありませんでした。
9	腫れと痛みがとてもしつかりました。副作用がひどいならあらかじめきちんと教えてほしかったです。
10	近所の医者で風邪で行った時、なぜ接種しないのか、それでいいのかと言われた。こういう発言はどうかと思う。市が積極的に接種するように指導していたのか？
11	うった所がはれて、数日間は腕を動かすのもつらいほど痛かった。
12	不安。
13	(2)は、16才でじんしんしたので急きよやめることになりました。いたみは、いつもとかわらないちゅうしゃのいたみです！！
14	迷走反応で倒れました。
15	何も異常なし。
16	腫れが酷かった。(とても痛かった。何日も)腕が拳がらない。それ以外は特に問題なかった。
17	直接の関連性が明らかにならなくても実際に副作用と思われる症例が多くでている状況を見たら、親としては絶対受けさせられません。
18	子宮頸がんワクチンについては、H24年当時副作用など調べて接種をしなくていいという判断を親はしました。しかし、本人が強く希望したので受けました。その後いろいろ副反応が話題になり、家族で話し合ったことを覚えています。
19	子宮頸がんワクチンを、3回接種した後、腕、腰などがかなり痛み、高熱が出て寝込みました。あまり動けない状態だったので、病院まで行って受診することも出来ず、2日間安静にして寝ていました。こわかったです。報道で副作用のことが出る、ほんの少し前のことだったので、そこまで心配もしていませんでしたので。学校を2日休みました。報道を後日見て、ゾッとしました。おそろしかったです。知らせてくれるのが遅いよ！こわいよと思いました。ちゃんと調べてください。
20	大変な副作用のお子様の事を考えると、人ごとではなく原因がわかることを祈ります。
21	下の子どもが中1(女)です。接種しようか迷っています
22	今回記入して感じていましたが、母子手帳の記録の年月日を、西暦か平成か統一していただけると、助かります。保健所、病院がそれぞれ印だったりペンで記入だったりとても見にくいです。
23	うちの娘には、全く副反応が出ず良かったです。
24	接種後、テレビなどで副作用が問題となり、本人も気にかけている。インターネットなどで調べたりしているが、不妊になったり、障害を持ってうまれたりと、先々を心配している。
25	酷い症状が出ている娘さん達を沢山テレビで見ました。どうぞ国レベルで治療に全力を尽くして下さい。母達は国を信じて大半は予防接種を受けさせました。その責任は重いと思います。一日も早く1人でも多くの方が治りますように。又将来を通して症状が出るのが不安です。将来をお願いします。
26	子宮頸ガンの注射は痛がっていました。
27	子宮頸がんワクチン(遺伝子組み換えワクチン)は、とても危険なワクチンです。絶対に接種再開はしないでほしいです。
28	1回目の注射が思いのほか痛かったこと。うったあと数時間気分が悪かったと本人が言っていました。その理由もあり2回目の接種は病院を変えました。2回目以降痛くなかったし、気分も悪くなかったそうです。
29	子宮頸がんワクチンの接種後、1週間程度その部位周辺に、筋肉痛のような痛みが続きましたが、その後は大丈夫です。
30	子宮頸がんワクチン接種後はとてもはれが出て、少しふれるだけでも激痛でした。幸いにも報道でみるような副作用は出ませんでした。子宮頸がん発症のリスクと副作用のリスクと、どちらが高いのでしょうか。めずらしいことかもしれませんが、私(母)のまわりでは子宮頸がんの方は今のところいません。先日私(母)ががん検診に行きました。簡単に子宮頸がん、子宮体がんの検査が終わり、結果もすぐに分かりました。検診を推し進めるのも重要ではないでしょうか。

31	水ぼうそうを高1の夏にかかり、高熱がつづき、発疹も全身にひどく顔にあとが残り、予防接種を受けなかったことを反省しました。(有料だったし、そのうち幼稚園や学校でうつるとおもっていたため)まわりに水ぼうそうの子もなかったので、旅行や買い物に行った時にうつったと思います。大人になってから重症化する感染症の、予防接種の声かけも、もっとしてもよいと思いました。
32	長女はワクチンを接種して何事もなくすごせていますが、次女は(H13年生まれ)は副作用の報道を見て心配になってしまい、まだ受けさせていません。早く安心して受けれるように願います。
33	子宮頸がんワクチンは、3回受けてなんともありませんでした。しかし調子が悪くなられた方もいるので、安全で安心できるものであってほしいです。
34	予防できるのが特定の型のものだけである事。又数年間しか予防効果がないようなので副反応の危険をおかしてまで接種する必要はないと思います。
35	うちの娘は、全く異常はなかったです。
36	学校から接種の用紙を持って来たので接種しました。副作用の心配があつたので、一年くらい様子を見ていました。前ページに記入した様に、手のふるえがありました。今思うととても恐ろしい事だと思います。”学校から接種の用紙をもらって帰って来た”だれもどこも、副作用に対して責任を取らない事は許せません。
37	子宮頸がんワクチンは、1回目接種より2回目接種の方が痛みがひどく、3回目接種は今までで一番痛い予防接種でした
38	接種後、接種したところが他のどの予防接種よりいたかった。
39	子宮頸がん罹患率の高さは、多数の異性との性交渉に比例すると聞いています。学校での保健体育での指導もあれと、娘から聞いていますが、生徒たちは事の重大さをあまり認識していないように思います。ワクチンを受ければ良いのでしょうか？娘はワクチンを接種し、多少の腕のだるさを感じたようですが、副作用もなく、運が良かったと思っています。今はワクチン接種が本当に必要だったのか？と思うところです。
40	もし副作用など、今TVで言われるようになってからならばやらせていないと思います。
41	注射をうった後、すごく痛がって、心配になりました。
42	子宮頸がんを3回接種しましたが、今のところ後遺症はでていません。
43	うちの娘は、全く異常はなかったです。
44	接種後2～4週間程度、接種部に痛みあり
45	友達がサーバリックス接種後に異常にテンションが高くなっていました。
46	子宮頸がんワクチンを1回目接種した時、かなり副作用が出て、痛み、大変でした。今になって後悔しています。
47	関節痛は今も続いています。今後出産などの時に何か影響が出るのではと心配です。とてもつかれやすく、高校受験も大学受験も推薦入学を選ぶことになりました。何とか学校へは通っていますが、家ではほとんど寝ています。就職はできるのか心配です。
48	副作用で腕が上がらないのは困った。あれは生活にししょうがでて大変だった。
49	3回接種しました。その度に痛みを訴えましたが2～3日で消失。腕が上がらない等のことはない。筋肉注射なのでこの位の痛みは残るのか？仕方ないと思って3回受けました。
50	3回目の接種の後、接種した側の腕が痛み、動かさず学校を1日休んだ。次の日は軽い筋肉痛程度の痛みになったので登校できた。
51	幸いに娘は何もなかったのがよかったです。もっと慎重に進めるべきだったと思う。長女は、妹だけ予防接種はだめだと思い、実費で予防接種をいっしょにしました。本当に何もなくてよかったです。考えるととてもこわい事です。症状が出た方には補償をちゃんとしないといけないと強く思います。
52	3回目のワクチンを打った1カ月後のあたりから胃の調子が悪くなり、体力がなくなるといった症状が出ました。
53	3回目のサーバリックス本当は5月に受けるはずが、風邪気味だったのか？体調不良だったのか忘れてしまいました。中止になり6月に受けています。早く原因を究明して大切な予防接種を受けられる様になるといいです。
54	ワクチンの危険性について、もっと検査してほしいです。
55	子宮頸がんワクチン1回目接種後、腕の痛み大きなしこりがありましたが3回受けさせなければと思っ痛がっていたのに2回目も受けました。その後ひどい果物アレルギーがでるようになったため3回目は中止しました。今でもアレルギーに悩まされ、本人は不便を感じているようです。このワクチンの副作用の全てを詳しく知りたいと存じます。
56	副作用が問題になる前に接種済で、問題なく接種できましたが、重い副作用が問題になっている現在、二女には接種するのに抵抗があるのが現状です。
57	関節の痛みや下半身のだるさなどをうったえる時が、時々あります。副作用ではないかと心配になります。高額なワクチンが無料ということでうってしまい、親として後悔しています。

58	一瞬、意識を失くして、電車の中で転げるように倒れたことがあります。(座っていたのに)2カ月前のことです。この年頃だとホルモンの関係だったり、何が原因なのか不明です。隣席に友人がいて、30秒くらいで目を覚ませた感じだとのこと。すぐに病院へ行きましたが、低血圧だとか、色々言われて、不明のままです。
59	注射を打った所が1週間ぐらい痛いといっていました。
60	腕が腫れて大変痛かった。(サーバリックスの後)
61	娘は生理前の中1の冬(子宮頸がんワクチン推奨され始めた頃)に3回接種しました。経過は良好です。3回とも筋肉注射のように固く腫れ、熱をもって数日痛みを感じておりました。2回目(1回目の1カ月後)を接種後2~3時間たった頃、急に寒気を訴え、唇が青くなりガタガタ震えていた時は大変心配になりました。数時間安静にしておりまして、回復し先生にご連絡差し上げました。3回目(1回目の6カ月後)は先生から多分大丈夫だろうと言うことで接種し、2回目のような症状もなく終了しました。ワクチンの副反応なのかは不明ですが、ご報告申し上げます。
62	副反応が出た方の回復を心よりお祈りします。また、これから接種すべきかやめるべきか悩んでいらっしゃる方がたくさんみえると思うので、適切な情報提供をよろしく願います。
63	子宮頸がんワクチンの副反応をよく耳にしましたが、ワクチン接種が解禁され、直ぐに当然だと考えて接種を受けさせました。激しい部活動にも全く影響が出なかったのが副反応の話を聞いて驚いたくらいでした。個人差が大きいのかなと思います。
64	私の場合、平成25年に自律神経失調症になりました。
65	打つことでガンのリスクが減るのであれば、子供の体調を見ながら是非打ってあげると思います。
66	質問4のような、毎回々々と書かされるワクチン用紙をどこかわからないが提出してるんだから自分達でチェック出来る項目をいちいち解答者に書かせないでほしい。
67	子宮頸がんワクチンの副反応の報道を見て、本人が非常に怖がり嫌がったため、接種を2回で止めました。次女が来年より対象者に入るので、このどうすればいいのだろうかという状況をなんとかしてほしいです。
68	子宮頸がんワクチンは、副作用があるかもしれないという話をききますが、我娘のように異常がないお子さんも多いと思います。副作用ががんになる可能性を低くするかとたずねられると難しい問題かもしれませんが、親や本人が接種したいと希望するなら、接種させてあげてほしいと思います。私(母)は娘に接種していただいてよかったと思っています。
69	子宮頸がんの予防接種については、医師をしている友人や周囲の保護者など沢山の方に意見を聞いたり、情報を集めてから接種させましたが、赤ちゃんの頃から受けてきた沢山の予防接種の中では一番不安を感じつつの接種でした。「これまでの経緯」を読み、このようなアンケートまで実施されている現状を考えるとよけい心配です。他の予防接種は感染症に対する予防で我が子だけでなく社会に対する感染症の拡大を防ぐという目的がありますががんはかかる確率のそう高くない病気でも一生免疫がつくわけでもありません。正直、国が接種を再び勧奨する必要を感じないのですが。
70	ワクチン接種後、腕が痛くなりました。これはどうなんでしょうか。
71	副反応が心配です(不妊等の)
72	麻しん、風しん(第4期)予防接種のお知らせが届かず、後日、知り合いから聞き{H24年12月末時点で未接種者への}TELしたが(保健医療課へ)無料期間は先日終わったと言われ受けられなかった。受けたければ「お金を払えば受けれる」と言われ郵送されていないのにダメだった。それ以後案内無し。今も未接種です!!そちらのおちどなの!!
73	1回目より2回目、2回目より3回目と、痛みが強くなっていった(うった所)はれもひどくなっていった
74	娘が接種後しばらくして副作用のニュースを見て驚いていました。わが子ももしかしたらそのような症状が出ていたかもしれないと考えるととても恐ろしいです。よく研究してから接種を義務づけてほしいかったです。体内でなにが起こるかわかりません。病気にかかる前に予防接種で健康な身体をやらせてしまうなんて、、、とても悲しいです。もっともっと研究して下さい。これからの為に!!
75	私は幸い報道で流れているような事は全くなかったですが、中には子宮頸がんワクチンを接種して副作用の反応が出て一生車イス生活になってしまった方のことを名古屋市の皆様方はなんにも対策などしていませんよね。どういことですか?
76	注射後に肩の痛みが2~3日続いた。
77	私(保護者)はピアノ教室をしています。生徒さんで子宮頸がんワクチンを受けた日にピアノが弾けない(腕が上がらない)と言っていた子が2名いました。今まで他のワクチンではこのようなことは無かったのでその時はびっくりしました。このようなことがあったので自分の娘にワクチンを受けさせようか迷いましたが、娘には痛み等特に何もありませんでした。
78	ワクチン接種1期、2期、追加等で全て受けていると思うが記入方法がよくわからない。
79	知らなかったので、予防接種してしまった事が、ショックです。

80	友達の娘さんが子宮頸がんワクチンの注射を打って、家に戻ったら具合が悪くなったと、こんな事なら30分位病院に言ればよかったと言ってました。病院で注射を打つ前にこの件を先生に話しをしたら、何万人の中の1人だから、いつまでも病院に言うとか待合室がいっぱいになるからと言われました。病院がこのような事をいってもいいのですか？あの1言で、2度と病院に行くのをやめました(注射は3回打ちましたけど)
81	病院の質問に対する説明が乱暴。(予防接種)子宮頸がんの注射が3回ともすごく痛かった。副作用で熱が出た(尋常でなかった)
82	第1回接種の際、激しい痛みを訴え、帰りの車中で気分が悪くなりました。因果関係は分かりませんが、中学3年の春まで月経がありませんでした。入浴後体中に毎回湿疹が出ます。
83	留学、ボランティアが多いため、上記以外にA型肝炎、狂犬病、等も接種しています。
84	H24.2.14に注射した数日後、鎖骨あたりに赤い血の固まりの様なしこりができて、病院に行き、一週間から二週間で消えた。
85	病院で射つ前に、先生の方から、こういう副作用が今出ていると言われてますが、ご存知ですか？と言われたら、1回目も射たなくて済んだのに・・・と思います。
86	特に副作用はありませんでした。
87	娘(長女)が子宮頸がんワクチンを接種した頃は、少し前に有料→無料になった時で副作用の情報もあまり聞こえてきてはいませんでした。その為防げるものなら・・・と3回接種しました。腕のだるさ、しんどさがあったようですが、幸いにも、副作用に値するような症状は出ず、安心しています。しかし副作用の情報を耳にするたび、とてもこわく、二女には1回目も接種できていません。原因究明は大変難しいことと思いますが、医療の知識が無い人間に決断はできません。安心できる予防接種であってほしいものです。
88	子宮頸がんワクチン予防接種の開始の初年度でしたので、今思うと接種をかなり啓発しておりキャンペーンをくり返していました。正直なところ私(母)は、接種させたくない気持ちがあり、様子を見ていたのですが、学校の先生なども打ったかどうかのチェックをしており、結局しぶしぶ打ちました。うちの子は、特に症状が出なかったのですが、もしこれで何らかの症状が出ていたら、親として後悔しきれません。もっと任意性を持たせていただきたかったです。今後の参考にして下さい。
89	少し注射をした所が赤く腫れましたが、1～2日でなくなりました。他は特に異常はありませんでした。
90	何も変化はありませんでした。
91	もともと注射は苦手だったが、特に子宮頸がんのワクチンを打った時は、いつもより接種した方の腕に痛みがあった。他の注射の時は翌日には痛みがなくなっていたが、この時は2週間くらい痛みが残り、腕を上げることが出来なくなっていた。微熱も2～3日あった。
92	子宮頸がんワクチンの接種の2回目、3回目は注射を打った方の腕が後にとても痛く、重くなり力が入らず、次の日に部活動で支障が出る程だった。
93	打った後、うでがあがりにくくなる(痛みのため)・・・本人談。副作用の報道を見てかなりこわくなりました。無料になったからとすぐに行動した事、後悔しています。正直、今も心配しています。
94	患部が腫れた。
95	接種してしまったために娘がどこか痛いと言うとすぐこのせいではと思ってしまいます。今の所何の副反応もなかったと信じています。
96	身体症状としては何もなかったが、普通の予防接種よりも相当に痛がっていた。(うったあと数日間)。なので3回接種を本当に嫌がっていた。たまたま副作用がでなかったからよかったものの、将来子宮頸がんを予防できるならと思って接種させたが、今から考えると無理に接種させなくてもよかったかなと思う。いろいろな事例を聞くと本当に気の毒になる。親としたらどうしてくれるのかと本当に腹がたってくる。
97	あれだけ国で接種しなさいとCMまでガンガンしといて、副作用がでたらこのワクチンじゃないとかいってしんじられんわ。本当に国はうそつきだわ。たくさん女の子たちが、ひどい副作用で学校もいけれない、ねたきりになったり、記憶障害になったり、その子たちの一生をめちゃくちゃにしといてなんの責任もとらないで副作用がでた子たちの補償をちゃんとみてほしい。国が責任をとってほしい！その子たちの家族のフォローもみてほしい。テレビにみた時に本当にたいへんでなみだがでました。ちゃんと国がなんとかしないとダメです。
98	2回接種後、止めましたが、(3回接種で効果が出るなら)2回しか打っていない事で良くない事があるのかが心配です。
99	その他の予防接種のときより、腕がすごく腫れた。
100	今回の件は母子手帳を見乍ら書きました。
101	後々副反応が出るとも聞いているが、何年くらい先まで注意が必要か不安。

102	娘は他のワクチンと同じ感覚で子宮頸がんのワクチンを市の指導に従って接種しました。1回目の接種後はうでの痛みだけで済みましたが、2回目はめまいでしばらく動けなくなり、翌日には39℃を超える高熱がでました。知人の医師に相談して3度目は中止することに決めました。担当医に副反応のことをTELで伝えましたが、風邪ではないかと言われました。その後、娘と同世代の女の子が副反応で苦しんでいるのを見ていたたまれません。中止したのは正解だったと思っています。病気を防ぐワクチンのはずなのに一生彼女たちに辛い思いをうえつけてしまっています。今回の調査はきちんとデータを精査して頂いて(大きな都市ならではの数があるはず)少しでも苦しむ若い女の子のために生かしてほしいです。(母)
103	痛みなどに我慢強い娘が、サーバリックスのあまりの痛み接種後ふらりとして、病院で横になり血圧を測りました。2回目の接種もとても苦痛そうでしたが、当時は何も問題とされていなかったのを受けさせました。痛みは1週間ほど続き、ピアノを弾くのも辛そうでした。
104	今まで予防接種で、副反応が出た事が全くなく、ガーダシル時のみ、気持ち悪いと言っていた。意識が数分間なくなり、どうなるのかと思い、3回目の接種はやめました。学校に通えなくなる事はないが、国がO、Kを出したからには、副作用がある人に対して、補償してあげてほしい。もっとしっかりやるべきではないのか！母
105	子宮頸がんワクチン接種直後から半日ほど腕が上がらない。私の場合は以記以外の副作用は出ていません。
106	子宮頸がんワクチン3回目を接種した翌日、高熱が出た。病院の休診日だったので、受診せず、高熱はそれほど長引かなかった。
107	いつも痛み止めを服用しておさえているため勉強等、生活するのに影響はないがストレスがたまる。
108	私自身はニュースでおこっている手足のしびれや、うまく歩けなくなったという症状は出ていません。けれど、予防のためにと予防接種していた私と同じ年頃の女の子たちが苦しんでいる姿を見ると胸が痛みます。今回のアンケートによって、苦痛の中にいる女の子たちが一刻も早く救われるように祈ってきたいと思います。
109	幸い娘には影響はありませんでしたが、原因がわからない症状になるリスクを考えるとまだ受けていない長女には接種はおすすめしません。
110	小児科の先生の勧めで接種しました。当時は少々の副作用はあったものの、痛み弱い子が、ショックで意識を失うなど、今言われているような様々の副作用情報はありませんでした。今だったら接種しなかったと思います。たまたま副作用が出なかったのよかったものの、副作用に苦しんで見えるお子さんの今を思うと胸が痛みます。接種後すぐでない例もあるとか・・・1回目は大丈夫でも2回目に出るなど。遅れて出る例はどのくらいなのか？知らないことも多く、今だに不安に思うこともあります。突然出たらどうしよう等考えてしまいます。究明できることを切に願います。
111	ワクチンの副作用で苦しんでいる子達をテレビで見ると、とても辛く感じます。一日も早く改善できる事を心から願っています。娘が受けた頃は注射のあまりの痛さに気分が悪くなった等々、聞きました。(娘は大丈夫でしたが)予防のために打ったワクチンで体に支障がでてくるしんでいる子が一日でも早く良くなりますように。
112	注射した後、つぎの日体がだるかった。
113	同級生の女子に重度の副反応が出ました。→TVで報道の特集でもとりあげられました。大好きだったバスケットもその子は出来なくなり、学校にも通うことがムズかしい様でした。
114	私は報道がある前に全ての接種を終えましたが、今改めて報道などを見ると不安になります。
115	接種した時異常に痛かった。
116	子宮頸がんワクチン接種後、全身湿疹がでて、インフルエンザも毎年異常なく接種できたが、副作用がでるようになり、うてなくなった！成績もさがり、外に出て顔を他人に見せるのを嫌がるなど、つらい日々をおくっている！
117	高校時代の友人が副作用で、普通に歩けなくなり、車いすでの生活となってしまいました。キケンなワクチンで驚きました。
118	子宮頸がんのワクチンを接種したあとのうでは、痛かったようです。うでがあがらないと言っていました。
119	ワクチンを受けたあと2日後くらい腕が痛く身体が少しダルイような気がしました。
120	子宮頸がんの注射のあと、よく腕が痛くてあがらないと言っていた。いろいろな報道が出たのは、全部3回とも接種がおわってからだった。(子宮頸がんの予防接種の)
121	とても痛かった。3回目の時に貧血をおこしてベッドで安静にした。(子宮けいがん)
122	子宮頸がんの注射のあとよく腕が痛くてあがらないと言っていた。いろいろ報道が出たのは、3回接種したずっと後だった。(子宮頸がんの予防接種の)
123	子宮けいがんのワクチンは接種してはだめ
124	うちの娘は、何も症状はでませんでした。接種しなければ良かったと後悔しています。
125	妹もいますが、心配なので接種していません。安心して接種できるようにお願いします。

126	接種する前の説明会にも参加しました。海外では一般的に接種されていて、安全なワクチンだというふうに聞き、安全性を全く疑うことなく娘に接種させました。でも、そのワクチンが原因と思われる障害をもつことになった娘さんが何人もいると知り、とても心が痛みます。どうしてこのようなことが起きてしまったのか、本当に安全性が保障されていたのか調べていただきたいと、思いますし被害にあった方の保障をしっかりしてあげてほしいと思います。
127	接種の痛みもあったが、うったところの腫脹もひどく両液窩のリンパ節がはれてうった方の腕が1W間痛かった。
128	今までの中で腕の痛みが一番強かった。
129	子宮頸がん予防のために受けておいた方がいい「公費補助で無料だから」と接種させましたが、その後学校生活も送れない深刻な症状の方がいると報道で知り、他人事ではない怖さを感じています。我娘は17歳で受験勉強にがんばっていますが、深刻な症状の方やそのご家族の接種した12歳からの時を思うと、言葉もなく、またこの先の見えない絶望感は想像を超えていると思います。今回の調査を確実にし、その結果をぜひこれからの患者救済に生かしてほしいです。また、名古屋市では、国に先んじて無料接種した経緯とその正当性を振り返り、名古屋市の無料接種期間での患者さんへのサポートができるようにしてほしいです。
130	たまたま副作用が出なくて良かったと思っています。たくさんの方が副作用で苦しまれ、とても大変なことだと思います。今後の調査で解明でき、心配なく使用できることになってほしいです。
131	子宮頸がんを無償で受ける事に決まった初めての年代だったので、新聞やニュースなどで安全性を問題視されていることもあり、親として受けさせて本当に良いのか不安がありました。なので、すぐには受けずに様子を見ていた所、学校(高校)の方から「ワクチンをまだ受けていないようなら受けて下さい」との連絡があり、受けなくてはいけないのか?と疑心暗鬼になりながらも、受けました。が、その後「体が動かなくなった」などのニュースを知り、やっぱり不確定なワクチンを受けさせない方がよかったですと後悔しました。現在日常生活に困る支障はありませんが、「受けない」選択肢を受けてもらえるような状況が当時はなかったように感じ、国には不信感が残っています。
132	子宮頸がんワクチンは合計3回接種しました。中学生になると忙しいので、何かのタイミングで、ずれてしまうと3回接種することが難しくなると思い、慌てて予約して、順調に3回接種を終えることができました。でも、あとから、いろいろな副作用が出たとの情報を知ったときは、とてもおそろしかったです。娘には何の症状も出ませんでした。それ以降、予防接種にはとても敏感になり、日本脳炎第2期の接種も先月に打った(高3)ばかりです。中学生のときに市から案内が届きましたが、こわくてずっと様子をみてました。
133	接種後に副作用報道があり、心配、不安になりました。副作用はでていませんが、接種前に報道を見ていたら接種させていません。親として後悔する結果になったらと思うとゾッとしました。
134	確かに中1の7月にワクチン接種したのは早かったかな?と思った事がありました。生理もそろそろかなと思っていましたが、1回目接種後、いかなり鮮血が出てびっくりしました。(そのあとは2、3ヶ月こなかった、上の娘→今、高2)2回目はよくおぼえていませんが、3回目接種後生理が毎月近くなるようになりました。強いワクチンなのかな?と思いましたが、下の娘(今、中2)は接種してないのも心配です。
135	光がまぶしく感じるの、予防接種が原因なのか?と始めて知りました。神経内科を受診し脳波の検査を行い、異常がなく安心していましたが、このアンケートにより様々な症状がある事を知り、とても参考になりました。平成5年生まれの上の子は、サーバリックス3回接種しましたが何ら異常を認めませんでした。平成23年~25年にかけて、複数の予防接種を受けているので、そのせいもあるのでしょうか?
136	子宮頸がんワクチンは3回受けましたが、その時は副作用の件は知りませんでした。娘には何も異常が見られないようですが、親としては大変心配になります。副作用で苦しんでいる方の手助けをしてあげてください。定期予防接種でなければ、うけなかったと思います。
137	副作用の影響が出るのか出ないのか、はっきり説明して欲しい。将来心配です。
138	注射をととても痛がっていました。その後赤みと痛みがしばらく続きました。接種の記入方法がよく分かりませんでした。記入欄が少なすぎです。体調不良の方のケアや補償をしっかりとして欲しいです。
139	1回目接種した時に熱がでた。その後2回目、3回目は何もなかったです。
140	毎回接種した部位が半日~1日ほど痛かった。
141	何の異状もなかったのを受けて良かったと思いました。その後いろいろな報道を見、聞きし、心配しましたが、この子には何もなかったの安心しました。
142	熱心なおすすめの割にお粗末で不幸な結末にかなり不信感が残りました
143	腕が赤くはれて痛い症状が他の接種と違い長く(2週間ぐらい)続き心配しました。
144	今後、接種を勧奨するワクチンについては、副作用についてしっかりと説明することを学校などに義務づけていただきたい。

145	伝染性の疾病を予防するための注射は、やはり受けさせるべきだと思いますが、そうでない種類の予防接種に関しては自己責任となるのではないのでしょうか。強制的に接種させようとするよりも、子供にとって接種しなかった場合にかかるリスクをきちんと説明し、その上でも予防接種を拒否するのであれば、もう親の責任下の事ですので、それは仕方ないのだと思います。
146	初回の接種後に強烈な腕の痛みを訴えたため再度病院を受診したが鎮痛剤の処方のみで様子を見るように言われた。このまま腕が動かなかったらとても不安に感じたが、数日をかけて徐々に痛みは治まった。2, 3回目は痛みはやはりあったが初回ほどではなかった。
147	子宮頰がんのワクチンを打った時、横になって受け、うったあとは30分くらいそのままベッドに横になっていて下さいと言われました。うったあとに体調が悪くなる人もいますので、念のためということでした。新聞とかで、注射をうってから体が痛くなるとかいろいろな症状が出た人がいると聞き、あの時、事後の対応がよかったからなのかと思いました。
148	ワクチンの接種時期が何度かある場合、どれをかいいたらいいのか分からなかった。
149	子宮頰がんワクチンを接種した時期は中1で、学業、部活と大変忙しい時期で生活の習慣が、全て変わった頃でもありました。体調が悪くなりやすかったのはその影響が大きいと思います。
150	子宮頰がんワクチンを接種した翌日、腕がだるい、重い感じがしたが、数日後には、治った。
151	子宮けいがんワクチンは、受けた方が良くと言われていましたが、が、1回目で、問題となりましたが、子の姉(薬剤師、病院で婦人科に居る)からすすめられ、後の2回も受けました。別に異常はありませんでした。
152	ワクチンによる症状か、そうでないものか判断できない。
153	突然「接種して下さい」みたいな感じであった予防接種で、「早く受けて下さい」的なイメージがあり、我が子も慌てて接種しましたが、たまたま副作用がでなかっただけで、副作用に合ってしまった子供達が大勢おられることは、大変残念で悲しい予防接種です。元のように体が動けるようになれることを願うのと、早急に原因解明して本当に良い予防接種になっていただけますよう、お祈り申し上げます。
154	子宮頰がんワクチンの悪影響があるかどうか、心配です。
155	ワクチンを接種した数日は、接種した場所がはれてかたくなりました。腕もだるかったようです。
156	日本脳炎とDTワクチンを一緒にうったら、気持ち悪くなった。肩こりが激しい。手足がベトベトする。体がかゆくなる。情緒不安定。手に水ぼうがができる。整理整頓ができなくなった。予防接種制度をころころ変えないで欲しい。
157	「子宮ガンになって命を落とすより注射で防げるなら、市が無料でやってくれるなら自己負担もなかったすかるし・・・」と思って接種しましたが、こんなに副反応が出ると分かっていたら受けませんでした。幸いにも我が子は何も症状は出ていませんが、将来いつ起こっても不思議じゃないので、おそろしいです。因果関係を早く追求して勧奨してきたことの責任をとってもらいたい。今苦しんでいる娘さんたちを救済してほしい。二度とこんなことないようにしてほしい。そしてガン予防のために、若年層に子宮ガン、乳ガン検診を受けるように勧めるキャンペーンを行ってほしいと思います
158	ワクチンは追加をふくめすべて接種してあります。子宮けいがんのワクチンは痛みが強い？うちの子でも、ものすごく痛くて、トラウマになりそうだったと言っていました。接種後も痛く(筋肉痛のはげしい感じらしいです。)友達の中に2人ほど、痛さで病院で倒れた子が居たそうです。痛みが強くなければ1回又は接種していなかったと思います。調子を崩されてしまったお子さんが早く良くなることを祈っております。
159	1回目は特に変わりませんが、2回目は熱が出ました、39℃位。1回目に熱がでていたら2回以降は止めたかも・・・？3回目は高熱はでなかったように思います。
160	行政不信になりました。
161	質問の意図がわかりにくいです。サーバリックスを打ってよかったのかどうか、しない方がいいのか問題になっていますが各個人で決めたいと思います。私は打ってよかったと思っています。どんな予防接種でも危険はあると思います。
162	接種後、腕の腫れ、発熱、頭痛がありました。再度受診する程酷かったように記憶しています。
163	子宮頰がんワクチンは、接種した所がかなりはれて痛がっていたのを覚えています。はれは1週間ぐらい続いていました。
164	因果関係はわからないが、H27.1月に卵巣のう腫(約7cm)が見つかり摘出手術を受けた。
165	子宮頰ワクチンを受けた直後呼吸が苦しくなり、身体がいたくしばらく30分間動けなくなりました。(●)日本人にはあわないようです。その後因果関係はわかりませんが、肺炎になりました。
166	副反応がありました。嘔気、倦怠感、注射部位の異常な痛み→報告済み。安全がしっかり確認出来てから使用してほしい。本当に怖かったです。
167	子宮けいがんワクチンの後は、接種の腕が腫れ上がりしばらくさわっても痛がりました。他のクラスメイトも赤く腫れたようです。
168	予防接種の為かはっきりはしませんが、いと子の21才には、体が硬直したり、体がだるかったりとまともな生活が送れません。国からの通達にて接種をしましたが、しっかりとした調査が足らなかったと云うことははっきりしています。随分時間(接種してから)はたったものの自分の体にも不安を覚えます。

169	接種した後、打った方のうでが痛かった。(2週間程)接種した場所が、しこりのように、かたくなっていた。(けっこう長い間、一年くらいあった。いやだった！！)なにせ、痛かった！！毎回接種するのが苦痛でした。1回で終われば良いのに…
170	娘の友人が子宮頸がんの予防接種の後遺症で苦しんでいます。医療費の助成など手厚い支援をお願いしたいです。
171	このワクチンが原因なのかは分かりません。ですがワクチンを受けてから出たものばかり(頭痛など)なので、多分そうだと思います。子宮頸がんのワクチンを受けてから異常が出始めたりしました。今さっき聞いた事をすぐ忘れてしまったり、人の名前など…。
172	子宮頸がん予防接種後、腕の痛みが強く腕が上にあがらない程だった。
173	1回目の接種後、めまいで病院に居る段階で倒れ、頭を強く打ちました。4~5分で気がつきましたが死んでしまったのかと思ったぐらい怖かったです。その後の2回目、3回めの事を考えると悩みましたが3回打たなければ効果がないとの事、接種しなかった事によってもし、将来ガンになってしまったら…と思い2回、3回とももの凄いい注意を払って打ちました。2回目を打ち終えた頃、副作用の報道を見て、私も娘も子宮頸がんワクチンなんて打たない方が良かったんじゃないか「学校から用紙をもらってくるから打つべき」という思いで打ってしまった事を悔しく思っています。副作用の報道がその頃から出ているのに今頃(2年経って)になってからしか調査がこないのか。接種した医者はちゃんと報告すべき機関に報告してくれているのだろうかかと不審に思っています。(●病院)
174	接種3回終了した後、副作用があると知っても、保護者といたしましても、不安、心配でなりません。国はもっと副反応を調べてから、接種にふみきってほしいです。副作用は、接種してから何年くらいまで「カノウセイ」があるのかも、知りたいです。
175	本人は接種後、とくに不調はなかったが、副作用の症状が重いことを知り、二回目以降の接種をみあわせた。本人は周りの友人にワクチン接種をした友人が一人もいないとのことで、うたなければよかったと話していた。親としては1回だけうって放置している状況をきにはしている。
176	25年5月に2回目を接種し、25年6月~26年5月頃まで、原因不明の体調不良となり、検査入院、心療内科等多数の医療機関を受診しました。今は学校にも通っていますが、時々だるさがあり、不安を感じています。結局原因は不明でした。子宮けいがんワクチンが原因なのか不明ですが、申し出るべきか迷います。相談できる機関があると良いと思います。どこに申し出るのかも知りたいです。
177	副反応の種類、どういった副反応に気をつけるべきかなど、公表の時に詳しく発表してほしい。
178	接種勧奨よりも副反応が表れた方への手厚い補償、対応をお願いします。
179	めんどくさい
180	接種した後、体に「けだるさ」を感じ、一日横になっていました。熱がでるわけでもなく、他に症状がでるわけでもなく…接種した場所は2~3日赤くはれあがっていました。
181	17才ですがまだ生理がありません。病院へ行こうと思っています。子宮頸がんの予防接種が関係しているのか心配です。
182	高いお金を投入して 副作用の強い注射をやるより、異性間の交際(性的関係をたやすくもたないよう)について中学、高校教育で教育した方がいいのではないのでしょうか。保護者
183	接種後は腕が上がりづらかった(痛くて筋肉痛のようだった)
184	無料でガンが予防できると思い安易に接種をした事をすごく後悔しました。なぜなら、その後の副反応の怖さをTVで知ったり、まず接種者が子供を産むにあたってのデータがなかったからです。接種した事で妊娠しにくい体になっていないだろうか、卵子そのものが異常になっていないか等、もしかすると娘達がこのワクチンのせいで苦勞するような事が将来沢山出てきてしまうのではないだろうか心配でたまりません。アンケート結果と一緒にこのような不安がある事も取り上げて頂きたいです。又、接種者の妊娠、出産の経緯データも続けて調査してほしいです。安心したいです。
185	1回目の接種後、一週間近く痛みとハレがひどく、病院に行くか悩みました。(腕をあげるのも困難)その後、症状が良くなったので安心しました。2回目以降は、同じ症状が出ませんでした。
186	何日も痛みが続いたが、報道されているような副反応は無かった。
187	子宮頸がんワクチンは、とても注射が痛かった。少し熱っぽくなっただけ。
188	子宮頸がんのワクチンを注射したか所が、今でも(3年経過しても)、しこりが残っています。
189	たまたま副作用が出なかったのでよかったが今後、予防接種は受けたくない
190	副作用で、日常生活が通常に送れなくなる可能性があるのは、とても心配であり不安です。既に接種して、自分ではたまたま大きな副反応は無かったのですが、事前に副反応のリスクを知っていたら、接種(子宮頸がんワクチン)をやめていたかもしれません。自分の体をかけて、不安を持ちながらの予防接種は、意味がありません。
191	接種した時、とても痛がり、うでが動かしにくい程だったことを覚えています。
192	副反応の症状を出してください。
193	保護者が約10年前に子宮頸がんにかかり、手術、再発、転移等大変な思いをしました。子宮頸がんの予防接種は待望であり、娘が中学生になってすぐ、接種しました。今後は、副反応の出ない安全な予防接種としてぜひ確立していつてもらいたいと思います。保護者(母親)記入

194	子宮けいがんワクチン接種で体が動けなくなった方とかTVで見たり聞いたりしました、大変おそろしい事と思います。本人、親が娘の為にといい、何も疑いもせずワクチン接種したために障害者となってしまうなんて大変くやしい悲しい事と思います。本人のその時の体調にもよるのかどうか・・・ワクチンはこわい病から守るものであるのに・・・世に出す前にしっかりとそのワクチンが大丈夫なのか調べてから出してほしいです。今後悲しむ方が出ない様にのりたいたいです。
195	うちの子は、麻しんの予防接種をした時、副反応があり、はしかにかかったようになりました。Drが、めずらしいため、写真をとっていました。手足口病から、ひどい無菌症・髄膜炎になり、大変でした。副作用、本当に心配でしょう。はやく、何かしら、たすけてあげて下さい。
196	子宮頸がん予防接種を受けてその日夜～頭痛あり次の日には部活を休みました。→2回目中止依頼(親)親としてはこわくてたまらなかつた(親の職業看護師)もう嫌です。
197	今まで予防接種を受けて異常はなかったでもTV見てこわくてこわくてたまらなくなつた。この年代の予防接種は親の判断と責任、へんな予防接種を学校を通じてすすめるな！！(怒)
198	子宮頸がんワクチンによる副作用の情報がたくさんあります。(ニュース等で)実際、どうなんですか・・・悩んだ末結局うちました。
199	2回で止めたら、1回もうたなかつた方と同じなんですか?安全性が確認されたら、3回めを受けても効果はあるのでしょうか?
200	副作用の話が出る前は、子宮頸がんワクチンの接種をするつもりでした。ワクチンを接種した方がいいかどうか、早く結果が出ると良いと思います。
201	接種後、接種部位が1W間程度痛かつた。そのため物を持ちたりするのがなかなかできなかつた。また、接種後、月経が半年程度なかつたり、月経痛が重くなつたりと、月経に関する症状が強くなつた。
202	新聞やTVで報道があり心配していた所病院の方からもtelあり、おすすめしませんと言われ本人と話した結果1回目でやめてしまった。その後予防の為にもう一度うちたいが無料期間も終わってしまい、副作用の事が気になっている中途のままでどうしていいか判らない。
203	1回目より、2回目、2回目より、3回目、回が増すごとに接種後に、関節の痛み、熱がでた。(1晩で完治)
204	全部接種したが毎回うでがはれて、1週間ぐらいつづいた。接種した方がいいと思い、打つたが、これだけ副反応があるなら接種しない方がよかつた。日本脳炎も中途半端になつたので、わかるようにしてほしい。
205	子宮頸がんワクチンはアメリカにて接種、特に副反応なし。
206	日本脳炎ですが私の母子手帳によると(第1期初回・1回①2回2、第1期追加③、第2期④)6ページの表記は3回しかのつてないので第2期を3回目としました。
207	接種1回目は、かなり注射を痛がり、頭痛があり、塾をやすませた、2回目やめようと本人に促したが、受けておくとこの意思があり結局3回接種した。2回目、3回目の接種では、特に症状なかつた後で報道などでワクチンの副作用で大変な状況を聞いたりすると、親として、よかつたのかなあと不安な思いでいる。
208	ニュースで知って、とても不安になっています。ネット上では、将来不妊になる、などといった事も書かれていて、もし将来、娘が不妊に悩んだとしても、それがこの子宮頸がんワクチンのせいだとしたら、保障は、どうなるのでしょうか?このせいだと、気づかずに悩む事になりはしないかと、親として、受けさせてしまった事を悔やんでいます。国のすすめだから、何の迷いもなく、ありがたく受けた物なのに...もし、そんな事になったら私もでるとこ出ます！！親として許せません、！！
209	もうすこし慎重に、新しい事を実施する時は、検討していただきたいです。あの時障害が残っていたかも・・・と思うと今でもおそろしいです。
210	今頃、副反応の調査を必要とするようではな予防接種だかつたかと思うと、とてもおそろしいです。因果関係がないとしても、様々な意見がでる内容のものだと知っていたら接種しませんでした。医療知識の無い私達は国が勧奨するものに不信、不安は抱きません。当然のように接種しましたが、娘に申し訳なく思っています。がんの予防に役立つたと思つていますが、いろんなことが問題だと思つています。
211	今のところ、副作用とみられる症状はありませんが、今後でてくるかも知れないと思うと心配です。
212	子宮頸がんのワクチンでどのような影響が出るのかよく分からないので、分かるようにしてほしい。
213	障害(重身)があり2/8～5/8は不明です。
214	早く問題が解決することを祈っています。がんばってください。
215	今回のこの調査は、子宮頸がんワクチンを接種した身としては、事後報告させられているように感じ、まるで実験台にさせられているように感じてしまいました。もう少し違う集計の仕方があつたのではないかと考えてしまいます。
216	接種時にすごく痛みがあり、皮膚内に金属のかたまりを入れられたような違和感が数年続いた。副作用の報道後不安になつたが、3回接種後だつたため、様子見とした。今は痛みも消えたが、ワクチンの成分が体内に残つていると思うと今後が不安だ。
217	この対象の子は3回接種しましたが、接種後は他の予防接種よりはれと痛みが強かつた。同様に接種した上の子には接種後高熱が出ました。

218	症状が出た時は、ワクチンによる副作用ではないと●で言われましたが、いろいろな報道で同じ様な症状で苦しんでいる子がいることを知り、やっぱりワクチンのせいだと思いました。●区●の『●』を通して、予防接種被害の申請を●に出していますが、まだ、認定されていません。進学も、就職も大きく道を曲げられてしまって、残念です。現在も●の服用がやめられません。早く認定をお願いします。自費で中3の時に受けさせた自分にも後悔しています... (根本的な治療薬の開発も宜しく願います。)
219	子宮頸がんワクチンは受った方が良いと言われ、子供に受けさせました。今は話題になっている様な副作用がない為、安心はしておりますが、いろいろな方によってどうだったと聞かれます。TVなどで見て良いとも、悪いとも返事してあげられないので、実体を早く、皆に知らせていただける事を願っています。
220	現在、健康に問題はないが、ワクチン接種後は、体がだるく微熱もあり、夜寝返りができない程、接種部位が痛かった。
221	すべてのワクチン接種後、副反応もなく、元気に過ごしています。
222	中1で卵巣のう腫が見つかり、接種前にオペしました。幸い良性でしたが、やはり報道をみていると、接種はとても不安でした。100%の確率で安全なものはないと分かっているけど、やはり、わざわざ受けたものが裏目に出てしまったりするのは怖いです。ススめる方も開発する方も、自分の身ではないから簡単な判断なのかな、とかも思いました。
223	うちの子は特に異常もなく、接種時ニュースにはなっていたが、私自身が子宮頸がんを何度もひっかかっているから接種をしました。接種後1時間病院にいなきやいけませんでしたが、うけてよかったと思っています。
224	接種後、痛みは少なかったが月経が1年間なくなり、産婦人科に受診しました。→開始の一番最初の時だったので3回受けましたが。今も明らかに、月経等に変化があり(悪影響で)今から接種を迷っている人に相談された人には「やめたほうが良い」と言っています。私も今だったら接種しないです。
225	娘は高2(早生まれ)になりましたが3回目を受けた方がいいですか？テレビで副作用があるので、3回目はいいかなと思いますが...。保健所に聞いてみます。
226	正しい情報を発信して欲しい
227	1回目を受けた後から腕にしこりが残っています。
228	注射後、注射した部分が直径5cm程はれて、筋肉が固くなったように感じ、痛みが1週間程続く症状が出ました。
229	接種後、腕はひどく痛みがありました、(1週間程度で改善)
230	子宮頸がんワクチンをうったときに、うでがはれて、だるかったです。
231	3回め接種後、その腕にじんましんがでました。
232	1回目接種直後、打った側の耳が聞こえなくなり、クラクラして目が見えなくなり、そのまましばらく気を失いました。医者には、痛みによる迷走神経の異常だと言いましたが、血圧も下がり、とても怖い思いをしたので、2回目以降は受けませんでした。
233	安全なワクチンの開発をよろしく願います。
234	母子手帳が所在不明のため詳細がわかりません。
235	子宮頸がんを初めて接種した時。注射をして5分くらいに、めまいで倒れた。
236	今、副作用がかなり問題視されていますが、娘達が接種した頃は、その様な副作用は知りませんでした。今となっては、接種し、特に副作用も出ていませんが、もしその時、知っていたら接種しませんでした。
237	サーバリックス接種による不妊症の有無を知りたい。
238	子宮頸がん全くうける気なかったのですが、強制の様な感じもあり、まわりも受けていたので、うけました。なんだか後悔。
239	ワクチンを打った後の腕のだるさが大変でした。
240	子宮頸がんのワクチンのあと高熱、しっしんがすべての時にでました。
241	それまで予防接種で感じたことのないものすごい痛みをうったあとかなり長い時間うでに感じました。1度よりも2度目、3度目の方がはるかに痛くて、もう打ちたくないとすごく思いました。そんなふうには思ったことは一度もないので、すごく覚えています。副作用が強くてでしまう人が多いのが、なんとなくわかります。母も今だったら絶対接種させなかったと言っています。私は、とりあえず、何もなかったのは、本当にありがたいです、今からうとうかとおもう人には、すすめません。
242	打った後、腕が痛すぎて、体育ができませんでした。
243	別に痛くなかったです。
244	世間で副作用について騒がれる前だったので、深く考えず、接種券が届いたので、病院へ行って、接種したが、何事もなく良かったです。下の妹については、副作用について、日々報道されていた時期だったので、接種するか悩んだ末、接種しない選択をしました。
245	市の接種勧奨を100%信じて、子供に子宮頸がんの接種を受けさせたが後からこのような問題がおり、自分の子は幸いにも何もなかったからよかったものの、何かあったらと思うと受けさせた私自身を一生責めなければならなかったらう。もっとよく調べてからすすめて下さい。子の母より。

246	腕が重い症状が続いた記憶があります。(周囲のお友達も)
247	当時、ガンの予防になると知り、娘に受けさせました。長女は自費(15,000×3回)で受けさせました。しかし、うちの子はたまたま、副反応がありませんでしたが、副反応のあったお子様方は本当に、後悔されていると思います。このようなことをなくしてほしいです。
248	アンケートの症状欄を見て不安を感じました。ワクチンが体のどの部分(脳?)に副反応を起こしているのか、どの期間それが続くのか、導入の頃アメリカでは普通に接種されている安心だという情報があったのが、なぜ日本人には副反応が広く起きているのかという点について、広く新聞等で知らせてほしい。
249	アンケートをきっかけに自分の体の不調を、ワクチンの副反応と結びつけて考えてしまう子が出てくることを心配しています。月経不順などは、年頃の娘は誰でもあることでは?と思います。体についての十分な知識がない子どもが必要以上に不安になることを考慮して、アンケートの結果と共に報告をしてほしい。
250	国や市の積極的な勧奨があり、良い事ばかりがアピールされ子供の将来のことを思い、接種を受けました。しかし 接種により様々な症状が出ていることを知り、大変驚きショックを受けました。症状が出た子供達に対して、国や市はしっかりとした対応して頂きたいと思います。
251	ワクチン1回目接種した次の日は、腕がすごくだるいと言っていた。娘は6日でおさまったが、友人のなかには体がだるくて欠席(1日)してる子もいた。重篤な副反応があると知らなかったため、3回がんばって接種したが知っていたら受けませんでした。かわいそうでした。(毎回だるくなったので)
252	公表する時に回答した子ども達がわかりやすく、見やすく公表して頂けたらうれしいです。
253	子宮頸ガンワクチンに不安がありましたが婦人科の先生にすすめられて接種しました。しかし、現在の体調を考えると受けなければ良かったと深く後悔しています。
254	4/8のその他の症状を参照。
255	「小学6年生以降に・・・」というくだりですが、質問4について質問の書き方に工夫が必要です。母子手帳を見ながらすべての接種済のワクチンを記入するところでした。
256	子宮頸がんのワクチンの後遺症が今後でるのか不安である。
257	子宮頸がんワクチンについて副反応は報道されていますが、子宮頸がん罹患は報道されません。このため判断を誤ってしまう人がいると思われまます。無料の接種は是非続けてほしいです。
258	子宮頸がんワクチンを受けた人全員に健診券を出してほしい。
259	一部のお子様の後遺症で、このワクチン接種が消滅する事は望ましくありません。我が子はたまたま幸いにも後遺症はありませんでしたが、ワクチンが身体に合わずにそのような事が起きた事には必ず何らかの理由があるはずです。なる子とならなかった子ではなく、全ての子供が安全に確実にワクチンを受ける事ができるような開発を願います。
260	娘は問題なく生活しています。
261	色んな副さようが出ていると聞き、心配しています。特に注射が(子宮けいがん)痛かったそうですのでその後は、インフルエンザ等もひかえています。今後、子宮けいがんの予防接種による、害が多発し、子供にも出産時期等に影響があった場合、団体でうったえられる機関をもうけて欲しいです。不安です。
262	上の子(●)は子宮頸がんの予防接種は3回受けて無事でしたが、副反応でそれまで健康だった子供達が苦しんでいるニュース等を見て下の子は受けさせていません。
263	1回目で高熱が出ましたが2回目、3回目接種後は異常はありませんでした。
264	一緒に受けた子は、注射した時、痛みがすごく、腕が上がらなくなる位だと言っていたのですが、うちは全くそのようなことはなく終わりました。
265	子宮頸がんワクチン2回目接種時に1回目の時の痛みと手先のしびれがあった事を医師にも伝えましたが「こんなものだよ」と言われ3回まで打ちました。今後この様な事があっては絶対にダメだと思います。ありとあらゆる検査をしましたが数値に特別な異常が出ず体は健康と言われてしまいます。しかし、神経は生きてると言われますが半身まひは治りません。この年齢で毎回導尿をし生理も止まり、どーか助けて下さい!!1秒でも早く治療法を見つける力を貸して下さい。毎回地獄なんです。夢は変える事になってしまったけど日々がんばってます。まだ諦めたくないです。皆と同じ生活を早くしたいです。よろしく願います。
266	1回目の接種で広い範囲が腫れて腕がおもく感じるなど副反応が出たが、公費負担の対象だったため、接種間隔を適切に実施した。しかし、体調が悪くなる等の本人の訴えはつづいていた。(友人も同様だった。)その後、副反応の報道が出て、親子で、驚くとともに、親として、子供に悪い事をしたと接種させたこと、後悔をした。幸い報道の様な大変な副反応はなく、現在は元気であるが、今でも後悔している。何を信じたらいいのか?今も苦しむ若い少女達、親たちの援助を望みます。
267	接種後、腕の筋肉痛のようなものが1日程度感じられた。
268	無料になるのをまって接種しましたが、報道でみる副反応があると知っていたら接種しませんでした。

269	子宮頸がんワクチンは、予防効果が高いという事だったので、親の奨めで、接種しました。注射自体は痛かったですが、特に副作用は3回共ありませんでした。子どもの頃から、予防接種は必要だと思われるものはほとんど受けてきました。接種の時に注意することは、体調の良し悪しで、親の話では、体調の悪い時には接種を見合わせ、次の機会(体調の良い時)を待つことで、ほとんどの予防接種で副作用の経験を経験をせずに済みました。
270	子宮頸がんワクチンを1回目接種後はものすごく痛みがあり、しばらくうでが上がりませんでした。先生からは「針が長い為 筋肉の奥までささっているからと言われました。2回目以降はこんなものかと気にせずに接種させていました。とにかく痛みがつよい様でした。(普段はあまり痛みがありません)
271	注射後、何日が筋肉痛のような痛みが、腕にあったみたいだが、せつかくあと1回というところで、副作用の恐ろしい報道があり、3回目はやめてしまった。予防接種は大事だと思うが、今のままでは3回目の接種は恐ろしくてできません。2回の接種でも十分なのか、また最初からやり直しになるのか、説明してほしいし、安全なワクチンを提供して欲しい。
272	今後調子が悪くなったとき、それがワクチンの影響なのか別の原因なのかわからない。不安です。
273	海外の先進国ではかなり導入されているとニュースで見ましたが、他国においての副作用についての情報は殆んど流されていないと思います。世界全体での、統計を知りたいです。下の娘(現在中2)については、不安があってもまだ接種させていません。
274	接種の2回目の時けいれんなど体調の不調を覚えた。
275	月経が不順なのが今、心配しています。中学時なのでまだ定期的になくてもしかたないと思っていましたが、年に2~3回なので、婦人科に受診しようと思っています。ワクチンを接種した事で、とは思っていませんが、少し心配です。今、小学6年生の娘もいるのですが、子宮頸がんのワクチンが安心して接種できるといいなあと思います。
276	ワクチン接種後1週間くらい、接種部分が痛くて腕が上がりませんでしたことを覚えています。
277	質問文があいまいでわかりにくかった。予防接種前と後の変化みたいなものを聞いてくれるのかなと思ってました。ちなみに、私は子宮頸がんワクチンの接種の直後、少しめまいがして、歩くとフワフワした。その接種の月は月経不順があった(月1回のところ、2回起きた)こういった症状は質問2にはふくめなくて良かったということなのか。いまいちわかりにくい気がした。
278	打つべきか否か、科学的に明言することが、求められます。
279	子宮頸がんワクチンの接種をしてから、急激に全身のむくみが出はじめ、今だにむくみで悩まされています。むくみからか、一気に体重も増加し、何をしても体重の増加がとまりません。今はむくみの治療をして体調のバランスが崩れないようにしています。知り合いの子も、ワクチンの接種が済んでから、同じく一気に体重増加し、大変な思いをしている人がいます。やっぱりホルモンに何らかの影響があるのでしょか？
280	小学校に入学する前から毎年インフルエンザの予防接種をさせています。子宮頸がんワクチンは、年齢的に無料になる前から接種が解禁になってすぐ打ちました。1、2回は実費で、3回目だけ無料で受けました。インフルエンザの予防接種と同様少し赤くはれた(うった所)程度で他に別にかわった所はありませんでした。受けてよかったと思っています。
281	接種を受ける用紙と共に、この調査表を送って頂いた方が良かったとおもいます。
282	副作用の報道を見て、1回目を接種してから辞めています。早く原因がわかり、安心して接種できるようになってほしいです、そしてこのような理由で接種を中断しているのが対象年齢から外れても無料接種できるようにお願いいたします。
283	身近な人が副作用で車いすの生活になってしまいました。
284	安全なワクチンを開発されることを望みます。
285	3回目を受けてから39.5℃の熱がでました。
286	接種したぐらいから、時々片頭痛がある様な気がする。本人いわく手に力が入らない事が時々あるらしいが、日常生活には問題はない。自己ホルモン注射でなれている子ですがひかづ的痛みには強い方だが、この予防注射は、かなり痛いらしいです。本人によると。
287	子宮頸がんの注射はかなり痛いと言っていたが、予防できるものならと、3回きちんと受けました。自分の子供は何も異常がでなくてほっとしていますが、歩けなくなってしまったという子がいたと聞いてゾッとしました。早く、何が原因なのがつきとめて、安心して受けられる様にしていきたいです。私もその話を聞いた後なら、打つのをやめていたと思います。
288	サーバリックス3回目接種したあと、半年位左うでが肩より上にあがらず痛みがありました。その後なくなりました。
289	1回目の接種より2回目方が接種したうでが腫れて本人もしばらく(1~2日間くらい)痛がってはいました。持病(こう原病)がある為、主治医にも接種をすすめられ、比較的早い時期に接種を受けましたが腫れを痛がる以外は今のところ気になる症状はないようです。
290	接種する時は、副作用も心配しましたが、思いきって接種しました。結果的に接種前と後では なんの変化もなくよかったです。母より
291	副反応に苦しむ方々への支援を手厚くしてほしいです

292	確かに筋肉注射であるため、注射後の痛みはありましたが、我慢できるものでした。人によって痛みの個人差はあると思うので、はっきりとは言えませんが、結局は本人の気の持ちようなのではないかと思えます。
293	腕が上がりにくい程痛かったと聞いて臨みましたが、注射も副反応の痛みもなく済んで良かったです。
294	我が子には副作用として、何が影響として出ているのかはわかりません。元気で生活しています。しかし、子宮頸がんワクチンを無料で受けられるし、将来的にも、がんになるリスクが少なくなると信じ痛みの強い予防接種を受けさせました。他の方では重篤な副作用が出て、その後の生活を狂わされてしまったお子さんもいて、とても恐ろしいことであるし、そんな恐ろしいものを良いと信じ受けさせた自分が恐いです。もっと、きちんと臨床試験など、出来なかったものなのではないでしょうか。あまりにも、ずさんです。…母より
295	H22～26まで海外在住の為、子宮頸がんワクチン接種も海外です。
296	赤くはれあがって、痛かった。3回共、すべて、インフルエンザ予防注射もすぐ、その場で赤く痛みを感じるけど、それ以上に赤くはれ痛みもひどかった。
297	このような恐ろしい副反応が出ることもあるワクチンを3回も接種したなんて、ゾッとします。
298	子宮頸がんワクチンを悩んだ末、受けなかったら、高校に入ってから、保健体育の先生に、「信じられない」と言われ、受けることにしました。副作用が出なかったから良かったものの、これで何かあったら、悔やんでも悔やみきれません。もっと安全を確認してから、ゴーサインを出して欲しいです。
299	子宮頸Kワクチンを、問診表を学校からうけとり次第すぐ接種しました。その際Drは副作用等の説明はなく、3回無事終了でき、現在、問題となっているような副反応もなく本当に良かったとおもいます。今なら接種は絶対しません。
300	予防接種の後遺症に悩む方々に心を痛めています。H27.12月に公表する予定とのことですが、結果はこのアンケートのように各家庭に送付して欲しい。うちの子のめまいなども後遺症なのかとうたがってしまいます
301	H.25.4.27 全身にけいれん症状が出て●へ救急でかかりました。この予防接種との関連はわかりませんが手の指のけいれんは2週間程続きました。現在は何ともありませんが、突然だったので驚きその時の医師もけいれんの接種が関係ないとは言えないですとのことでした。
302	子宮頸がん予防接種が原因と疑われる副作用が出ていることについて、もっとくわしい情報を出してほしい。全体の接種者のうちどの程度の割合でそのような症状が出ているのかや、その症状が出ている方は2種類のワクチンのどちらを接種したのかなど、詳細を知りたい。今後接種対象の子供を持つ親として接種するべきかしないべきかの判断材料がほしい。
303	接種後、腕全体がすごく痛く、動かさないほどだった。数日で痛みはとれたが、今、後遺症の話を書き、とても怖いと思った。
304	子宮頸がんワクチン接種後、副作用が全くない為、翌日より、部活(バスケットボール)に参加し、その後2回共同じように翌日からハードな運動部に参加してました。結果、歳の離れた妹にも躊躇なく接種するつもりでいます。
305	子宮頸がんワクチンは受けるべきだと思います。
306	接種を受ける頃はまだ副反応の報道などは公にでておらず、名古屋市が無料で受けられる制度を開始したということで、疑いもなく、かかりつけの婦人科の先生も勧奨しておられましたので、受けました。予防接種には副反応がありうるものですが、よかれと思っていたものも、今後の娘の人生に大きな影を落とすことになるようなことがあるとしたら、いてもたってもいられません。
307	2002年生まれの子は怖くて接種していません。安全性を早く確立して下さい。
308	2回目を受けた後、報道をみて心配になって2年近く3回目をうてませんでした。2回目まで接種していた小児科でもあまりうちたくない感じ…なので余計にうてませんでした。しかし、たまたま受診した産婦人科ですすめられ、やっと3回目をうてる機会がもてました。もちろん接種した後はすごく痛みがあり、かわいそうでしたが、ガンなどの予防になるなら接種できてよかったです
309	2回目を接種した頃から報道がよくするようになった事が原因か2回目まで接種していた小児科でもう“接種する人がいない”とあまりうちでは受けてほしくない感がとてもあり、こちらも不安になってくるのでうちづらくなり、しばらく様子を見ていましたが、中3の時に産婦人科を受診する事があり、そこで3回目を接種する事をすすめられて、接種する事ができました。報道などのためにこのように途中でやめてしまっている子がたくさんいると思いますので、1、2回と接種してたいして異常のない子(もちろんすごい痛いみたいですがうちもそうでした。)は接種した方がよいと思います。うちも接種を終えることができよかったです。あと、あまりに色々な医療機関で接種できるのが問題では？婦人科のみで接種するとかにした方がよいと思いました(説明がしっかりしている)
310	子宮頸がんワクチンを3回接種しましたが、注射がすごく痛かったし、直径4cmほどのはれが、2週間くらい続きました。
311	ワクチン番号1回目AHPVA143AA、2回目AHPVA143CA、3回目AHPVA161BA
312	接種を受けた直後は、特になんの異常もありませんでした。勉学への影響についてのアンケート部分に、その他の項目がほしかったです。

313	うちの子どもは、何も症状が出ていませんが、たくさんの方が、後遺症に悩まされているとの事ですので早く、改善してあげて下さい。
314	私の名古屋市の知人が副反応で苦しんでいます。助けてください。
315	性同一障害で、男性ホルモンを射っているので、現在月経はありません。
316	3回受けましたが、薬がきつかったか、腕がしばらく間上へ上げる事が出来ず、つらそうでした。体も少しだるそうにしていました。友人にも、体調がしばらく悪いような人がいたそうです。確実に大丈夫だという薬を提供して欲しいです。
317	娘は質問2. の項目のような症状が特に出ているが、3回接種後に副作用で苦しんでいる同じぐらいの娘さんのニュースを見て主人と2人で言葉を失いました。お母さん達はネットが主となった今、ガンで苦しんでいる遠くはなれた友人達を知り、「この予防接種はぜひ受けさせたい」と喜んでいて。そのくらい期待の高かった予防接種だった事もあり、わが家でも娘に受けさせたけれど、副作用のあった娘さん達の親、そして接種した医者も後悔していると思う。彼女達にはなんの罪のないのだから。接種に関してGOサインを出した人達、製薬会社には、苦しんでいる方達の生活の支えになる援助をしてもらいたいです。
318	調査上関係あるかわかりませんがちなみに初潮は小学4年生と早かった方だと思います。
319	3回とも受けたが、家に帰ってからおなかがとても痛くなり、生理が来て、生理痛もいつもよりひどく、学校を休むくらいひどかった。毎回でした
320	娘にとっては何の異常はなかったのですが、接種後はインフルエンザ時に比べるとかなり心配はしてました。というのかなり痛がったからです。一週間以上は痛がりました。水で冷やしたり、運動を控えたり…と対処していました。あとからわかったのですが筋肉注射だから、少々痛みが強くあり、長びいたりする、という事で納得しました。割と予防注射は接種してきましたが痛みようは一番印象に残っていました。
321	子宮ケイガンの副作用を知ってから今まで気楽に受けていた予防接種が受けられなくなりました。副作用が悪くて。子供になんの副作用も出なくホッとします。
322	私は予防接種を受けても異常がないので受けてよかったと思うし、このまま健康でいられたら、この予防接種に感謝すると思います。でもその一方で副作用をおこしている方がいるのはとても悲しく、自分が健康でいられているのに、と複雑な気持ちでいっぱいです。私たちのための予防接種を無料で受けさせてくれてありがとうございます。副作用を抑える薬がたくさん開発され、すべての皆さんの健康が守られることを願います。
323	産婦人科で受けたら、30分程度は様子を見るために、院内にいるようにと言われて3回とも、いたのに、他の病院などはすぐに帰ってもよいと言われていたそう…そこはしっかりやった方がいいと思う。
324	3回ともとても痛かったです
325	ワクチンの副反応について情報公開が遅かった。アンケートを実施するのも遅いと思う。
326	娘の高校の同級生は身体の右半分が不随となる副反応が出ました。これから先のことも大事ですが、既に副反応に苦しんでいる子供たちの保障してあげてほしいです。もしかしたら自分の娘がそうなった可能性もあると考えるととても怖いです。
327	何か、ワクチン接種で問題がある場合は速かに公表して欲しい。
328	アンケートが複雑すぎる。子宮頸がんのワクチンだけのアンケートにしてほしい。
329	副作用が出てしまった方は本当に気のどくでさぞつらい思いをして見えるでしょうね、我が子であったらと思うと他人事ではありません。しかし予防接種の大切さもわかります。不幸な事故はあってはならないと思いますがゼロになる性質のものでもないと思います。特に子宮頸がんワクチンでは不明な部分が解明されていないのならば本人の選択に委ねるのが良いのではないのでしょうか。
330	筋肉注射が痛くて2日位頭を洗うことや、手を動かす作業が大変だった。
331	子宮頸がん接種、初回22. 10. 30サーボックス、2回目22. 12. 2サーボックス、3回目23. 6. 4サーボックス
332	副作用は無かったが、皆(私もふくめ)打った所はポンポンにはれてて、軽いボディタッチも痛いくらいだった。(3日間ぐらいはれあがっていた)
333	子宮頸がんワクチンの初回接種後、頭痛がありました。副反応なのかは分かりませんが、普段頭痛がなかったので驚きました。2回目、3回目接種後は体調の変化はありませんでした。
334	接種後にTV等で副作用の事を伝えていて、見ていて怖かった。何も無く娘はすんだが、接種前に目にしていたら接種しなかったと思う。
335	娘は副反応が出なくてワクチンを接種して病気が防げるという安心感が得られたが不幸にして 副作用が出た方は大変お気の毒に思います。重篤な方がいるとTVで見ましたが、ワクチンの副作用が原因なのか、究明して頂きたいです
336	何も異常なしワクチンをうった時は痛いとは言っていました。同じ高校の1つ上の先輩が接種したことで車椅子になってしまいました。
337	子宮頸がんワクチン1回目接種した夜全身の痛みで夜が寝つくことができない状態でした。(次の朝からは大丈夫でした。)2回目3回目は、何も副作用はありません。とても怖かった事を覚えています。
338	受けた後、患部がはれてすごく痛かった。

339	子どもの接種について非常に迷いがあった。任意とはいえほぼ強制的様の風潮があり、接種しなくてももし将来何かあったら親の責任…かと思ひ、接種させた。が2回目を打ったあたりより副作用の報道が始め非常に不安の中3回終了、幸い我が子には何も出なかったがその後報道等により今中2の次女は接種は全く考えられない。私(母)は認知症クリニックに勤務していて当クリニックに子宮頸がんワクチンの副作用とみられる女兒が数人来院し治療した。重症な子どもは居なかったが倦怠感や記憶障害が主で日常生活も困難である事からわざわざ遠方から来院。そういう事を目にするとは何も起きない接種した娘も何かしら罹患していないだろうかと大変不安である。(不妊等)
340	無料接種、年齢以上の娘二人も実費で2回受けた後接種中止になり2回でも効果があるのか？無駄なお金を払ったのか？知りたいです。副反応の様子などを見てからは接種させる勇気はありませんでした。調査結果の公表をしっかりと下さい。
341	子宮頸がんワクチンを2回で止めたが効果があるかが気になる。新めて接種しようと思うとやっぱり母親としては心配になる。どんな予防注射にも副作用はあるが自分の娘に副作用が出たらと思うとやっぱり迷ってしまう。2回でも少しでも効果があるなら気持ち的には3回目は接種しないと思う。2回でも効果はありますか？
342	副作用のこともあり、最も健康状態が良好な時に接種しました。(親の判断で、なんとなくです)
343	子宮頸がんワクチンは赤くはれ痛みがりましたが、我慢できない程ではありませんでした。
344	子宮頸がんのワクチン接種時に痛みがあった。翌日から2〜3日接種した腕が痛く、肩が上がらなかった。(筋肉痛のような痛み。)
345	集中力、視力に関しては、そく湾症が原因と説明されています。生理、冷え、寝つけないことに関して思春期の問題ととらえて心配しておりませんでした。このアンケートで逆に今までの接種で何か？と心配になりました。この症状は何が原因でどうしてこんなふうになるのか？質問の意図を知りたいです。子宮頸がんワクチンに関しては、身近な子供の友人の姉等で、3回済んでないうちに初体験を済ませてしまい1〜2回接種した意味がなかった等の話から、接種できる歳になりすぐに受けさせました。ニュースなどで心配はありましたが、1・2・3回でもしも間をあけると効果がどうなるか？の説明も医師がして下さいました。不妊だけが心配です。今の所は不順な時もありますが年相応なので…。リスクや効果がわかりやすいと助かり安心します。
346	友人が子宮頸がんワクチンの接種後、体の痛みにより学校を休んだ。
347	1回目接種後うでが痛くうでが上らず37.4℃の熱が出た、1週間後に症状が消失。接種をうけた病院へ行くも、様子観察のみ、その後、2回目、3回目は、症状が現れず。
348	子宮頸がんワクチン3回接種しましたが、全く副作用はありませんでした。
349	2〜3日、痛かった。はれた感じがあった。
350	国がすすめた予防接種を何の迷いもなく娘に受けさせました。幸い副作用は起きませんでしたが、接種時に副作用が起きたとすると、その時点では大丈夫でも長い経過をへて何か副作用が出てくるのでは？という強い不安感を持っています。なぜこんなに長い間結論が得られないのでしょうか？副作用で苦しむ方の救済と一日も早い結論が出せるよう努力していただきたいです。
351	子宮頸がんワクチンを接種した3回目の時接種後、2〜3時間軽度のしびれがありました。(接種した左腕のみ)
352	1回目は全く痛みはなかった。(後日も)2日目と3回目が同様の痛みが3日間くらいつづいたのち引いた。特に副作用は見られなかったと思う。
353	子宮頸がんとは関係ありませんが市長の汚い名古屋弁の使用をただちにやめていただきたいです。
354	アンケート等の対応が遅い。
355	記入が見づらくすみません。
356	1ヵ月後(2回目)からの味覚の変化があり、甘いものや油っこいものが食べれなくなりました。起立性調節障害が悪化し休職しました。これから検査を受けます。
357	途中で止めなかったが、かなり腕がはれあがり、熱を持って痛かった。
358	接種時、接種後とても痛く辛かったです。普通の注射は痛いと感じた事がないのに激痛と言ってもいいほど痛かったです。当時は運転をしており、腕が痛く部活動やその他に支障が出ていたのでとてもいやでした。何よりも筋肉に注射をするという事が怖かったです。
359	結局のところ、私の症状は子宮頸がんワクチンの副作用なのでしょうか？何故、こんな目にあわなければいけなかったのでしょうか？とても辛いです
360	副作用が酷かったです。腕が重い・腕が痛い・身体がだるい→3日間程。1回目接種後症状が酷かった為病院受診。2回・3回が憂鬱でした(できるなら止めたかった)
361	返却用の封筒がもう少し大きいとよかったです。
362	接種の翌日から体調をくずし、主治医や他院を何件もまわり、症状を訴えたが、学校に行けないくらい体調が悪く、食事ほとんどとれない日が4ヶ月以上続いたにもかかわらず、検査をしても明確な異常が見当たらず「このワクチンでそのような副反応は報告されていない」と言われるばかり。でも絶対ワクチンの副反応だと確信しています。今でも疲れがたまったりするとこの時と同じような症状が現れます。TVやネットでみる重症の人のようになるのではと、ドキドキします。

363	副反応というのは個人差もあると思いますが接種してからすぐ出るのか時間が経ってから出るのか？接種3回目は本人と話し合って検診をすれば良いという結論に至りその方が万が一のリスクを少ない方で選び決定しました。
364	起立性調整障害で中1～高2の現在まで初春の時期1～3カ月頭痛・はきけ・めまい・腹痛などで学校を休むようになっていた。ワクチンと関係あるのか？！
365	質問2は非常に答えに困る質問です。なしとは書きますが、直接的原因ではないかもしれないからです。成長期なのでそれが症状かどうかわかりません。
366	アンケート用紙を封筒に入れにくかった
367	子宮頸がんを打った左腕の部分をたまに強くぶつけたりすると痛みが出ることもある。
368	子宮頸がんワクチンを接種した夜は腕がパンパンに赤く腫れ熱を帯びていました(上腕)本人はものすごく痛がり夜通し痛みで泣いており、眠れない程でした。眠れないのは一晩でしたが1週間位、腫れ痛みは治まりませんでした。(以上1・2回目接種)3回目接種時はそれ程腫れませんでした。やはり暫く痛がっていました。現在は元気に生活していますが副反応の症状に悩まされている方は本当にお気の毒に感じます。なので私は接種に賛成できません。
369	子宮頸がんワクチン1回目接種後(5分後くらい)に嘔吐した。
370	苦しんでいる方々に一刻も早く手厚い援助を希望します
371	背中への痛みが特に強くありましたが、成長痛かもしれないと思ったり副作用かどうかは不明
372	少しでもはやく(すでに受けたものとしては)情報がほしかった。このアンケートも今さらの感がある。市として国へも結論が出る方向へ要望を出して欲しい。
373	インフルエンザの予防接種を無料にしてほしいです。死んでからでは遅いです。
374	どうして子宮頸がんワクチンがあんなによいといわれていたのにこんなに、ひどく副作用がでることになったのかははっきりしてほしい→経緯を公表し責任を明確にし副作用で苦しむ人に一生責任をとってほしい。副作用の%が他より高いかどうかつつみかくさず公表してほしい。ほんとうに3回めをうたずによかったと思い自分の友人に感謝している。少子化、高齢初産化にも影響する大問題だと思う。
375	3回接種しましたが毎回調子が悪くなりました(頭痛・微熱・だるさなど)接種した。翌日はたいてい学校を休みました。症状は1日ぐらいで良くなりましたし今現在、特に悪いところはありません。
376	子宮頸がんワクチンの接種はしましたが、本人や友達はかなり痛みと腕のだるさを口にしていました。部活をやっていたので接種は定期テスト前の部活休みにしたのですが、腕のだるくてテスト勉強の字が書きづらいついていました。特に副作用が長く続く事はありませんでした。
377	苦しんでいる子供達を助けてあげて下さい。
378	原因不明の手足のむくみ、関節痛(時には痛くて歩きにくいときもある)シップや●を使用するなど。
379	2回目の接種後、腕全体の痛みが3日以上つづきました。
380	(質問5-2)←この質問の意味がわからない。2回接種でいいんじゃないのか？そんなに何回もするものなのか？
381	本人が国内に居ないので詳しくはわかりませんが、ニュースで報道されたような副作用はみられませんでしたし、体調などの変化も特になかったと思います
382	子宮頸がんの予防接種開始の頃で接種しましたが、その後次々と予防接種を打った後に後遺症が発表され幸い何事ありませんでしたが、怖いなと思いました。関係性をハッキリさせてもらいたいと思います。子宮頸がん予防接種はかなり痛い聞いていたので、打つ時はかなり緊張し、先生や看護師さんの「リラックス」「力、入れない方がいいよ」と言葉をかけていただきました。確かにかなり痛かったです。
383	子宮頸がんワクチン接種から原因不明の発熱、身体の痛みがよくある。
384	これまでのところ、特に副作用が無かったことをありがたいことだと思っております。接種直後は腕を痛がっていましたが、翌日には部活動(体育系)にも参加できてきました。
385	注射を接種すると痛くてきき手ではない方に打ってもらった。TVで副作用の話題をみる度、無事に注射がうてたのと副作用がなかった安堵感があり、副作用のひどい子を見ると、他人事には思えない。安全安心でなければ注射を打つリスクが高すぎると思う
386	予防接種で、しかも中学生になって受けたのに、尋常ではない痛さで、当日、翌日も痛い友人達も口々に言っていたようです。ニュースなどで接種された後、震えや色々の症状で、日常生活に、支障がでているのを見て、恐しかったです。因果関係が証明されていないという事ですが、親としてもとても、それでは、終わらないです。誰が症状にでるか、わからない感じで、見ていて気の毒です。どうか手厚いフォローをしてあげてほしいです。
387	子宮頸がん注射は、1回目が思ったより痛く、痛みも1週間くらい続きました。2・3回目は痛くなかった。もし副反応の報道を見ていたら、2・3回は接種しなかったでしょう。周りの友人は1回であきらめた人が多かった。
388	姉がハンズです。自分も出るか不安です。

389	二人娘がいますが、案内があった時は当然、他の予防接種同様、接種しなければならないと思い、当たり前のように接種しましたが、いろいろ後遺症をTVなどで知り、打たなければよかったと後悔しています。今のところ、幸いにも目立った症状はないのですが、国としてすすめる以上きちんと検証してリスクも知らせた上で案内してほしいです。母親として!!
390	娘二人共、何の疑問もなく接種してしまいましたが、今、もし戻れるなら絶対接種しませんでした。たまたま、うちの子にも目立った症状はありませんが、ニュースなどで目を見ると、本当に他人事ではないように感じます。国として推める以上責任をもってお検証してほしいです(母親より)
391	強い副反応(他覚的に判別できないもの)があるケースは、親に強制されたりなど精神的に影響が大きいなどの背景は無かったのでしょうか?ご検証を。当ワクチンの対象となる疾患の特殊性や感染経路など、性行動とも無関係ではないので、どうなのかな?と思いましたので。
392	私はHANS症候群で県外で治療しています
393	迷った末に1度目の接種、直後に副反応の報道が出ました。必ず3回接種するよう言われていましたが、とてもじゃないですか?恐ろしくてできません。1度打った事も後悔しています。どうか副反応に苦しんでいる少女達を助けてあげて下さい。たまたま我が子はそういった事にならなかつただけで、人事ではありません。どうぞよろしくお祈りします。
394	3回目の子宮頸がんの予防接種をやっていないので将来にわたり、心配があります
395	初潮が中3の秋でかなり遅かった為、小児科と婦人科を受診した(中2の頃)以降、生理不順(過多月経が高2以降)がずっと続いており、PMS様の症状もかなり強い。近々再度受診予定である。子宮ガンワクチンの接種後の痛み(腕)はかなり長く続いたので当時心配はした。父母共にガン家系の為、接種したが、そうでなかったなら、していなかったかもしれない。
396	子宮頸がんワクチンの副作用は現在なければ心配ないのか?将来的なことも含め心配です。
397	一時、ひどい頭痛、体の痛み、だるいで朝起きられず、●病院でMRIや特殊な筋肉の病気を調べる血液検査をしましたが、異常は認められず。体の痛みは日替わりで場所が異なり、ぼんやりしがちで学校で要注意視されかけたことも。H26.12~H27.4。病院での検査後、副作用の事をニュースで見えて知りました。血縁者にガンで亡くなる率が高いだけでなく、予防接種の副作用の末、いところが死んだので残念です。
398	ワクチンの副反応については大変心配しています。OKが出ても、周りの様子を見ながらの接種だと思えます。無理して受けないかも……。
399	2回目の注射をした後に、熱っぽさ、だるさ、頭痛の症状が出た。当時副作用について重要視されてなかったから、私は注射をしてから体の変化を感じていたのに誰からも軽視された。副作用の重症者のニュースが出てから「あの時の……」って話になったがワクチンをやる前にもっともっと説明が欲しかったし、安全性も十分確認してからやってほしかった。私の知人はこのワクチンで人生が狂った人もいる。本当に怖かった。
400	他の予防接種では何も出なかったのですが、サーバリックスは赤くはれ、腕がだるい、痛いとは毎回言っていました。
401	子宮頸がんを打ったあと、筋肉痛の様な痛みがしばらく(何ヶ月)続きました。
402	子宮頸がんワクチンを接種したから、しばらくの間だるさが続いた。
403	予防接種の中で一番痛かった。
404	子宮頸がんワクチンの副作用と思われる症状で苦しんでいる人のニュースを見る度、気の毒に思うとともに、もし我が子がそうなっていたら……と想像するだけでゾッとします。何も知らず3回予防接種をして何ともなく今まで過ごしておりますが、ただ運がよかつただけなのではないかと思えますし、副作用のことを知っていたら接種はしませんでした。予防接種にはもちろん多少のリスクがあることは承知していますが、ひどい例が出ているからこそ、このような調査をするのでしょうかし、ぜひとも原因をつきとめていただきたいです。今も苦しんでいる人たちの症状が少しでもよくなりますように祈っています。
405	姉妹で接種しましたが長女はサーバリックス、2年下の次女はガーダシルになってしまい、2年下の姉は接種後倒れました。副反応の報道を見る度に不安な不審な気分になっています。親は子供が将来子宮頸がんにかかる可能性が回避できるのなら……という思いで接種させます。こんな副反応の報道がもう少し早く出ていたらもっと慎重になれていたと思います。
406	副作用の報道前に接種を受けたが注射は異常に痛く毎回数日寝込んでいた。とても耐え難い様子であった。接種対象が始まったばかりで途中ワクチンが足りなくなったりしているうちに娘は対象学年から外れ、自己負担で接種後に再び対象(無料)に含まれることになり、とても憤りを感じた記憶が残っています。
407	3回接種しましたが、2回目のときは体調がわるくなりました。微熱が出て気持ち悪くなりました。(上の子・3回はだいじょうぶでした)2、3回でよくなった気がしましたので下の子にも今年接種しましたが1回目は、よかったのですが、2回目の時は注射がかなりいたかったといっていたら微勢2週間つづいて、頭がいたくてクラクラするといっていました。3回目を考え中です。(接種した日からよくなるまで部活動は休ませてました。)

408	以前より疲れやすくなったり、頭が痛いと言う時もありますが、それがワクチン接種の影響なのか成長に伴うものなのか、判断が付きません。しかしながら2回接種した後、副作用の恐れがあるとの報道を観て、3回目を受けませんでした。その事で将来子宮頸がんが発病してしまう事も怖いのです。正しい見解を確実に報道していただきたいと願っております。
409	毎日横になると腰が痛い。うつ伏せができません。
410	接種勧奨があるがままに接種をしました。この接種が正しかったのかが不安です。娘には副反応が出なかったのですが、たまたまかもしれないという点が恐ろしいことです。報道のように副反応の出たお子さん医療機関はどう責任を取るのですかと問いたい。国の方針はいつになったら出るのでしょうか？名古屋市の体制には協力したい。
411	接種後、他の予防接種と違い、1週間くらい腕が痛くて上げられなかった。
412	私の場合は、腕があがらなくなるくらいで特にはありませんでした。
413	とても痛い注射だった。しばらく微熱がつついて、体がだるかった。(子宮頸がんワクチン)
414	同封のワクチン種類一覧には、子宮頸がんワクチンは平成23年8月以前は「サーバリックス」となっていますが、うちは初回接種が平成23年10月でワクチンは「サーバリックス」です。サーバリックスとガーダールで結果の違いや他に受けているワクチン接種と因果関係があるのか検証してほしいと思っています。また、幼少期からの病歴やワクチン予防接種とも関係があるのかも調べてほしいと思います。
415	3回とも接種しましたが注射直後～次の日まで接種部位の痛みはありました。他のワクチンの量より液の量が多く感じました。痛みがそれであったと思います。接種してから今(高3)までに生理不順は時々ありますが、学校生活で定期テストとかで夜遅くまで勉強しているのでそういう事も関係していると思いますが副作用もあると思うとこれからは心配です。ワクチン打った事でがんになりにくいという安心はありますが逆に妊娠できるのか？ワクチンの副作用で流産しやすいのではないのか？という心配もあります。
416	子宮頸がん予防接種、接種済証いただいています
417	今思えば頭痛めまいは副作用？日付を見たら接種時期と同じなので……それまではいたって普通でした。この頃から不調です。
418	接種後、1、2日は腕が痛く、部活を休みたいと訴えてしました。
419	痛みが強くと痛みが引くまでに1週間かかった。2・3日腫れた。
420	子宮頸がんワクチンの効果も6～7年位で、きれるという話もきき、中学で受けると、20代前半にはきれることになり、それでは意味がないと思うと同時に、副作用で後遺症の残った人が、出てきた話もきき、2回目からはやめました、横着で中学くらいから、異性交遊している女子は、このワクチンが必要かもしれないが、ある程度、分別のつく女子なら、必要ないとも、ききました。どの情報が正しく、どの情報が間違っているのか、わかりませんが、6～7年で効果がなくなるおそれがあるなら、そういうことも、報道してほしいです。そうすれば、きちんと子育てをしているお宅なら、打つ必要もなく、重篤な副作用に苦しむ子供も、もっと減ったのでは…と、悔やまれます。
421	子宮頸がんワクチン接種の2回目接種後、ふらつきがあり院内で30分程休んで帰宅しました。全員が接種するようにということで、我慢させて3回目も接種しています。ニュースで中止になった時、娘に我慢させ接種させた自分に対し後悔しています。
422	疲労が大きかった(接種当日からしばらくの日数)接種箇所が固くなっていた。痛かった。
423	本人曰く、注射(子宮頸がんワクチン)は他の予防接種より痛く感じたらしいです。
424	腫れてすごく痛かったです。
425	3回接種しました。特に副反応はありませんでした。現在大学1年生です。
426	子宮頸がんワクチン接種後より下肢の冷え、痛みが増え、歩行困難になり入院
427	サーバリックスを3回受けましたが幸い副作用が無くすごしてしましますが、報道を見て心配になりました。因果関係の究明を早急にして欲しいです。
428	接種後(子宮頸がんワクチン)腕に筋肉痛のような痛みが数日続き「痛い」と言っていました。
429	子宮頸がんワクチンを受けた日から3日間、4日間とうでがはれあがり、寝られないくらい痛く、アイスマクラで冷やして過ごしました。
430	子宮頸がんワクチン(1回目)の接種を受けた直後から(20分以内)発熱(38℃以上)と頭痛、全身の痛みがあり、すぐに接種した病院に連絡、再受診した。その時副作用かどうかの判断はできなかった。接種前は36℃代の熱で、普通の状態だった。2回目の接種は親と医師の判断で中止した。
431	ワクチンの副反応の情報公開について、もう少し早くしてほしい。アンケート自体も遅いと思う。子宮頸がんワクチンの接種後、医療機関を受診した場合、その場の医師が副反応の可能性を考慮した診察ができるよう医療機関との関係をはかるべき。
432	ワクチンの安全性(危険性)と、娘の感染可能性の現実味を考えて「打たない」という選択をした。ワクチン行政は、昔の道路族に代わるワクチン族を生んだと感じている。国民の命を守るといいながら幼い命に十分な説明の無いまま大変な十字架を負わせたと感じる。
433	接種後、腕が固く上にあげられなかった。結局大人になったら効力が効れるので、もう少し後での接種にして欲しかった。中学生では早すぎると思う。
434	初回接種後に高熱(39.5℃)が出ましたが、翌日には下がりました。

435	1回目の接種後、1週間ずっと腕が赤くはれていて痛かった。ずっと熱を持っていて保冷剤や湿布を使ってもおさまらなかった。2回目の接種後は5日間程度、3回目の接種後は3日間程度、同じ症状が出た。先日、子宮頸がんワクチンによって通学不可能になった高校生のドキュメンタリーを見て、とても怖く感じている。
436	母子手帳で確認したところ、平成23年度は、6/10に麻しん・風しん(第3期)と、9/17、11/18にガーダシルそして12/2にインフルエンザと予防接種が多い年になっていました。医師から問題無いとの指導があり、結果的に何事も無かったのでよかったのですが、一応報告しておきます。
437	テレビなどで注射をうったことによって、体に異変がでてしまったということを見て、すごく不安な気持ちになりました。注射をうった後、吐き気が私はあったのですが、それ以降は注射の影響ではないと思うのですが、数年何もなかったら、もう注射の影響はこれからでないのでしょうか。
438	子宮頸がんや日本脳炎は何回も受けるのが大変なので1回で済むようにしてほしい。乳・幼児期の予防接種は病院に行くのも大変なので数種類のワクチンをまとめて受けられるようにしてほしい。
439	接種後、腕にしこりが出来てしばらく痛がっていました。今はしこりはありません。
440	娘は副作用はでませんが、その後ひどく射った所が痛み手が上がりなくなりました。シップを貼るよう先生に言われたので貼ったら2日ぐらいで痛みや手は治まりました。
441	接種後1日くらい腕が痛いと言いましたが、それ以外の副作用は有りませんでした。
442	子宮頸がんワクチン接種後に様々な症状を訴える方がいる事をもっと早く伝えてほしい。また、現時点では症状が出ていなくても将来的に発生するか心配がある。今回の調査は住民票を基にしているが、せめて希望者にはその後の調査結果がしっかりと伝わる様にしていきたい。
443	H25.6.15●の記事に「子宮頸がん接種勧めず」の見出しで厚労省からの記事があり、ちょうどその時期に3回目の接種を控えていた頃で記事の内容に疑問や不安があったので、予防接種の専門医に相談して、接種してよいか見極め、保護者責任の下で3回目の接種に踏み切りました。先生の見解は病気を防ぐ為にも接種した方がよいと言われました。難しい選択でしたが今現在娘は高校一年生ですが元気に過ごしております。ワクチンの良い悪いは素人なのでわかりませんが不安に感じた時は専門医に相談するといいかもかもしれません。
444	中学1年までアメリカに滞在していたため現地で接種しました。小学校5年生で2回接種しました。接種後はシートベルトをするのも痛いくらいでしたが、次の日にはだいぶ治まりました。打った箇所は3回ほど固かったです。
445	接種した腕が痛く1週間位続きました。(ピアノをやっていますが弾けないくらい痛くて力が入らなかった)
446	調査お疲れ様です。子宮頸がんのリスクが少なくなるような予防接種は必要かと思いますが不安が少ない方がいいと思うので調査は有効だと思います。
447	思った以上に接種後の腕の痛みがあり、2回目以降は翌日学校や部活のない日に接種しました。少し動かすだけでも激痛が走っていたようです。
448	接種後、夜も眠れないぐらいヒザが痛くて、ヒザの専門医に詳しく診てもらったが、どこにも異常がなく、ワクチンによる副反応だと考えられる。また、手足のしびれも、日によってしびれる場所が変わっていくのも、他の人の副反応の症状と一緒にだった。
449	質問がこまかい。いつごろから症状といわれてもわからない。なんとなく程度なのか重症なのか記入していいレベルがわからない。
450	ワクチンでの予防も大切だが、大人になってから無料で健診できると良い。
451	騒がれて社会問題になる前に接種できて良かったと思う。副反応因果関係の調査結果を興味深く待ちたいです。
452	2回目の接種時に、高熱、全身のだるさを感じました。今までの受けた予診票予防接種では経験したことのない程でした。
453	具体的に、どのような症状が、いつごろ(接種後)いつまで出てくると、この予防接種の副作用と考えられるのかを、様々なメディアで正確な情報を多く公表してほしい。「質問2」で数個該当したので、かなり不安であるため。
454	子宮頸がんワクチンに1回目接種後あまりにも痛くて気分が悪くなったが病院で休んでいると治った。ワクチンの影響かどうかわからないが現在も生理不順。
455	疑問と言うか質問なんですけど、私は身体的には影響はないのですが、精神的には、かなり変化がありました。情緒不安定になったり、うつ状態になりました。時期がたまたまだけかもしれません
456	ワクチンを接種したことで症状がでたことはないと思います。
457	知識がないのでわからないが接種した後数年経過しましたが大きな副作用はありませんが、今後はどうなのか知りたいです。
458	副作用の少ない安全なワクチン提供をお願いします。
459	すごく注射を痛がっていました
460	子宮頸がんは早期発見が大切。ワクチンではなく定期健診をうけるべきだと思います。

461	子宮頸がんワクチン時は腕がぱんぱんにはれ熱も出ました。注射の時もどの注射より痛かったと言っていました。回りの子達も同じでした。熱はでなくても、腕がはれているのがひどかったのを覚えています。様々な後遺症が関係が不明と言われてますが、全く納得できません。偶々、後遺症がなかっただけ。同じ年頃の娘を持つものとして本当に悲しいです。医療補助など接種を検討する以前にこのことを検討してほしいと思います。
462	副作用の報道が出て、やめようかと迷いました。でも1回目でなんの問題もなく過ぎたので、そのまま接種しました。今は何もありません。報道するのは事実を伝えるためでしょうが、なんだかこわがらせるだけになってしまっていたと思います。どんな薬でも副作用はつきものだと思いますが、予防接種に関してはどこかで安心なものとしてとらえています。(他の薬や注射と違って)もう少し副作用もあるかもしれないとの説明が病院でしっかりされると良いのでは・・・今はさらっと読んでサインするだけですから・・・
463	子宮頸がんの接種を受けたほとんどの子供たちが、全身の痛みをうったえていた。災いに数日後に痛みがなくなったので、良かったが、副作用が出ていたらと思うとぞっとする。でも、これから出産を迎えるにあたって大丈夫なのかという不安はある。政府はきちんと原因をつきとめる責任がある。副作用が出た子供たちにきちんと保障してあげてほしい。
464	2回目接種頃に報道が多くなり3回目接種を迷ったが残り1回接種しないことで効果がなくなるのはどうかと思い接種した。副作用もなく接種を受けて良かったと思う。生涯でもう1度受けなくてはならなくなったとしても受けさせると思う。
465	昔の事すぎて忘れてしまってます。質5の(2)は親・子ともに覚えていません。
466	将来子宮頸がんにかからないように(唯一予防接種ができるがんだから)、という親心から娘に接種させたのに思いもかけず体に障害が残るなんて本当に可哀想で胸がしめつけられます。(親も子もきょうだいも)自分のところはたまたまそうならなかったが、運悪く該当してしまった家庭には相応の手当を望みます。そして早急に真相の究明がなされますように！安全なものなら引き続き受けさせたいと思っています。
467	受けた後にやはり少しつらかった様で家で寝て居りました。一度接種だけだと効果なしと言う事でしょうか？
468	子宮頸がんワクチン3回うちましたが、受けた後かなりはれたり痛みがあった様です。
469	娘は高3で、朝から晩まで一生懸命勉強しています。それなのに、9月に入って学校が始まり、一層忙しくなった時に、こんなに細かいアンケートを、1ヶ月以内に提出しろとは、無謀です。だから、細かいことまではわかりません。もう少し対象者のことを考えてほしいです。
470	高1のときに子宮頸がんワクチンをしましたが①②どちらかはわかりません。
471	ワクチンを打った3回とも腕がすごく痛いと言った事、筋肉痛のひどい痛み
472	娘と同じ様な症状の方が多くいらっしゃると思っています。人生の中でも楽しい思い出を作る学生時代を十分に楽しめることができなくなっていますが、少しでもこのような方が減るよう予防接種との因果関係が少しでも解明できるよう願っています。原因がわからない体調不良が続いていますが、薬を飲んででも良ならず、何か所の病院へ行ったか・・・どうすることもできず、途方に暮れています。(本人が一番つらいと思います、なのでこのアンケートのことは伝えていません)
473	全ての予防注射をしていると思いますが、今まで何も変わりなく生活しています。
474	大変だった。
475	子宮頸がんは報道が気になり、一回でやめました。確実に大丈夫だと立証されれば、途中の子も期間が終わっても対応していただきたい。
476	接種後、数日腕が腫れましたが、現在は何もありません。
477	子宮頸がんワクチンを接種後、生理痛がとでもひどくなり、量も多くなりました。関係があるのか気になってました。正確な回答ができればいいな。と思っています。よろしくお願いします。
478	正直実験台にされた気分です。副作用についてはあまり重篤なものは伝わってこなかったもので様子見をしてうけましたが、あのような副作用がある予防接種とわかっていたら受けなかったと思います。娘は何ともなく健康に過ごしていますが、一步間違えば一生を台無しにしていたかと思うとぞっとします。アメリカでは一般的な予防接種というのも受けたきっかけです。日本人に安全なワクチンをぜひ今後の方々に安心して受けていただけることを望みます。
479	面倒くさい。
480	子宮頸がんワクチン接種後、病院で15分休んだ後帰宅。1・2回目肩が痛く、ぐったりして休む。3回目高熱が出たが一晩で回復
481	子宮頸がんワクチンを受けたからかはわからないが、月経は今だ不順です。あと、本当にこのワクチンに効果があるのか、わからないことが不安です。きちんと調べてから公表してください。
482	接種時(1回目)の痛みがかなり強い様子でしたので、今までの予防接種とは少し違うなと感じました。後にテレビや新聞報道の体の不調を訴える女の子がいることを知り、もし我が子の接種前に、それを知っていたなら、接種はしませんでした。とてもこわいなと思いました。
483	娘の接種前に、副作用の報道を見ていたら、接種はしなかったと思います。

484	接種を受ける時、医師から「副作用が心配という人もいるがワクチンには必ず副作用あり、それより子宮ガンになる確率の方が高く命を落としてしまう事を考えれば、自分の子供なら接種させる」と言われ、心配だったが受けさせた。その後2回目の予約を取っていたので受けようと思ったが、主人からこれだけ副作用が問題になっているから接種はやめるべきだと言われ2回目の接種をキャンセルしました。
485	今まで受けた予防接種の中でもっとも痛みが強く、特に1回目は気分が悪くなり、接種後、しばらく横になっていました。2回目、3回目も、少し気分が悪くなっていました。
486	注射をうつ際、やはり後の事が心配である。多分、大丈夫だと思うが、もし高齢になった時に何かあったら困るのでしっかりと対策をしてから注射をさせたい。(昔、私たちが子供の頃なかったので、どんな症状が出るかわからない)
487	予防接種後に、いろいろな症状がでてきたので関係があるのでは?と思う。少しでも危険があると知っていたら接種ささなかったのにとくやまれる。将来が心配。
488	子宮頸がんの予防接種を受け、今までにない腕の腫れがあり、1週間ほど痛んでいました。
489	持病のてんかんをもっていますが、子宮頸がんワクチンは別に異常がなかったので安心しました。今までのワクチンで異常は一度も見られなかったので安心はあります。
490	子宮けいがんワクチンについて。テレビでCMを流したり、学校からも接種をすすめるプリントが配布されたり。「接種しなければいけない物!!」という感じになって、娘に接種させました。(医師に副作用について質問しましたが、安全なワクチンです。と言われて。)しかし、その後、副作用が問題になり、ニュース等で見える様になり、親としてとても不安になりました。なぜ、そんな後になってから、重大な副作用が出る可能性についてわからなかった(発表しなかった?)のでしょうか。娘は今は元気ですが、何年か経って何らかの不調が出た時に、それがワクチンの副作用なのか否か、誰が判断できるのでしょうか?下にも娘がおりますが、接種はさせません。もっと、詳しい情報を発信するべきではないですか?後になって「ワクチンを接種したからといって、子宮けいがんが防げる訳ではない」と知り、そんな事はもっと早くに公表すべき事ではないのか?と怒りすら覚えました。
491	3回接種しましたが、子宮頸がんには絶対にならないのでしょうか?
492	2回目を受けた後にたくさんの副反応の報道を見て、とてもとても心配になり、保健所や病院へ電話をして説明を受けて、恐る恐る3回目を受けました。今のところ特に異常はみられませんが、今後生理不順や、不妊など体に悪い影響が出ないか、心配になります。
493	無償で受けることが出来、子宮頸がんはよくある病気だったので良かったと思います。
494	特に何の考えもなしに、政府が推し進められて安全だと思い、接種致しましたが多数の方が体調を崩し青春を謳歌できずに苦しんでいると知り、我が子でなくて良かったと思う反面、もし我が子であったなら・・・早い解決を切に望みます。
495	接種前に副反応の報道を見ていたら接種はしなかったと思います。しっかり調査して下さい。
496	子宮頸がんワクチン接種後、注射を打った腕の痛みがひどかった。腕全体が痛く、翌日まで続いた。また、接種当日の夜は、打った方の腕が痛すぎて何も使えず、腕を下にして眠ることも痛みのためにできなかった。翌日、体育の授業が受けられなかった。
497	子宮頸がんワクチン接種後注射を打った腕の痛みがひどかった。腕の痛みで全体が痛く、翌日までつづき、体育の授業が受けられない、接種当日の夜は打った方の腕を下にして眠る事ができなかった。
498	サーバリックス接種時、娘はインフルエンザよりも痛くなかったと言っており痛みについても感じなかった。
499	このワクチンは大変危険です。娘の苦しむ姿は普通ではありませんでした。毒です。保護者より
500	いつ症状が出たなんて覚えていません。覚えている人は少ないと思います。正確さはかなり低いかと。
501	接種後の腕のはれが、回数を重ねるごとにひどくはれる。熱感もあり1週間位続いていたので、かわいそうだった。
502	3回接種をしましたが、副作用報道が先になったら考えてました。受けて正解がどうかはわかりません。注射嫌いの娘にとって大さわざでした。
503	体への異常は何もありませんでした。
504	子宮けいがんの予防接種は選挙の時、●さん「我が党が無料接種にした」と演説され、市からも学校を通して、接種のすすめがあった為、接種する事にした。でも子宮けいがんを発生する経緯やワクチン接種した場合のガン発生のパーセントをきいても、あまり必要性を感じなかった。公的機関からのすすめでも、自分自身でもう一度考える事の重要性を考えるきっかけになりました。何事もなかった我が子ではありますが、ワクチン接種で苦しんでいるお子さんをもつ親の気持ちはよく分かります。他人事ではありません。このワクチンで苦しんでいる子が早く通常の生活に戻れる様、心から願うばかりです。
505	子宮頸がんワクチン、受けましたが、今は「受けなくても良かったな」と少し反省している。副作用のリスクを考え、予防接種は慎重にせねばと思っている
506	うちの子供は接種しても問題はなかった

507	体調が悪く、ねつきにくく朝、起きられないという状態が1年半ほどつづいていて、自傷行為が止まらないのが一番心配です。小学校6年生までは、そういった問題は全くなかったし、性格も明るかったのに、どうしてこういう状況なのか、本人にも親にもわからないです。アンケートの結果をくわしく知りたいと思っています。
508	予防接種は薬を売りたい製薬会社の営業活動とは切り離して、子どもにとって確実に安心と判断したもののみに限定すべきではないでしょうか。ここまで被害が出ている場合、因果関係は立証できなくても、勧奨再開すべきではないと考えます。水俣病や放射能の晩発性障害も何十年も経て因果がわかってきたものですし・・・
509	子宮頸がんワクチンを接種した翌日、接種した方の腕の痛みでの痛みと発熱がみられた
510	毎回子宮頸がんワクチンを受けた後、ところを中心に、腕の痛みでの強い痛みが1ヶ月以上続いたので、とても心配でした。今でも、月経不順が続いているので、この先何か悪い影響が出ないか、危惧しています。子宮頸がんワクチンの副反応や効果をしっかり把握せずに、接種勧奨を行った国に強い憤りを感じます。しっかりと責任を取ってほしいです。
511	子宮頸がんワクチンを打った2～3日は体調が良くありませんでした。
512	子宮頸がんワクチンを接種するかどうかかなり迷いやめました。これまでに何年も経過していて、問題の起こってないワクチンであれば受けさせたと思うのですが、娘の年から接種が始まり何が起きるかわからないと思ひ受けさせませんでした。接種を受け身体に障害が起きている娘と同年代の子どもさんがかわいそうでなりません。希望に満ちた将来があったはずなのに・・・一日も早い症状の回復。そして今後のワクチンの安全性を願います。
513	たぶん1回目だったと思いますがワクチンを打って(子宮頸がんワクチン)すぐに気分が悪くなり病院のベッドで横になりました。ものの何分かで良くなり後は何もありませんでした。
514	受けるのめんどい
515	質問4で小学校6年生以降だと明記されておりますのに間違えてしまい申し訳ありません。訂正はいたしましたが見にくいことだろうと存じます。失礼しました。
516	長女はけいがんのワクチンを接種しましたが、それ以来副作用の報道を見てから心配になり、二女の接種をためらっています。今日まで健康に育てた娘達をそのような姿にたくありません。
517	子宮頸ガンワクチン3度しましたが、打った後ははれと痛みがひどく、次の日以降数日、体育の授業も苦痛な程のようでした。
518	子宮頸がんワクチンの効果を期待することと、問診時の先生より副作用の可能性は低いと言われたので3回とも接種した。報道等心配ではあったが、ショック状態ではなかったため受けた。初回接種時に腕があがらなくなったり痛みが出るという副作用があることは説明されたが、接種後3日目にかけて徐々に腕に痛みが出はじめ、3日をすぎた頃には痛みが全身に広がり、起きあがれなくなった。その日は学校を欠席し、翌日以降も数日にわたり、部活を欠席。2回目の接種時、2日ほど経過してから痛みが出た。初回ほどではないものの学校に行くのがやっとだった。3回目になると、痛みは軽くなっていったものの、やはり、腕の痛みはあった。接種病院では、数日たつてからの激しい症状のため関係ないであろうと言われたが、他に原因がなかったためワクチン接種の副作用と思っています。
519	前半の症状ありについては、予防接種とは関係ないかもしれません。
520	ワクチンが痛かった。疼痛が1週間弱残り、何度も打つには苦痛が伴った。また、ワクチンを打った後、倦怠感があり、学校生活に影響が出た。
521	外国での使用を取り辞め安価で在庫処分をするために正式な手順を踏まず賄賂を受け取っていたために無料接種させたなど噂されていますがそれについて詳しく説明されていないように感じます。そういった責任や補償をもっと確りと行うべきではないでしょうか。
522	接種後、軽重の差はあっても筋肉痛に皆なっている様でした。腕が暫く上がらない子もいました。
523	接種した後、ものすごく打った所が赤くはれて痛かった。(1週間ぐらい)特に2、3回目の接種の時
524	たまたま娘は副反応がありませんでしたが、同世代で苦しい思いをしている方がいる事に心が痛みます。厚労省などもやっと動き始めているようですが、名古屋市の関係する機関でも、痛みを訴える方への丁寧な対応をして下さるよう、また、このアンケートが有効に利用されるよう願います。
525	今まで国から受けた方がよいと言われた予防接種は安全と思っていたので 普通にこのワクチンも勧奨され受けましたが、副反応が1回目で直後出たので恐くなり2回目、3回目はやめました。他のワクチンは今まで保健所を通して何もなかったのが本当にびっくりしました。その後、直後報道で娘よりひどい副作用で苦しんでいる人がいると知って本当に簡単に国が信じられません。子供のことなので、本当に辛い事です。
526	因果はわかりませんが、高校生になった頃から月経時の痛みは強くなりましたし、1週間前後のバラつきなどが起こるようになりました。
527	子宮頸がんワクチン3回目接種後当日の夜、接種側の腕が腫れと急激な痛みのため動かせなくなった。医師に相談の上、様子を見、1週間程かけて痛みも次第になくなり、腕も動かせるようになった。
528	接種後、接種部位が痛かった。(時間、期間覚えてない。)
529	サーバリックス接種1回目のみ。腕がだるい、痛いと言ってベッドで一日横になってました。2回目、3回目はなににもなかったです。他のワクチンでは今までそのようなことはなかったです。

530	2才～6才、中1～中3の2度タイで暮らしていたため、標準より早めに接種したものとあります。
531	思ったより強い痛みと後遺的な筋肉痛が広範囲(腕)にみられ、副反応の大きさと、報道された後遺症の方の様子、症状の重さに接種の危険性を感じている。
532	子宮けいがんについての調査を公表をきちんと詳しくしてほしい。どの症状が多いか、今後の見通し等
533	接種後1～2日接種した部分がものすごく痛かった。
534	サーバリックス1回目の覚え書きはないが、2回目「頭がボーッとする、勉強する気がおきない。」3回目、打った夜中に「手がけいれん、痛い痛いと言ってる」と書いてある。いずれも1日でおさまったと記憶しています
535	副反応で辛い思いをしている全ての方々が、(本人や家族の方や)納得できる対応をして下さるよう、その手助けに少しでもなればと思ひ協力させて頂きました。どうか有意義な使い方を、宜しくお願いします。
536	手のふるえが出て、2回目で接種をやめました。熱も出て学校も休みました。同時期にテレビ報道を見てこわくなって3回目はやめました。他のワクチン接種も、もうこわくて出きないです。
537	3回子宮頸がんワクチン接種しましたが、接種後10日間くらいは、すごく痛がっていました。あきらかに、他のワクチン接種時とは痛さがちがうと、本人が言っていました。
538	本人はすごく将来を悲観しています。無記名ではなく 個別にしっかり調査してほしいです。
539	アレルギー(花粉症、アトピー性ヒフ炎)もあるで副反応のリスクとワクチンの効果を比べ接種をやめる決断をしました。ワクチンでも100%子宮頸がんを予防できないと聞き、リスクを冒すより定期的に検診を受けた方がよいと考えました。複数の医師に相談したが、接種すべきか明確な答えはもらえませんでした。
540	先生からの説明で接種後に腕が痛くなると言われていました。接種後は腕がとても痛くなりました。
541	対象年齢で接種しました。(間違いなく3回)母子手帳に記載がなく、詳しくわからずすみません。幸い、特に問題はないです。(母)この予防接種で病気が予防できるのならできるだけ接種できた方がと思いますが、副作用が問題になってきているので、原因の究明が待たれます。
542	情報がなすぎ。副作用のある予防接種を、個人の判断にまかせていいのだろうかという疑問がある。
543	今回のアンケートを見て正直驚きました。接種後のこの4年間での原因不明、病名がつかないと診断された様々な症状はワクチンの副反応だったとわかりました。しかるべき対応を願います。出来れば通院当時に、解りたかったです。
544	サーバリックスの3回めの接種時、高熱、関節の痛み、全身のだるさ(力が抜ける感じで動けない)等の症状が出ました。幸い2、3日で症状は治りましたが その後も頭痛だるさと訴えることがあります。因果関係を証明するのは難しいと聞いているので、この先、他の症状が出ないか又日常生活に支障が出るくらい症状が重くならないか不安です。
545	●にある●にて、注射をひどく痛がっていました。ワクチン接種をしたため、子宮頸がんに100%なりませんか？
546	症状が出なかったのが、良かったが、知っていたら、受けなかった。効果ばかり、前面に出し、射って症状が出た方は、本当に気の毒。
547	3回目の接種後、数日間、痛みが打った方の腕があり、肩より上に挙げようとする、だるさを感じた。
548	現在は何も症状は無いように思いますが、今後心配はないものなのか…。注意すべき症状などを、きちんと知っておきたいです。
549	接種後の足の痛みは、ワクチン(子宮頸がん)とは、全く無関係だったかもしれませんが、この先も何か症状が出ないか心配です。
550	子宮頸がんワクチンを打った箇所が少しの間痛いと言っていた。(筋肉注射だから?)
551	子宮けいがん2回目の接種後に発熱、原因が予防接種によるものかどうかは不明。3回とも注射したところが赤くはれ、だるい感じがあった。
552	娘の健康を思って予防接種を受けましたが、他の若い女の子達が障害を持って苦しんでいる姿を見ると大変つらいです。未来ある若い女性の為にも医療費等を支援して下さい。そして早く元気になれることを願います。
553	子宮けいがんのちゅーしゃ、副作用でるってきいて怖いんですけど大丈夫なんですかー??泣
554	H24年8月、5日間原因不明の発熱(高熱)
555	副作用に苦しんでいる方の為、因果関係の解明と安全なワクチン開発を望みます。この様なアンケートはとても良いと思いますが、もっと早い時期に行った方がさらに良かったのではないのでしょうか。
556	うちの子は子宮頸がんワクチンを接種しても大丈夫だったけど、この先に、何らかの副作用が出ないかと、不安です。大丈夫でしょうか？
557	注射はかなり痛がり接種の時は泣き叫んでいました。またしばらくの間、腕がはれあがって腕を上上げる事が困難な状態になり毎日さすってあげていました。その他の身体的症状は、ワクチン接種後というより以前から、そういった傾向があったように思います。

558	本当でしたら、あと2回受けなくてははいけないのですが、1回目を受けたすぐ後に副反応の報道で、とても不安で迷っています。昔は受けなくてよかったかもしれませんが、今は、子宮頸がんで、亡くなる方が年配の方でも、身近にいらしたので、1回受けてほっといいものか？同じ1回目受けた病院でなら、あと2回受けてもよいのかなとも思っていますが、未だ迷ってます。
559	集計おつかれさまです。
560	腕がはれ、手、うでが上がらなくなった。
561	2回目の予防注射の4日後くらいに熱がでました。(軽い熱でした。)普段、ほとんど熱はでないので覚えていました。予防接種に関係あるかはわかりません。
562	接種後2～3日「はれ」がひかず体調をくずした。違う病気を発症した。甲状腺機能抗進症(治癒不能)
563	毎回接種後(子宮頸がん)、腕が痛くなっていたようです。他の予防接種では、あまり痛みませんが…。しばらくの間。だいたい1週間くらい続いていたようです。中1の娘がいますが、子宮頸がんの接種を、やった方がいいのか、悩んでいます。この結果次第で考えようと思っています。
564	欧米では、子宮頸がんワクチンは受け入れられており、接種した方がよいとも聞きます。知り合いの娘さんも、無料で受けることができるし、将来子宮頸がんにならないのなら受けた方がいいということで、1回受けました。その直後に、ニュースで副作用が大きく報道され、2回目を受けるのをためらい、今に至っていますが、年間10000人がかかり、約3000人が死亡するときと、ワクチン接種はした方がよいのかとも思います。欧米人と日本人の体質の違いはどうなのか。なぜ副作用が起きるのか。どういう体質の人に起こりやすいのか、ワクチン接種の利点など詳しく説明した方がよいのではないかと思います。
565	副作用の反応が出た方々が多数いる為にアンケートを取り始めた割には、接種後のアンケート部分が、とても雑で少ないと思います。あまり意味のないアンケートだと思います。保護者
566	親の意見です。子宮頸がんワクチンは他の注射よりとても痛かったようで、2回目、3回目の接種時はすぐ嫌がっていました。それでも絶対受けなければいけないものと親が思ってしまったので、受けさせましたが、最近の副作用の報道を見ると、今なら受けさせないと思います。
567	本ワクチンに関しては思春期の娘が接種を嫌がっていたのに、無理に受けさせてしまった後にこのようなニュース(副作用)が流れ、大変当惑しています。「専門家」の方はもっと真面目に調べてから市民に勧めて頂きたいと思います。今でも「受験」にひびいたのではないかと思います。(時間に開きがあるので違うとは思いますが…)
568	注射がとても痛く、1週間以上、痛みがとれませんでした。
569	子宮頸がんワクチン接種1回目…両腕痛(2日間程)、2回目…翌日39℃を越える発熱+全身痛→病院に連絡→学校欠席→3日後回復、3回目…特に症状無し
570	お姉ちゃんはサーバリックスでした。ガーダシルを打った妹はかなり腕が痛かったようで打ちたくないとかかなり渋りました。
571	滑膜を取る手術もしたが、原因わからず、毎日、痛み続けてます。
572	本当はうちたくないです。
573	しっかり集計して、結果は、しっかりと公表して下さい。
574	副作用がこわくて、3回目を受けられない。
575	子宮頸がんの予防接種は他の予防接種より痛く、とてもはれた。数日ではれはひいた。
576	直径2cmほどのしこりができた。
577	注射が本当にいたかったです。
578	3回目の接種後、発熱。
579	サーバリックスを3回とも接種しましたが、副作用は軽く、腕の腫れが少しみられる程度でした。
580	インフルエンザワクチンより痛くて、寝返りがうてなかった。
581	流産を2回連続でしました
582	接種後とても痛みが強かった。
583	安全な予防接種をお願いします。
584	接種はオランダに住んでいたときにしました。
585	今まで受けたワクチンの中で、いちばん痛く、何日も痛みが残った。
586	子宮頸がんワクチンを接種した後、毎回熱が出た。3回接種後に副反応の報道を見て、とても心配になった。関係があるかどうかは分からないが、現在、生理の症状が安定しないので、ワクチンの影響があるのか？と、このアンケートにより、更に心配になった。小学生から生理が始まり、そろそろ安定した周期になってもいい年齢かなと思うので、ワクチンとの関係が知りたいです。
587	脳性マヒがある子供(身障1級・愛護1度)なので、あまり変化はわかりませんが、生理不順や肌あれなどは続いています。
588	麻しんは、8年2月にかかる。

589	3回接種してしまった後で、深刻な副反応が問題となっていることを報道で知り、たいへんショックを受けました。疑わしい事例が判明した時、すぐに公表してほしいと思いました。接種してしまったものは今更どうにもなりませんし、今のところ娘の身体に大きな影響は出ていないように見えます。しかし、将来の妊娠、出産に際し、もし何らかの問題が起きたら、接種させたことを親としても心苦しく思うことでしょう。今は将来も無事でありますように祈るばかりです。最後になりましたが、重い副作用に苦しんでいる方々は本当にお気の毒で胸がいたむばかりです。人生の方向がすっかり変わってしまった方もいらっしゃるのではないのでしょうか。せめて救済はしっかりと差し上げてください。
590	接種後、注射部位を中心に腫れた。直径15cm位。1週間位、その部位の腫れと痛みが続いた。
591	異常のあった人達へきちんと対応してあげて下さい。
592	子どもが大きくなってからは母子手帳を持っていないこともあり、記入もれがあるかもしれません
593	当時、テレビ広告や印刷物などでさかんに国が勧奨していました。接種するのが当たり前と思い受けさせましたが、副作用を報道で知り、がく然としました。副作用が出たお子様は本当に気の毒です。何とか救済していただきたい。本来なら充実した学生生活を送れただろうに・・・自分の娘も副反応が出たかもしないと思うと胸がざわつきます。国がだめでもまず自治体から手をさしのべてあげて下さい！
594	筋肉注射であったため、接種後に腫れは見られたが、体調や身体に変化は見られなかった。
595	子宮頸がんワクチン接種後、30分待合室で様子観察のため休んだが、何もなかったので帰宅した。2009年に外国から帰国したが、その外国に居た頃、外国人の友人たちから、すでに米国、ヨーロッパでワクチン接種始まっているようなので接種した方が良いと聞いていた。日本より数年早く始まっていたその外国では副作用の出かたはどうか、日本での報道はなかったと思う。人種が違うのでいろいろ違いはあるとよく知っているが、日本での情報報道にももの足りなさを感じている。
596	うちの子供はまだ、性交渉もないのに、うつ意味があったのだろうか？
597	子宮頸がんワクチン接種の1回目のおと、発熱とふるえがありました。接種時、後、うでが痛かったです。今まで予防接種を受けて、このようなことはおこらなかったのも、とても心配しました。熱は38度近くまで出て、1回でおさまりました。接種した病院に通院しました。1回目で副作用がありましたが、2回、3回は発熱などの症状はありませんでした。
598	がんばって下さい。
599	通常の副作用なのかもしれませんが、接種後3日ほど腕があがらなくなるほどの筋肉痛がありました。
600	接種した時は今回の接種の痛み(うでの)が一番と言っていました。その後は何も異常なしです。痛みに対しての体の準備が必要と感じています。昔と違って痛みに対しての経験が少ないので、急に接種したりすると体が受け入れられないのかもです。それぞれの個人の体調、性格が多々なので接種する時にはそれなりの心構え必要かと(素人考えですみません)
601	子宮頸がんのワクチンを2回接種しました。2回ともねつがでました
602	1回目で今までの予防接種にはない経験をしました。怖くて続けられずにいたら、様々な報道が始まりました。ある程度、報道は事実だと思います。
603	お母さん(医療機関に勤務)の目の前で、接種後すぐに、けいれんを起こした女の子がいたそうです。怖くてご自身の娘さんの3回目の接種は止められたとおっしゃっていました。副反応が出てしまったお嬢様たちを見ると、我が子もあんなになっていたかと思い、涙が出ます。早急に何とかしてあげて下さい。
604	全身の関節の痛みや腫れに悩み苦しんでいます。匿名のアンケートで何を補償して頂けるのですか？今、●に掛かり始めて3カ月経ちましたが、医者も多分、関節リウマチ？と悩んでいる検査結果です。強く補償を願います。毎月薬代と医療費で4万円です。高額医療すら4万円位では、役に立ちません。高校生も医療費無料にして
605	受けた当日に倦怠感がひどく、その夜にひどいじんましんが顔と体に出ましたので、じんましんを抑える薬を1週間程服用(うち3日は学校に行けませんでした)。現在中3ですが、昨年あたりから、立ちくらみがたびたびあった為、貧血も疑い血液検査をしましたが、貧血ではなく、起立性調節障害と診断。けいれんワクチンの副作用が、思春期特有か判らず不安です。未だ初潮も来ず、心配ですが、高校入学するまで様子を見ます。
606	虫に刺されると広範囲に赤く腫れることがある。(一週間ぐらい続く)
607	第1回目の子宮頸がんワクチンの接種の直後(2時間くらい後)に38℃台の高熱が出ました。第2回目の接種を医師に相談に行くと、副作用の報告はほとんどないとのことで、2回目の接種も問題ないとの医師の見解にて行いました。その後3回目も接種して副反応らしき症状はなかったと思っていますが、後に様々な話をきくようになり、心配になりました。最近とても疲れやすく常に体がだるいのですが、後々になって副反応が出てくるということはないのでしょうか？
608	子宮頸がんワクチンを接種したあと腕が上げられないほどの痛みが2～3日続きました。

609	注射した後うでが痛くてあげられなかった。1週間以内でその痛みはなくなったが、少し心配な時もあった。筋肉注射なのでしかたがないと思ってその時は過ごしていた。本人、痛がっていましたが他の保護者の人に聞いても同様の感想だったし、名古屋市の予防接種だから3回接種した方がよいと思いました。後から副作用の報道を見て驚きました。
610	接種する、しない、を判断する材料が少なく、保健所や産婦人科医、内科医へ直接意見をききに行きました。多国での接種状況、ガン患者数など具体的な数値を示してほしいと思いました。被害報告だけではなく、接種後のガン患者数の減少のことも載せてほしいと思いました。被害報告だけでは、こわくて接種できなくなって当然だと思えます。
611	<本人>注射がすごく痛かった思い出あります。<母>子供に良かれと3回も接種し、後で副反応がひどい方がいらっしゃる聞き、とても不安になりました。
612	1回うってしまったことで、これから何も起こらないのか心配しています。1回うってしまったことで、何かあったら親の判断でうったのですごく後悔すると思う。予防接種はうってあたり前と思っていましたが……。勉強不足もありますが行政への不信感があります。
613	今思うと子宮頸がんワクチンを打った事は怖い事だったと思います。
614	子宮頸ガンの予防接種の副作用がとてもおそろしいものでびっくりしている(接種時は知らなかった)。もし打つ前に副作用を聞いていたら多分打たなかったと思う
615	この注射をするとずっとこの病気にならないの？3回とも注射のあとは、すごく痛かったです。
616	思ったより痛かった。1週間程痛かった
617	注射は思ったより痛かった。痛みは1週間ほど続いた。
618	このアンケートの娘は、3回接種して、何もなくて良かったです。この娘より、4歳年上の娘は、アレルギーがありましたので、心配でしたが、同時期接種の予約はしてあったのですが、副作用がこわくて、キャンセルしました。今思うと万が一と言う事もあったので、キャンセルして良かったです。そのかわり、子宮ガン検診をちゃんと受けなければいけないと思います。ー母ー
619	副反応の報道を見て、2回接種してやめました。こわい注射を打ってしまったと思いました。
620	どうして異常のでるワクチンを接種させたのかが、わからない。もしこれが原因で、将来に影響がでたらどうしてくれるんですか？
621	1週間ほどで治ったが、打ったところがはれ、痛くて腕があがらなかった。
622	からだの具合が悪くなられたお子さん達と、ワクチンとの関係をぜひ明らかにしていただき、無関係という結果がでましたら、子供達の将来の為にワクチン接種をどんどんすすめていただきたいと思えます。
623	子宮けいがんワクチンはうでがまっ赤にパンパンにはれ 数日はえんぴつをもつのも大変でした。びねつもあり、体に負担が大きかったと思いますが、3回受けさせました。
624	質問2. ④ひどく頭が痛い……小学校5～6年頃 ひんぱんに痛みがあり小児科に相談していて、いつも●を常備していました。痛かったらがまんせずに薬は飲んでいたので、安心して、飲めば治るとい精神的なものだったと思います。1～2度救急にもかかった事がありますが、現在(15才)は頭痛は減りました。
625	目の異常の原因がわからず、現在も通院中です。子宮頸がんワクチンとの因果関係はあるのでしょうか？
626	注射した後 うでが何日も痛かった。
627	3度うけたが、発熱とうでが上がらないことが2～3日続いた。(2度)
628	当時、いろいろな方にすすめられ注射をしましたが、年子の姉も3回(しかも有料!!)ニュースをきいてとても恐いと感じました。注射をうってなんともなかったから良かったですが、子宮頸がん予防となった事は確かですよね。良かったと言えることを信じております。不幸にして副作用がでられた方にできるかぎりのことをお願いします。
629	質問5でのいろいろなワクチンがあると今知りました。なぜでしょう。ワクチン統一と(必ず予防接種する様)家庭では無理な事もあるので学校教育の一環として行ってはどうでしょう。
630	3回共全く副作用がなかったため、後で問題になったことに驚きました。
631	子宮頸がん予防接種3回目の次の日熱が出たため病院を受診する。平成24年1月に3回目をして、秋に急に興奮状態が続き、1週間1時間しか寝られない時が続きました。異常な興奮状態で翌年心療内科を受診しました。秋に(11月)インフルエンザの予防接種をしました。寝られない状態が続いたのは、インフルエンザの前か後かは忘れましたが、興奮状態は急な事で、理由がわかりませんが、後になってTVで子宮頸がんの副作用を見ると、もしかして関係があるのか？と今でも思っています。
632	1回のみ接種しました。ワクチンの効果はないですか？それともありますか？今から2回目をうてるのですか？1回で中止している者は今後変な作用がおきますか？途中で止めた(現在やむなく止めている)者に対しての情報をお知らせ下さい。
633	子宮頸がんワクチンの3回目をうった翌日に高熱ではないが、熱がでた。
634	1回目が痛かった
635	とくに子宮頸がんワクチンのせいで体調はくずれませんでした。

636	子宮頸がんワクチン接種後の症状をくわしくアンケートしないと意味がないのでは？質問2に関しては、人間ふつうに生きているだけで何かしら症状はあります。税金を使い、やる調査です。中身をもっと考えて送るべきですね。サーバリックスを受けた日は接種されたうでが重だるく感じたようです。その他は何もなし。1度2度と受けた後大丈夫だったので恐怖心を与えないよう、余計な情報(体が動かなくなった子の例など)を知らせず3度目を受けました。3回受けないと意味のないワクチンを途中で放きすることのもったいなさと、子宮頸がんワクチンを受けられる年齢に受けないといけないわけですから、がんをそれで防げるのなら、多少の痛みはガマンさせた方が良いとの母親判断で3度も受けました。
637	子宮頸がんワクチンの2回目の接種後、脳貧血になりましたが、すぐに回復しました。
638	日本脳炎、第2期、3期、ジフテリア破傷風第2期と接種していませんが、今からでも接種OKなのか？と。その場合、無料で接種できるか？など、くわしく教えてほしいです。日本脳炎も接種後、死亡した子がいて中止となっていますが、毎年何を接種できます的な連絡が欲しいです。
639	副反応が出てしまった方に、共通する事など、何か分かっている事はないのでしょうか？例えば、生理中に接種を受けた、アレルギーやぜんそくを持っている・・・など。親の判断で子供に何かあると困るので、不安を少しでもやわらげてもらいたいと願っています。宜しく申し上げます。
640	私どもの娘は現在、何の症状も出ず元気に生活しております。接種を受けて様々な症状が出た方々が早く元の様に元気になられますよう願っております
641	子宮頸がんワクチンの接種(1回目)をした翌日から1週間程度、10分に1回のペースで下痢になりました。恐らく副反応だと思われます。それ以来 子宮頸がんワクチンは接種していません。
642	もしも娘に副反応が出ていたら・・・と思うと恐ろしいです。将来、何か体に異変が出ないか等、不安はつきません。原因の解明を期待します。
643	特に第1回接種後「体がだるい、重い」とかなりしんどかった。1週間ぐらい続いた。他の予防接種では、このような状態になったことがない。
644	2回目を接種する時に、TVのニュースですごく大きくとりあげられ、不安に思いましたが、1回目で副作用がなくドクターにも相談しましたが、副作用は極まれで、大丈夫だと言われたから3回行ないました。2種類のうちどちらがリスクがあるのか、詳しい情報は、知りたいと思いました。
645	子宮頸がんワクチン1回目の際に血圧低下とチアノーゼ発症(30分程で改善)。2回目、3回目は大丈夫でした。
646	国のワクチン接種に対する方針が曖昧なままで、3回目の接種のタイミングを逃してしまった状況です。当初、副作用が想定されなかったとは思いますが、途中から急に自己判断でしなさいとなり、戸惑いを感じます。
647	子宮頸がんワクチンを受けた時は、サーバリックスしかありませんでした。日本で、接種が始まる前に海外ニュースでイギリスでは13才(12?)になったら、この接種を行なっていると知り、日本もなぜやらないのだろうと思ってました。ただ、そのニュースは、接種した人の中で、死亡したというニュースで、因果関係はわからないというニュースでした。日本ばかりでなく、海外の事例をひきあいにしてほしいです。なぜ、遅れて参加した日本なのに、副作用が問題になるのか、それ以外の国ではなかったのかどうかということです。
648	第1回目を接種した翌日はすごく痛みがあり、38.8℃の発熱がありました。土曜日の午後だったので接種した医院に電話しましたが「様子を見てください」という指示だけでした。その後熱も下がりましたが、後遺症がでてなくて本当によかったと思っています。接種する前に医師へ「本当にワクチンをうって後遺症や妊娠に影響はありませんか？」と問い合わせましたが、笑ってあしらわれました。今になると不信感を抱いた時点でやめればよかったと思います。
649	接種1回めの注射では、とても痛みがあったことを覚えています。2回め以降は特別痛くはありませんでした。
650	十分な安全性を確認の上、定期接種を奨励して欲しい。
651	6年ほど家族全員インフルエンザの予防接種をしていませんが全くかかりません。周りも予防接種をしたから、かかりにくいとか軽いというような感じは受けません。子宮頸がんワクチンのニュースのこともあり、本当に予防接種を受ける必要があるのが疑問です。市の計画にそってまじめに受けさせてきましたが、今後インフルエンザも子宮頸がんのワクチンの予防接種も受けるつもりはありません。予防接種の効能をもっとしっかり調べてほしいと思います。(保護者より)
652	標準的な接種年齢にある人すべてを対象としていたなら、このワクチンによる副反応が出た時点で国がもっと積極的に実態調査をしていたらどうかと感じます。アメリカ等では男性にも接種を勧奨している所もあるようです。
653	受ける時は、もう副作用問題が出てて悩みましたが、姉は、←サーバリックス、既にうけていて、大丈夫だったので、受けました。やはり、不安があったので、この年はインフルエンザの予防接種は受けませんでした。素人考えですが、体の負担を減らしたかったの。あとから出たガーダシルをえらんで、接種しました。
654	接種を受けた時点では副作用がそれほど問題になってなかったのが接種したが、知っていたら接種しなかったと思います。

655	幸い、娘は今までワクチン接種で大きな副反応が出たことはありません。(多少の腕のはれ等は有)しかし、今回は多くの方が副反応で苦しんでいる実状を見聞きして、怖くて2回目以降を控えざるをえませんでした。確実に安全性が高いとわかるまでは、安易に国、地方自治体で推奨しないで頂きたいです。
656	注射後2週間~1ヶ月くらい、はれと痛みがひどく部活を休んでいました。腕が上がりませんでした。月経不順(まだ安定していないこともあり)が時々あることが気にはなっています。
657	重い副作用がある(しかも多数)と分かっていたら受けなかった。運よく自分はなかったが、健康であったのに副作用で普通の生活ができなくなるなんて気の毒すぎると思う。後に友達が知り合いの医者から受けない方が良いと言われたから“私は受けない”と言っているのを聞いた。TVのCMでもどんどん“受けましょう!”と言っていたし、DMも送られてくるしで受けるのが良いことだと思っていた。やめれば良かった。
658	今回、何事もなく済んだので良かったのですが、情報が少ない中で新しいワクチンを接種するのは、怖いと思いました。1年後だったら100%受けていません。何らかの副作用で苦しんでいる人たちが少しでも救われるような救済制度が整うことを願っています。
659	子宮頸がんワクチンを接種して、軽い筋肉痛が打った所に出ました。
660	子宮頸がんワクチン接種後は、腕の腫れがひどく、上に上げることも痛みを感じた。
661	1回目、うった後に、気分が悪くなった。ひんけつになったが、30分後におちついた
662	視力低下は 受験勉強のせいと思われる(1.0→0.3)
663	注射がほんとに痛かったです。5日間くらいはれてました。
664	知り合いに子宮頸がんワクチンの副作用が出てしまった人がいて、学校生活にも大きな影響が出てとても大変そうだったし、治療費もたくさんかかっていたと思うので、名古屋市の副作用が出てしまった24人の方の負担を少しでも減らすことができると良いと思います。
665	質問項目が難しい。(質問2)
666	子宮頸がんワクチンを接種して1回、2回目はその後すごく体がだるくて動くのがつらそうで、3回目を接種した後で、38℃以上の熱が出ました。
667	打った後、2日間くらい腕が肩より上に上がらない。
668	今のところ副反応と思われる症状は、特にないが、接種後、何年か経ってから現れる事もあるのか。とても気になっています。早急に原因をつきとめてほしいと思います。また、今、現在、症状がなくても、いずれ妊娠、出産となった場合、何か支障があったりしないか・・・など、相当、長期間にわたる調査が必要なのではないかと思います。
669	3回目を受けた後もすごい頭痛があった。今思うと何事にもならなくてよかった。
670	副作用で必ず熱が出たが、3回とも受けた。だが、その後は副作用はなかった。
671	子宮頸がんワクチンの影響かどうかは？だが両親の体質とは異なるところがあり、この先不安である。たとえば冷え性とか、めまい等
672	今後どのような後い症が出るか不安
673	ヒトパピローマウイルスと聞くとこんなイメージ。(イラストあり)。てっけんせーさい！！予防接種時/後イメージ(イラストあり)
674	子宮頸がんワクチンを打ったすぐはうでがしばらく重たくて痛みもあり、1週間くらいは楽器を持たず部活を休んだ。
675	保護者です。子宮頸がんワクチンの副反応について、いろいろと、出てきたあと、いつまでも接種を中止させてなかったのはどうしてなのでしょう？国、行政がすすめて来た予防のためのワクチンで、全てではないものの、重篤な症状で苦しんでいる、もともとは健康であった娘さんたちが、かわいそうで仕方ありません。健康を維持させるために打ったワクチンで、未来をうばわれてしまっている現状を、国として、行政として責任をとってほしいと思います。娘をもつ親として、人ごとではありません。1日も早い対応をお願いします。最後に、この調査が、副反応に苦しんでいる娘さんたちの明るい未来に役立てていただけることを切に望みます。
676	副反応については接種が始まった頃より心配しておりました。娘については接種をやめようと思っておりましたが、娘の接種期限が延長されたこともあり、受けることにしました。国が推奨し、TVCM等広告も多く、受けないといけないという雰囲気になっていたと思います。今回、娘は何事もなく経過しておりますが、受けなければ良かったと後悔しています。(母 記入)
677	頭痛、物覚えの悪さが副作用か原因が大変気になり中3の時受診しました。原因が特定できず、未だに不安です。治療費無料で再度検診してほしいです。
678	ウイルスを持っているかどうかを調べる事ができればよいのではないかと。
679	注射後の腕の痛みが強かった。
680	ガーダシルは打った時は痛かったが、あとは全く痛みも問題もなかった(本人)。この時期に接種することにより子宮頸がんを、ほぼ9割予防できるワクチンなので、是非多くの子に打ってほしいと思う。報道であまりに恐怖を与えるような経験談があるので、娘の友達や親も怖くて打てないという方が多い。

681	名古屋市補助が出るのを心待ちにして接種した覚えがある。数年後の様々な症状のニュースを見るたびに、当事者の方には申し訳ないが、うちの子でなくて本当に良かったと思いました。ただ副反応に苦しんでいる方々には本当にお見舞い申し上げます。この調査結果、皆さんの意見を聞きたい。
682	子宮頸がんワクチンを接種した翌日から筋肉痛のような痛みが2日間ほどつづいた。そのせいで部活動の練習が思うようにできなかった。
683	H.23.10月頃 膠原病(全身性エリテマトーデス)の診断を受ける～現在治療中。子宮ガンワクチンとの因果関係は不明
684	初回接種後(子宮頸癌)に高熱(39℃前後)が出た。
685	子宮頸がんワクチンは3回とも受けましたが、それぞれ接種後、体が痛いとしばらく言っていました。報道後はやはりこわくなりました。
686	本人は今留学中なので、わかる範囲で答えています
687	ガーダシル1回目接種の後、発熱し、2日後に下がりました。
688	高1で頸がんワクチン接種。高3夏から排卵前後、生理中、後に全身倦怠感、頭痛がひどく、学校を休むことが多くなりました。婦人科受診、●を内服開始。1年後、上記症状がかわらずあるため、漢方薬●を内服中です。現在大学2年生、やはり排卵前後、生理中の頭痛・だるさは、軽い症状としてあります。
689	子宮頸がんワクチンは本当に痛いと言っていました。
690	中途半端に一度打ってしまい後悔しています。いっそ打たなければよかったです。今後どうしたらよいのかとても迷っています。早急に今後の方針発表を望みます。
691	症状が出てしまった方に十分な手助けをしてあげてください。
692	我家は子宮けいがんのワクチン接種後特に変わりなかった。
693	3回目受けずに時間がたち、助成もなくなりました。できれば3回目を受け、助成をもらいたいと思っています。
694	このアンケートの意味がわからない。副作用がでた子供達にケアをしてあげて欲しい
695	うつを発症した
696	子宮頸がんワクチンを接種したが、特に異常ありません。
697	ワクチンの接種したうでが痛くてしばらく(3～4日)は使えなかった。はし、ボールペンも使えなかった。しこりのようなものができた。痛みは1か月ほど続いた
698	副作用の報道があってから、この調査票までかなりの時間がかかっている。対応としては遅すぎる。人の命にかかわる事なのでもっと迅速な対応をすべき。この遅さは一市民として残念です。
699	長女はH11年生れでサーバリックスを接種させ、副反応みられず。次女はH13年生れですが、報道を受け接種をみ合わせています。実際の所どうなのか？調査頂け今後につなげられるなら、結果を早く知りたいです。予防接種で防げるなら、親として、接種させたい意向のため。
700	本人は痛い為、かなり嫌がりましたが、3回受けなくてはいけないと思い、その頃は副作用のことも差程言われていなかったため、3回目も受けました。その後報道を見て心配や心あたりがあり、今は、「やめておけばよかった。」「なぜこんな予防接種を強くすすめたのか。」と責めたい気持ちにもなっています。
701	接種後、患部がはれて痛かった。接種する度に痛みが増した。少し触れられるだけで激痛がした。
702	娘が子宮頸がんワクチンを接種した頃は、副作用の件(TVで放送されたような事)は、知らなかったもので、正直、子供に、その症状が出なかった事に、ホッとしています。娘たちの頃は、接種を受けた方が良いとされる時。友達ママと、タダのうちに接種しようと言っていました。副作用がある娘さんの事例を知った時、タダのうちに…と考えていた母としての想いが、バカらしくなりました。普通の健康体で、いられる事ができなくなってしまった方が、一日も早く回復されます様に。
703	このような被害がたくさんあるので心配で受けさせない方がよかったと思います。非常に心配で腹立たしい気持ちでいっぱいです。厚生労働省はもう少し安全だとわかってから実施してほしかった。受けたことを後悔しています。これからの妊娠出産に影響はないのでしょうか。
704	子宮頸ガンはワクチンで予防できますが、あれほど急に接種をすいしょうしたのはどうしてでしょうか？致死率は高いと思いますが、他の接種対象の疾病に対して、それほど他の人にうつるのでしょうか？副反応に対して効果はどれほどあるのか？と感じます。(バランスが悪い！)副反応で苦しんでらっしゃる方々への早急な対応をお願いします。なぜなら、一般の私たちはまさか副反応がここまで出現するとは考えませんでしたし、そのことを予測するのは不可能だからです。
705	3回受けましたが、かなりはれて痛みもひどかったです。
706	公費で子宮頸ガンワクチンを接種でき、ありがたいと思う。30代、40代の友人が3人も子宮頸ガンにかかり、子育てをしながらの治療はとても大変だと感じています。ワクチンで予防できるのであれば、もっと早くからこのような制度があれば、大変な思いをする人が少なくなったのかもかもしれません。
707	子宮ガンワクチン接種の際、しばらく病院のベットで横になっているように言われた。他の予防注射では同様のことを言われたことはなかった。医療関係者はこのワクチンには副作用が起こりがちなことを知っていたのなら、言うておいてほしかった。副作用のことを知っていたら受けなかった。

708	1回めの注射でかなり腕が痛くなり、接種部はかなりはれました。腕があがらないくらい痛がっていました。その後2、3日は一番ひどく、痛みも長く続きました。その後、規定の回数を接種しました。その頃、よく、手に力が入らない。ペンを握るときも、力が入らないと言っていました。その時は疲れてるからじゃない？と思っていましたが、今考えるとワクチンの副作用だったのでは？とも思えます。頭痛もしたりと大変な時期もありましたが、今は気にすることも少なくなりました。無料だったので、制度のあるうちにと利用しましたが、(安全だと信じていたので)、結果はともかく副作用のこわさをその時知っていたらやめていたと思います。健康な体に症状が出て、その後の人生が変わってしまった方が少しでも救われますようにと、お祈りすると共に、医療、行政の手当てをお願いします。
709	思ったより注射が痛かったではすまされないほど痛かった。筋肉注射なので、筋肉がある方が痛いと言われ、医者には話されたが、そんなの関係なく、注射を打っていて1/3ぐらい中の液体がはいったぐらいから、筋肉をぎゅーっと強くだれかににぎられたようにいたく、終るといったんおさまるが、歩くとまた誰かににぎられたようにいたくなかった。もう二度とうけたくないと思ったが、しょうがないので最後までうけた。この痛みはうけた人にしかわからないけど、私の周りで子宮頸がんワクチンをうけたという人が1人もいなくて、ちょっとショックだけど、本当に、その後なにも影響がなかったのはよかったと思う。あと、いろいろ知りたいのはわかるが、もっとコンパクトにまとめるか、紙一枚にしたほうが良いと思う。見たしゅんかんめんどくさいと思ったから。
710	副反応の報道を見て、こわかったです。娘に副反応が出なくてよかったですと思いました。
711	注射は痛かったが、3回とも接種した。副作用もなく、接種した安心感はある。将来、100%でないにしろ子宮頸がんに対する不安は少なくなっている。(母)
712	日常生活の中で、体調を崩す原因がみあたらず、唯一ワクチン接種したことが心当たりだったので初回のみで止めました。学校を休む程ではなかったのですが、から咳が1ヶ月程続いていた記憶です。
713	子宮頸がんワクチン接種後、2～3日、腫れていました。
714	ADHDの診断がH26.4で、今回のアンケート目的がワクチン接種後の症状と同様が多く、判断しづらい所が多々ありましたので、正確な返答をできません。
715	私は運良く、副作用がなかったが、副作用で苦しんでいる人を助けて欲しい。
716	質問4の、時期の欄は、西暦でも書いて良い書式にしてほしい。
717	2才上の姉も子宮頸ワクチンを接種していますが、その子達は大丈夫なのでしょう？(副作用とアンケート)。回答、アンケート結果は？広報名古屋又は、何かの形で、お知らせ下さい。
718	注射が痛すぎる。友達で副作用が出た子などがいて、怖い。3回ともうけてしまって大丈夫か心配。
719	子宮頸がんワクチンを打ったところが、けっこう長い間ははれていたかっただのを覚えています。
720	ワクチンで苦しんでいる子どもたちが、早くよくなるように願っています。
721	接種後の接種部位のはれ、痛みが強かった。
722	3回とも接種後、貧血をおこして、たおれた。しばらく休んだら、回復した。(子宮頸がんのワクチン接種時のみ)
723	接種後は接種部位のはれ、痛みが3日程続きました。
724	今思えば、娘の症状は、子宮頸がんワクチンによる副作用だったのでは…と思います。当時は、副作用についての報道はほとんどなく、疑いもしませんでした。大学病院での様々な検査でも、原因はわからず、ひょっとして子宮頸がんワクチンの影響か？と医師に尋ねたら否定されたので、それ以上追求することもなく、よくわからないまま今にいたっています。娘の意識が戻らないのでは…という恐怖は、本当に悲しく、こわく、つらいものでした。
725	無料で受けれるからと思い国を信頼して受けましたが、副反応で大変な思いをされている方がたくさんみえるのを知って、もっと慎重に考えて様子をみないと怖いと思いました。今後の方達の為に適正な判断で安全な接種をお願いします。
726	良かれと思いうけました。今副作用に苦しんでいる人がいると思うと、たまたま自分は運がよかったです。どうか副作用がある方を救済してあげてほしいと思います。
727	学力の著しい低下もあり、ワクチンの副作用かもという疑惑が確信に変わりつつあります。ワクチンの数が足りないからと、急かされ、受けましたが、こんな副作用のある怖い予防接種だと知っていれば受けさせませんでした。悔まれます。早急な解明と対応をお願い致します。2015(H27)9. 母
728	3回目の接種後、生理不順・過多月経になった。通院しているが未だ改善していない。不安です。
729	H26.4(高1)から学校に行かなくなり、退学した。
730	子宮頸がんの注射は痛いときいていたが、うちの娘は一度も痛がらなかった。
731	子宮頸がんワクチンを打った時に、吐き気と腹痛の副作用があらわれた。
732	子宮頸がんワクチンは、注射した部位の強い痛みはあり、2回目以後接種をいやがっていましたが、3回接種後も特に問題はありませんでした。月経に共う症状は、時々あるそうです。
733	受けた後に報道が出て、しばらく心配になりました。

734	これまで、何種類かの予防接種を受けてきましたが、一度も副作用が出たことはありませんでした。学校からの勧めもあり、何のためらいもなく、娘に子宮頸がんワクチンを受けさせました。しかし、翌日から調子が悪くなり、この症状がいつまで続くのかと、とても不安になりました。幸い1週間ほどで症状はなくなりましたが、これから接種を考えている方は、よく相談されてから接種された方が良いと思います。
735	子宮頸がんワクチンについては女の子をもつ親であれば万が一を考え接種しなければ…という考えになるのが当然だと思います。幸い私の娘は異常はありませんが、後からこういう状況になるのはとても不安です。又、なぜ既に過去のものとなったワクチンのことまで調べるのか…。そのことと子宮けいがんワクチンでの異常との因果関係があるのですか？もっと研究してからにして頂きたい。なぜ期待して異常な症状を発症することになるのか…。残念です。
736	アンケートの質問内容が答えづらい点が多く見られました。特に質問2が答えづらかったです。
737	結局、2回目で途中になった形になり、このワクチンの効力はどうか心配です。
738	子宮頸がんの予防接種の副作用(?)でいろいろな症状がでた方をTVで見ることがあります。1日も早く解明され、今後の接種に検討されればと思います。このアンケートが少しでもお役に立てますように。
739	子宮頸がんワクチンが無料で接種でき、大変ありがたく思っています。ただ重い副作用のかたもいるそうで、お気の毒に思います。早く安全に接種できるようになることを希望しています。
740	これだけ子宮頸がんワクチン接種後の副作用の報道されているにもかかわらず、接種の呼び掛けを中止しただけで、接種自体を中止しないことがおかしいと思う。子供は接種直後は身体中が筋肉痛のように痛いと言っていた。その頃は副作用の報道がされていなかった。知っていれば接種しなかった。
741	とても注射が痛かった。
742	当時新聞やメディアなどで子宮頸がん予防接種のニュースを沢山取り上げていて、うちも早く子どもに接種したい。早く名古屋市も補助を出してくれないかと心待ちにしておりました。接種時子どもはとても痛がりました。インフルエンザの時と比べものにならないほどの痛みのうったえに、この予防接種は大丈夫か？と思う気持ちもありました。幸いニュースになるほどの様々な症状はなかったの、ほっとしています。
743	あんなにひどい副作用があると知っていたら受けさせませんでした。
744	小6以降というアンケートでしたが、生まれてからわかっているワクチンの年月日を記入したのですが、副作用で苦しんでいるお子様もいる中、我子はおかげさまで元気に学校に通学しており、少しでも、このアンケートが今後接種される方々の参考になれば幸いに思います。
745	水痘とおたふくの予防接種を2才になる前受けましたが、大学の健康診断で抗体不十分との診断を受けた為、再度接種する予定です。
746	現在19才の娘ですが、中2の秋より、3回接種しました。先に打った友人達が、痛くて手が上がらなくなったという話を聞き、本人は、部活動に支障のないテスト週間をわざわざ選んで接種し、やはり、痛くて、腕が持ち上がらない、という経験をしました。当時、4~5万もするワクチンがただで…ということで、母親達も喜んで、子どもに打たせましたが、その後の報道を知るたび、何事もなく無事に終わって良かったと、胸をなでおろしたと同時に、安易に飛びついてしまった自分を反省しました。(母より)
747	ワクチンの種類が3回目に受けたH24.1分が何なのかわかりません。Lot.No AHPVA148CBと記入ありました。
748	他に受け忘れたワクチンがあれば接種希望します。(3回引越しているの日本脳炎を許可している病院と、許可していない病院があり、そのままになっているのです。)
749	TVで副作用が出たおじょうさんのことを知りました。活発な女の子が注射で歩けなくなったのに、行政は知らんぷり。医者は、「注射が痛いと思っているから強く症状が出た」とかそういうふうなことを言っていて、同じ年頃の女の子の親として腹がえぐられるような痛み？を感じました。気のせいではないでしょう！？「副作用があると知ってたなら、受けなかった」と娘は言っていました。痛みがなんらかの形で残っている子には、通院費や雑費のフォローを国はすべきだと思います。
750	今回は、上の子のみ接種したが、下の子も接種すべきか悩んでいます。早く行政の対応や結論を出して欲しいです。
751	子宮頸がんワクチン(サーバリックス)の1回目を接種した日に、腕が動かさない位痛みがひどく、2~3日痛みが続いた。2回目以降は何ともなかった。
752	特に、心配な事はありません。ただ母親(現在57歳)がH26.9.5に子宮頸がん検診で見つかりステージ1でしたが、子宮、卵巣、その他付属物一切、全摘手術を受けました。1年経ちましたが、特に今のところ、転移もなく、異常なしです。
753	子宮頸がんの報道をみると不安になります。接種した初期の頃は副作用のことはほとんど表に出ず、とにかく接種した方がいいという推奨することばかりきいていました。流れに乗って接種して後悔しています。(母)
754	子宮頸がんのワクチンは、接種後に聞いていなかった症状(副作用)が出て、体への影響を心配でした。必要なものとはわかりますが、新しいものはもう少し細かい情報が欲しいです。

755	子宮頸がんのワクチンの副作用と思われる症状により、大変な生活を送っていらっしゃる私と同年代の方々をテレビで拝見し、衝撃を受けました。苦勞されている方々に対して、ぜひ支援してください。(苦勞されている方々が納得できる)。
756	1回目の夜熱が(39度)出ました。
757	3回受けたけど、けっこう腫れた。
758	サーバリックス接種。2年後に生理が止まってしまう(それまでは順調)。何か関係が有るのかとても心配です。
759	特に副反応などなかったが、知らずに受けて、症状がでていたら、悔やんでも悔やみきれないと思う。調子が悪くなった方々に対して本当に気の毒でなりません。義務の様な感じで接種したが、安全に十分配慮した上で接種を勧めてほしいと思います。
760	接種後翌日かなり痛かった。
761	子宮頸がんワクチンを1回目打った1週間後くらいに、少し体調が悪くなった。(カゼを引いた時の様な症状。)体がだるかった。
762	予防接種は全て受けています。(小学校、中学校で追加があったものも。)インフルエンザは、受験の時は2度(1シーズン)受けています。
763	たまたま自身の子供に副作用は出ていませんが、今回のような重い副作用の危険性のあるワクチンを無料接種できるとだけ告知は無責任。接種後ニュース報道等で知った、他の子供さんが、副作用で苦しんでいる様子は、他人事ではありません。自身の子供が、その様な反応に苦しんでいる事を想像するだけで、怒りがこみ上げます。救済は責任を持ってしっかり行って欲しいです。
764	毎回接種後にうでが痛く、赤くはれた。
765	毎回、接種後は痛く、腫れが数日続いた。
766	子宮頸がんワクチンを接種した時、自分の前に接種した子が接種後すぐ失神した。先生に‘大丈夫なのか’と尋ねたら、“精神的なもの”と言われたが、自分の接種時とても不安だった。友達にも副反応が出た子がいる。接種と副反応の因果関係をしっかり調べてほしいです。
767	注射が痛すぎる。3回目打ったあと、病院内で顔が真っ青になり吐き気がした。血圧が下がったけど、20～30分で回復した。
768	3回目は接種しなくて良いのですか？(2回目から2年経過してますが。)再開された場合、無料で接種できるのですか？又、3回接種となりますか？
769	注射後は腕が痛く、腕を上げることができなかった。
770	光をまぶしく感じるなどの症状があるため、バセドウ病の疑いがあるということで、MRI検査、血液検査などを受けました。検査結果はバセドウ病については違うという結果でした。症状は直らないので、これからまた精密検査を受ける予定です。
771	子宮頸がんワクチン、3回目接種した後すぐに副作用の報道が出てしまったので今後の影響が心配。もっと早くから気付かなかったのかと思った。もし副作用がおきたらしっかりと対応できるようにしてほしい。
772	娘にも娘のお友達にも副作用を発症した子はいないので、予防接種で防ぐことができるがんなので、接種してよかったと思います。
773	幸いにも副反応はありませんでした。“幸いにも”と感じてしまいます。インフルエンザータミフル同様、症状でている人がいるのは不安と思います。
774	子宮頸がんワクチンの接種は思っていた以上に注射が痛く、接種後は熱をもって腫れていた。実際に効果がなかったり強い副作用があるのなら接種したくないと思った。(接種した当時は副作用があることなど知らなかった。)
775	サーバリックス3回目を接種したすぐ後に気を失い、しばらく病院で休み回復。その後何もなし。
776	日本脳炎の追加がやっついのかいけなかわからなくて、そのままになっている。保健婦さんにも判断できないといわれ、素人にはどうしていいのかわからなかったが…。
777	(ここのみ母が記入しています。)サーバリックスを3回接種したあとで、ガーダシルが開始になったので、とても複雑な気持ちでした。サーバリックスも、当初は対象年齢が2歳分しかなかったの、“期間限定セール”かのごとく、非常に急がされてあせらなければという雰囲気になった記憶があります。今から思えば、何かいやな感覚があります。たまたま今のところ異常らしきものがない(気付いていない)だけで、今後、将来にわたり、何か問題があるかもと、とても心配です。母として、娘によかれと思い接種させましたが、今は後悔しています。とても後悔しています。こういった調査は、ぜひとも今後もご検討ください。ネット回答でも返答したいと思います。よろしくお願ひします!!!
778	重い副反応があると知っていれば娘には受けさせなかった。情報が、なさすぎです。国も、医師も、CMでも(学校でも)、推奨をあれだけしていたら、受けた方がいいと思ってしまうのではないのでしょうか。何か、体調が悪いと、頸がんワクチンのせいなのでは？と、不安になります。本当に、受けなければよかったと、後悔でいっぱいです。副反応の情報も、もっと、公開するべきです。
779	子宮頸がんワクチンを聞いた時は、がんのリスクがへるならと迷わず受けさせましたが、その後のニュースにはもし我が子ならと思うと胸が痛みます。良い方向へむかっていくことを願っています。

780	副反応かどうかは不明。突然のけいれん、手足の不随意運動、たちくらみ、憂うつ。症状が出て通学できなくなり退学。脳神経外科で異常なし。心療内科へ。
781	これだけ副作用があることがわかっていたら、接種はやめていたかもしれません。実際、学校のお友達が副作用で体がおかしくなり、学校をやめざるを得ないのを見ていると、とても怖いです。きちんと副作用を調査した上での接種すすめてほしいものです。
782	「これまで接種したワクチンについて」質問4 規定が変わったのに、その個人ケースに対応する書き方・記入になってないので、回答しづらかった。
783	めんどくさいです。書いた人に●ぐらください。(笑)
784	完全に安全な予防接種は無いと思うが、もっと安全性をしっかりと確認すべき。“国”がすすめるということは、“安全”だと国民が信じます。
785	子宮頸ガン予防接種を受けた翌日、38℃台の熱が3回とも出た。翌々日には下がった。(3回とも)。その後の体調不良はない。
786	自閉症(知的障害あり)の娘ですが、子宮頸がんワクチンを接種後は、「痛い！痛い！」と泣いて大変でした。
787	子宮頸がんについてはものすごく痛いと言って半泣きで打っていました。副作用が出た方は本当にお気毒です。しかし出ていないからと言え、同じ注射を打っているのに、今後、彼女の身体に変化があったら…と心配ではあります。
788	生後から指示どおり予防接種を受けてきました。子宮けいがんワクチンも、何の疑いもなく早々に接種しました。幸い副作用もなく過ごしていますが、まれに副作用でつらい思いをしている娘と同年令の方のニュースを耳にすると、心がいたみます。どうか、原因追究に役立ててください。
789	1回目の接種後、1週間ほど手があがらないほど痛かった。その後は、普通になった。2回目以降は、そんなに痛くなかった。
790	子宮頸がんワクチン3回目を打った直後、高熱が出た(39.0℃台)。土曜日の午後だったので休日診療所で解熱剤をもらった。月曜日にワクチンを打ってもらったクリニックへ報告したら「熱がさがっているならいいんじゃないですか」と受付の人に言われた。子宮頸がんに限らず、予防接種の副反応への対応や、データなんていいかげんなものかと思った。
791	子宮頸がんのワクチンの接種をした時、接種した場所が大きくはれた。かなり痛かった様です。しばらく(1~2日)たって少しずつひいてはいましたが…。
792	子宮頸がんにかかるリスクが少なくなるなら、多少の副作用があっても接種した方がよいのではないかと思います。3回接種を迷いながらも受けました。今後、子宮頸がんにかかった人のワクチンの有無を公表していただきたいです。症例はまだ少ないとは思いますが、現段階での状況でもできれば知りたいです。
793	子宮頸がんワクチンの副作用の報道を見て、とてもうたせる気持ちがなくなりました。それも1回接種したと言う中途半端でどうしてくれるんですか？もっと調べてから発表してください！！他人の子供はどうなってもかまわないのですか？
794	子宮頸がん3回目の接種で、次の日熱が出ました。
795	国の方針を示さない中、名古屋市が動き始めてくださったこと大変うれしく思います。テレビ報道では、注射後すぐに(病院にいる間に)変な症状がでていのに因果関係がないとの対応を国がしているように思います。納得できません。まずは治療費補助をすべきです。同年代の娘を持つ親として、副作用の出た方々の救済・保護を強く求めます。お願いします。
796	予防の為と思って娘に接種させましたが、3回とも接種部が大きくはれ、うでがあがらない(あげると痛い)状態が2~3週間続きました。
797	母(妹)が子宮ケイガンになったので、ワクチン接種させました。娘には異常なかったのですが、その後いろいろ報告されるようになり、下の子の接種は見合わせています。
798	今は治っているが、高校2~3年にかけて、うつ的な症状がひどく、全身がだるいとか原因不明のことをよく言っていたので、当時は子宮頸がんの副作用ではないかと疑っていました。実際に病院で診てもらった訳ではないのですが、副作用だったのでは？と思います。
799	ガーダシル接種後、接種部周辺硬結、筋肉痛、疼痛、握力が入りにくい、肩が上がらない、等症状がありました。しばらくしたら(1週間位…)症状が改善のため病院等受診なし。発熱なし。
800	これまでの接種は保護者が記入しました。母子手帳を参考にしましたのですみません。
801	3回目のワクチンを打つ直前に、TVで副作用の報道が有り、とても迷いましたが、今まで、乳時期から色々な予防接種を受けさせてきて、何の問題もありませんでしたし、体調も良かったので、打つ決断をしました。娘に自病やアレルギーなどがあつたら、2回目で止めていたと思います。
802	すごく痛かったので、あの痛みをどうにかしてもらいたい。
803	今までの注射の中で一番痛かった。
804	注射後、ひざに痛み。30日~半年ほど。原因は不明。
805	副反応の報道を見たら接種するのが心配になった。

806	子宮頸がんワクチン接種後、翌朝身体が全く動かなくなりました。高熱で、とのことでしたが副作用だろうと医者から言われました。その後、後遺症等なく動けるようになりましたが、そこまでの反応がでるとは思いもよらずただ驚きでした。もうあんなこわい思いはしたくないです。
807	頸がんワクチン接種後、他のワクチンに比べて、非常に痛かったし、(他のワクチンは2-3日後腫れは収まっていくが)、1週間位、腫れはつづき、痛みも続いた。
808	親の意見…この回答をした娘は長女で、予防接種もまめにに行っておりました。しかし子育ての間に(3人子育てしております。長女と下の子の間は9年間あいております) 予防接種のワクチンやうち方、長女の時は打っていたのに、次女や長男の時は見合わせる…など、大きくいろいろ変化したので、予防接種にいつ行けば、いつまでに、どの種が必要なのか…が把握しきれなくなりました。なので次女、長男は、2期や追加接種があまり行けなかったのが現状です。わかりやすく通知文など、変化のある時の対応があると良いと思います。
809	副作用についてほとんど情報がない時期だったので、子宮頸がんワクチンを接種したが、仮に今、接種するかと聞かれると、不安に思い、止めるかもしれません。重い副作用はありませんでしたが、接種した腕は1週間程動かすと痛み、これまでの予防接種とはあきらかに違っていました。より安全なワクチンが作られるとよいと思います。
810	子宮頸がんワクチン接種後は、数日、からだがだるく、熱っぽく、筋肉痛のような感じがした。まわりの友人も、同じ症状だった。
811	推奨されていた時期だったので、適齢期になったらすぐ頸がんワクチンをうけました。
812	接種後、腕が腫れ(二の腕全体)、1週間ほど痛みが続きました。
813	接種した所がさわると痛くて2、3日しりの様になってしまった。
814	注射をうたれた後は、2〜3日腕があがらずはれ、痛みは相当あったようです。
815	子宮頸がんワクチンは、注射はとでも痛かった様です。うってから1週間ぐらいは、うでがはれて痛がりました。
816	ワクチン接種により苦しんでいる方を早く救済してください。
817	サーバリックス接種。2回、3回目は局所の疼痛も他の予防接種より強く訴えた。また2、3回目接種後、1週間くらいに38度前後の発熱があり受診したが、副反応とは考えにくいと医師に説明された。その後は特に異常はないが、当時は、不安だった。
818	少し痛みがあった。
819	受けたあと、少しはれた。数日間痛みが続いた。
820	発達障がいがあるため、質問について、よくわからない事や、症状が本来のものか、予防接種によるものなのか不明であったりする。
821	打った後、2日間位、常に痛かった。
822	アンケートに答えてもらうのなら、もっと適切な書式を作ることが正しいデータをとるには必要ではないでしょうか。答える側は古いデータを出してきたり、この為に時間をとっているということを忘れないで下さい。形ばかりのアンケートは無意味です。年度によって接種の方法が変更しておりこの書式では非常に書きにくい！！もっと適切なアンケート用紙を作成し、データをまとめるのにふさわしいものにするのがお願いする側の礼儀です！！通常の予防接種の副作用が長期にわたったのち現われるということはないかと思えます。今回子宮ガンの予防接種はなぜこのようなことになったのか、不安がいつまでもぬぐいきれません。責任の所在及びもっと安全性を確かめた後接種の推奨をして下さい。
823	子宮頸がんの2回目の予防接種時に、腕がすごく痛かった様で、3回目の接種をためらう程でした。娘の友達には、接種後の痛みにより、学校を休んだ子もいた様でした。1回目の接種時に、どこの病院に連絡しても、ワクチンがないと断られ(接種の手紙が届いた直後なのに)10以上の病院に連絡し、やっと接種してもらえました。もう少し計画的に実施してほしいとその時思いました。
824	何回目かは覚えてないのですが、子宮頸がんワクチンを接種した後、熱と体の痛みで病院にかかったことがあります。
825	副作用はありません。
826	母子手帳を見ながら書きました。
827	月経不順については、婦人科の先生より子宮頸がんとは関係はないと聞いています。又、本人の意見を含めて、月経不順については婦人科の先生に相談し、現在、様子見しています。
828	強制的な宣伝はやめてほしい。副反応のない接種をお願いしたい。他国で影響のなかった薬剤を使ってほしい。認可はきびしくてよい。
829	早めに予防接種をし、接種が終わってから副反応の事を報道などで知り、とても不安。病院にはずっと通院していて、これがいつ終わるのか心配。接種した事を後悔しないようになれば良いのです
830	帯状疱疹と子宮頸がんワクチンの因果関係はわからない。医者は2回目以降の接種を勧めてきた。
831	今、思い返してみると、接種した次の日に頭が痛いと言っていました。すぐに治まりましたが、少し気になっていました。
832	こんな恐い注射はやめてください。
833	現在も通院中。薬の服用が欠かせない。原因が不明なため、月経困難症とされた。(以前は痛みも生理痛も感じないレベルだった。)
834	子宮頸がんワクチンによる痛みは出ませんでした。

835	長く続く症状が出なかった事は幸いですが、接種した後、何日間も手が上がらなかった様で、心配になりました。
836	いつでも何時間でもねむれるのと、起きてもすっきりしないのはワクチン接種が原因なんではないでしょうか
837	ワクチンを接種してからいろいろと問題があることをTVや新聞で知りました。知っていたら怖くて接種しなかったと思います。
838	国がやっている事なので安全と思い接種し、幸い何もなかったが、TVなどで知り、三女はアレルギー体質のため、接種をやめました。
839	接種後、1週間ぐらいは、接種したところが異常にはれて痛かった。
840	保護者です。子宮頸がんワクチン接種当時、娘の為に打たない方が正しいような空気でした。副作用の確率なんて、インフルエンザ以下だったのに。インフルエンザが打てないお子さんが、子宮頸がんは、異常なかったよ。ときいて、娘の接種を決めました。正しいデータをわかりやすく提示して、早期再開を期待します。
841	予防接種は必要であればできるだけ早めにうつようにしていましたが、娘の年代でもし予防接種で防げるのであればと思い接種したすぐあとに副作用の問題が大きくなりあげられました。その後の2年くらいは非常に不安な毎日でした。ましてや今現在同じような年の子どもが副作用で何の保障もなく過していると思うと、大変つらくなります。早く解決させてほしいと思います。
842	痛かったのですが我慢できる範囲でした。1ヶ月近く発赤・腫脹・熱感(刺入部)ありました。(他の予防接種より格段に強く反応しました。)
843	子宮頸がんワクチンを接種後、娘が非常に痛がっていたことを覚えている。幸い何もなくて3回目の接種まで終了したが、多くの問題が出ている今の状態であれば、接種をしなかったと思う。親は、病気にならないようにと接種するのであって、そのワクチンが原因で病気になることなどあってはならないし、悲しいことだ。実態調査はとても良いことだと思うが、遅い気がする。予防接種を行うにあたっての調査や研究が本当に確実にされてきたのかが疑問だ。因果関係、本人の体調等難しい問題だと思うが、この調査のように実態を把握し対応していただけることを強く望みます。
844	子宮頸がんワクチンは、娘の中2ぐらいの時に始まりました。その時は副作用のことは何もなかったのに、何も考えず打ちましたが、他の予防接種より痛みが残ると言っていました。又、友人の中には倒れた子もあり、うちの娘は痛み以外何もなくてよかったですと思います。
845	子宮頸ガンワクチンを接種した後も、変わったことはありませんでした。
846	無料の予防接種は、必ず、行ってきました。
847	3回目の接種直後から腕がすごく痛かった。痛みとは別で腕が上がらなくなり着がえが困難になった。(2週間くらい)
848	年が正確なものかわかりません。すべて中2のときです。(インフルエンザは中3のとき)
849	2、3日痛かった。(接種後)と言っていました。
850	現在高1の妹がいます。無料期間が終わる年で、今、1回目を接種しないと有料になってしまいます。接種はしたいが怖さも強いです。もう少し様子をみたいので無料期間の延長を強く希望します。
851	子宮頸がんワクチンを接種した後のほうが月経痛が強くなった様に思います。(3回全て終了後から)。ただ月経がきちんと毎月来る様になったのが6年生の中頃で、中学1年でサーバリックスを接種したのでワクチンが影響しているかどうか…。現在中学3年ですが、鎮痛剤(1~2回/1周期)の服用で日常生活を送っています。
852	途中で接種を止めてしまったが、その後の影響はあるのか?再度、接種する必要性はあるのか?
853	無料でうけることが出来ました。早くハッキリしたことがわかると思います。
854	副作用が出るとしたら、接種後どれくらいで出るか知りたい。中学の同級生が、副作用がひどくて、自分も出てしまうのか、すごく不安。
855	注射はとても痛かった。副反応は心配だったが無料だし子宮頸ガンの予防になるので接種しました。
856	早めに接種したので、1、2回目は有料にてうけました。何だかちゃんと接種した人が有料もおかしいですね。後で返金してくださると良かったです。ついでに、今は接種しない人の方が多いと…。何か考えさせられますね。
857	記入ミス、すみません。子宮頸がんのワクチン接種後、腕が重く感じるものが何日かありましたが、周囲の人より軽い症状だったように思います。ですのでどう記入してよいのか分かりませんでした。他は、特に何もありませんでした。
858	ちょうど副作用のニュースの報道と同時期に1回目2回目と接種していたため、不安になり止めてしまったが、3回接種しなければ意味がないのか、0回よりも打っている方が良いのか、そのあたりの報告がないのでわからないままである。広報に情報をのせてほしい。
859	注射がことのほか痛く、気持ち悪さを感じたので接種をやめました。不気味な感じだったようです。予防接種にも良い悪しがあり、自ら調べることが必要だと感じました。副作用が出た方は本当に気の毒です、二度とこんなことがおこらないで欲しいです。
860	接種により、妊娠しにくくなる(流産しやすくなる)と、後で聞いたことがあります。多少の不安もあるのですが、明らかにして頂きたいです。国が安全とうたっていたので信用し、娘の将来を思い接種しました。必ず答えて頂きたいと思っています。

861	子宮頸がんワクチンを一度のみで止めてしまったけれど、効果はどうなのか？今後どうしたら良いのかがわからない。
862	サーバリックスが出てすぐ接種したが、その時には副作用がそれほど強く出るとは思わなかった。後にひどい症状が報道されゾッとしました。副作用が出なくて…はラッキーなだけで、安易にすぐ接種した事を後悔しました。後遺症が出たお子さんは本当にお気毒です。医療費の救済拡大の記事を見て少しだけ安心しましたが、多くの被害者の方が対象として救済されることを願います。
863	注射接種後、本人が気にするような皮フの痛みがあったのを覚えています。そのご、特に問題はありませんでした。
864	4才下に弟がいます。日本脳炎の予防接種も途中で止めてしまいました。外国に行く際には、やっぱり接種した方が良いのでしょうか？
865	月経不順があり今現在も産婦人科に通院しておりますが、この予防接種を受けたために月経不順になっているのでしょうか？食事も、バランスよい食事をとらしておりますし、以前から産婦人科にもどうしてか？と問いただしておりますが、このアンケートで不安になってきました。
866	3回接種して、3回身体がだるかったが、1日でおさまりました。
867	今1年生です。残り2回は開始後何才であろうと無料で接種できますか？
868	接種後、腕が腫れ上がり、かなり痛かった様です。数日間、腫れと痛みが続きました。
869	腕に激しい痛みがあった(打った直後、腕が上がらなかった。)
870	子宮頸ガンの副反応について何ら進展がない事に疑問を感じます。10才の娘がおりますが、接種するかどうか悩んでおります。しかし、今のままですと接種しない方がよいのかもと思います。
871	2回接種したのですが、3回目接種した方がいいですか？2回でも効果はありますか？ガーダシルは副作用は大丈夫ですか？
872	学校の先輩がワクチンの副作用で苦しんでいます。大切な大切な先輩で大好きな先輩です。この調査票のこと、もっともっと色んな人に広めてほしいです。少しでも先輩が苦しんでいることを色んな人に知ってほしいです。また副作用で苦しんでいる人たちを色んな人に知ってほしいです。少しでも先輩や苦しんでいる方たちの力になれるように祈っています。
873	副作用の報道のあと、インターネットに「あのワクチンは●では危険なので使用されなくなったものが大量に余ったので日本が押しつけられた」「本来動物に使用する薬剤」「あのワクチンを打つと不妊になり日本人の人口を減少させ乗っ取る●からの意図で●が政府や省庁に入りこんで決めた事」等不安をあおる書き込みが多数あり、それに対し「怪しいワクチンだから受けさせなかった」等のレスポンスが多くあったため不安になりました。
874	接種1回目～3回目、どの時も注射は他の予防接種よりも痛く、痛みも長く続いた。たまに足が痛い時があるが、次の日には治っている、ということが時々ある。不妊になるのではないか心配！！はっきりと教えてほしいし、知りたい。
875	今の副作用の情報があつたら接種しなかった。当時は情報がなかった。
876	注射を打った後の腕の痛みが長かった。
877	友人は、腕が痛すぎて腕を全く上げることができないという子もいれば、片までは上げることができるという子もいました。私は腕が痛くなることはありませんでした。個人差が大きいと思いました。
878	おかげさまでどんな予防接種をしても、副反応があつたことは一度もありませんでした。子ども3人おりますが、3人とも副反応は一度もありませんでした。今年21才になる子の母より。
879	接種部位が腫れ、痛みが1週間程あつた。1回目、2回目の接種した翌日に頭痛があつた。
880	生理不順がひどいのは、頸がんワクチンを接種したからなのでしょうか？
881	子宮頸がんワクチンは良いと思って接種したが…。障害等の悪影響の報道を見ると心配になる。今、何も無ければ、安心出来るのでしょうか？又は、将来支障が出てくる事も有るのでしょうか？不安になる様な報道ばかりでは困る。
882	子宮頸がんワクチン接種後は、腕が上がらなかったとのこと。麻しん・風しん混合接種の後は発熱し、かかりつけ医に行きましたが、「接種のせいではない」と言われた。でもその後はワクチン接種に抵抗を感じるようになり、日本脳炎(第2期)はうけていない。
883	1度目の接種後、めまいのような症状があり、足もとがフラフラして転びそうになったので病院でしばらく様子を見てから帰宅しました。その後は、体調に変化はありませんでした。
884	娘が子宮頸がんワクチンを接種する頃、18型は日本で発症している人があまりいないと聞いたため複数あるガーダシルを選択しました。同級生の子たちはサーバリックスを接種したのかすごく痛く、腫れたと聞き、そんなに痛くなく、腫れもそこまでひどくなかったのでガーダシルを接種して良かったと思いました。
885	子宮頸がんのワクチンだけ、異常にワクチンをうったカ所がはれて、痛みがあつた為、テニスの試合などに影響があるので制限内の接種を守ることができなかった。
886	接種後、頭痛と腕がものすごく痛かった。
887	因果関係の証明がしづらく、難しい調査研究だと思いますが、進展があることをお祈り申し上げます。

888	当時は副作用の報告もなく何の疑問も持たずに、ひとつでも予防できるのならと思い娘に接種を受けさせました。今の状況でしたら、受けていないと思います。接種の推進に疑問を持たずにはいられません。副作用(副反応)のリスクと将来の子宮頸がん発症のリスクがてんびんにかけられた様な状態で無責任に娘の命を左右するような選択を委ねられるのはとても恐い事です。
889	2回目を接種するか、とても不安でした。今まで接種した方や、病院の先生、知り合いのナースさんに聞いたけど、どの方も大丈夫と言われました。最終的には親の判断に任せますと言われ、もしうちの子が障害が出たらと思うと不安で、1回だけ接種して止めました。
890	接種時から腕の痛みが強く、腫れもかたくなり、とても痛そうでした。ひどいとき、(2回目くらい)腕を上下させるだけでも痛がっていました。(母)
891	子宮頸がんワクチンは、3回接種しました。特に副作用はなく、腕が筋肉痛のように痛んだのみでした。1回めは23年の8月29日、2回めは23年10月3日、3回めは24年3月14日で、3回共に同じ内科で接種をしました。内科までは家から徒歩5分で、歩いて内科に向かい、歩いて家に帰りました。部活は文化部で特に運動を毎日していたのではありません。少しでも参考になることがあればいいと思います。よろしくお願ひいたします。
892	出来るだけ早く接種した方が良いと言われた子宮頸がんワクチン。中1になってすぐに受けさせましたが、後になって後遺症が多く報告され、今のところ何ともないことにホッとしています。予防の為に受けた物でそれ以上の症状に悩まされるなんて、あってはならないことだと思います。もっと確実に調べてから、国として推奨すべきではないでしょうか？
893	何年も前のことなので身体の症状に関しての質問は答えづかった。日常生活の中でも起きる症状なので、ひどくない限りはそのままにしているとして少し不安もある。副作用はすぐ症状としてあらわれるものなのか、時間がたってからあらわれるものかよくわからない。安全なものだけを受けたい。
894	近所の●から「●が、がんばって無料で受けられるようにしてあげたんだから」と何度も強くすすめられ接種しましたが、やめておけばよかったと思っています。今は元気にすごしていますが、今後のことが不安です。副作用で苦しんでおられる方々を1日もはやく元気な姿に戻してあげて下さい。
895	手帳に記入されてある接種年月日が西歴と和歴とまざっていたので分かりにくいです。
896	今まで色々な予防接種をしましたが特に異状がなく、子宮頸がんワクチン2回目の時、接種直後に意識を失いすぐに気がつきましたがとても恐かったです。その後は特に後遺症のようなものはみられていませんが、3回目を打つ気持ちにはとてもなれませんでした。しっかりと危険性を調べていただきたいです。
897	質問5(2)に書いたように医師におたずねした際、一応、受けさせるつもりで医院に行ったのだが、(報道では、副作用の話を知っていたが、積極的にストップする状況ではなかった頃だったと思う)1回目で大丈夫でも次回どうなるかわからない、など丁寧に説明していただき有難かった。しかし、姉の際には、同じ医師の方は3回普通に接種されていたし、本人が1回目の時も…と思うと、複雑な気持ちだ。
898	予防接種としてのリスクは覚悟していたが、予防の効果優先で受けさせました。当時、本人も友人も啓発のパンフレットなどで、受けるのが普通という認識だったと思います。
899	子宮頸がんワクチン。2回目と3回目に熱がでて学校休んだ。
900	多くの方が副作用に苦しんでいると子宮頸がんのワクチンを3回接種した後に知りました。又、子宮頸がんのワクチンに関しては、効き目が一生続くわけではなく、又接種する必要があると聞きましたが、20歳の娘が早い時期に副作用があるかもしれないという危険をおかしてまで受ける必要があったのでしょうか？非常に疑問です。
901	子宮頸がんワクチンは10年程度しかききめがないと聞いた事があります。今後は産婦人科で検診を受けた方が良いでしょうか？出産する頃には効力が無くなっていると思われれます。今後副作用が出る事はありますか？
902	今後、何か症状が出ないか？とても心配です。受けなければ良かったと後悔しています。長女に関しては自費で受けてしまいました。
903	予防接種には副反応がでるおそれがあることは承知しております。子宮頸がんワクチンは他の予防接種よりも副反応のみとめられる率は多いのでしょうか？確かに他の注射より痛い為、年頃の女の子達がこわがり、気を失うということもあるとは聞きます。後遺症のでのた方の率を知りたいです。
904	接種後、二の腕全体が腫れ、10日間ほど痛みが続きました。
905	今の副作用の情報があつたら接種しなかった。当時は出始めて情報がなかった。
906	サーバリックス接種後、腫れと痛みが強く出ました。うでが上らない(数日)。
907	接種後の腕の痛みが長かった。
908	質問が答えにくいです。ワクチンに限らず体調を崩してしまう原因は多数あるわけで、体調を崩した原因としてワクチンの可能性があると思うかどうかと聞かれても何とも言えません。あと調査するのが遅すぎると思います。過去のことになればなるほど誤った回答が増えると思うので。準備に時間を要するということは理解できますが、それにしても人命に関わることなのに遅いと思います。
909	この調査をもとに、現在副反応により体調不良をおこしていらっしゃるお嬢様の手助けができればと思います。思春期の素晴らしい時期に、思いかげない体の変化にご家族の方も辛い日々を送られているかと思うと心痛いです。少しでも早く回復される事を強く願っています。頑張ってください。

910	親ですが昔は学校で予防接種をやっていたのになぜ個人で接種しに行くようになったのでしょうか？やはり働いていると忘れてしまったり、ついつい先のばしにしてしまったり…。子供を守るために接種した子宮頸ガンの副作用のニュースを見ると悲しくなります。
911	親せきで副作用がでて困っています。本人が副作用が出たらどうしたらいいか不安です。
912	母より、53才ですが、ワクチン接種した方がいいのか、安全性、(かかる)確率などの情報が欲しいです。
913	こんなあぶないワクチンを接種できますか？！2回受けましたがとてもおそろしいです。行政不信です。
914	子宮頸がんワクチンに限らず、予防接種には必ず副作用のリスクが伴います。これは予防接種に限ったことではなく、全ての医療にいえることだと思います。現実には副作用が強く出てしまい、その後の人生に大きな影響を受けてしまった方は、本当にお気毒だと思います。が、数パーセントのリスクの為に、残りのベネフィットを捨ててしまうのは、決してやってはいけないと思います。リスクを負ってしまった方のケアも含めての施策をしっかり行って、こういった予防接種は推し進めるべきです。私は、子宮頸がんワクチンの副作用に苦しむ女の子と、そのお母様の取材をしたニュースを見ました。本当にお気の毒でした。もし、自分の娘に同じ事が起こったらと考えると、言葉もありませんでした。このお母様は、はっきりと「こんな予防接種はやめるべき！！」とおっしゃっていましたが、それはまちがいだと思います。それよりも、女性だけが負う病気の原因は男性にもあること、そういった事をきちんと男性にも理解をさせる取り組みなどをするも大切だと思います。国や公も本当にこの予防接種ワクチンに自信があるのだから(きちんとしたデータをもっているでしょ！?)予防接種を推し進めたのでしょ！?それとも、他に利益があって(製薬会社と国の利益)その為の施策だったのでしょうか？何か、少し問題が起きると、すぐに体制を変えると、ついつい疑いたくなります。やると決めたら、自信を持ってやって下さい。皆さんを信じている人が大多数です。
915	1回目のワクチンを受けた後から体調が悪くなり、数ヶ月してから、高熱が出続けました。病院でも原因不足で、1ヶ月程寝込みました。恐ろしくて、2回目は受けられませんでした。接種してから数ヶ月後のこと(=1ヶ月寝込んだ時期が)だったので直接ワクチンに結びつけることが、できませんでした。今では、やはりワクチンが原因だったと思っています。
916	子宮がんになりにくいとのすすめで受けたのに、あれだけニュースなどで副作用の報道が流れるととても心配になり、これなら2回共受けなければ良かったと思っています。我が家は副作用ありませんが2回接種した事で、1度も接種してない子と比べ今後副作用が出てこないかと今でも心配です。
917	子宮頸がんの予防接種で重い副反応に苦しんでおられるお子さんが心配です。市からの無料接種の案内がきたときは今のように問題が取り上げられておらず、防げるガンとして予防接種が無料で受けられることをありがたく思いました。ただ接種にあたり2種の選択(サーバリックスかガーダシル)もよく分からなかったのでネットで調べていたところ、様々な不安要因や海外ではすすめていない、防げるガン(型・タイプ)が限られるなどの情報があり、知人、薬剤師、ドクターにも色々聞いて納得した上、結局、3回接種し、幸い副反応もありませんでした。そのわずか3ヵ月後に副反応の問題が大きくなりあげられ、大変おどろきおそろしく思いました。子供に将来何が起こるか分からない、まだ歴史が浅いのもこわく、親として接種をもっと考えるべきだったと反省しました。女性、子供、しいては出産において何らかの影響が出ないとも限りませんので早急に原因をつきとめて頂ければと思います。(市による調査を実施して頂き感謝致します。)母
918	生理不順で困っています。子宮頸がんワクチンの影響はありませんか？
919	インフルエンザも接種した方がよい物なら無料で接種できたら、小さなお子さんの親はたすかると思っています。子供をそだてやすい名古屋になる為の一步ではないでしょうか。
920	3人の子供(女子)がいますが姉1人のみ受けました。(子宮頸がんワクチン)。次の日に元気でしたが熱が出てしまい、次の子供にはうてずにいます。このようにアンケートをして下さると助かります。
921	親せきに副反応が出ました。本人に副作用が出現しないか心配です。
922	接種後2時間後くらいに顔も青白くなり、唇も白くなり意識がもうろうとしてしまい、すぐに病院に電話をし診察を受けました。病院に到着した時には、発熱もあり、ぐったりとした様子で、娘のあの様な全身が真っ白な状態を見て、このまま死ぬのではないかと思いました。1回目接種後は痛いとはしばらく言っていました。具合が悪くなる事はなかったのですが、2回目を受けましたが、受けなければ良かったと思いました。医者からは痛みによるショックではないかと言われましたが、私にはサーバリックスが原因だと思えません。TV等で、副作用で、日常生活がまともに送れなくなっている子を見ると、気の毒でなりません。予防するためのワクチンで、具合が悪くなるのは有り得ない事です…。
923	3回目のサーバリックスを医者からすすめられたが、報道を聞いたので、2回接種させてしまったことを本当に後悔している。今後何かあれば必ず裁判等公的手段を取りたい。副作用を公表せず、医療機関に無償で提供した愚行を役所は反省すべきだと思う。
924	3回分、接種をしましたが、領収証が1、2回分しかありません。2回分の接種費用は、補助が出ません
925	子宮けいがんワクチンを3回受けたとキオクしていましたが、母子手帳への記入は、2回のみでした。
926	友人が副反応(副作用)が出たらしく、高校を中退しました。原因を見つけてそのような人が減ることを願っています。

927	今年になって、子宮頸がんの調査を出すのは、国としては、とても遅くないですか？なぜ、もっと、早く、調べないのですか？今までに、接種を受け、症状が出て、困っている方も、みえると、思います。子供達には、未来があります。
928	今まで経験した予防接種の中で、注射している時の痛みが1番ひどかった。
929	子宮頸がんワクチンは女の子対象ですが男の子にも有効なワクチン接種をお願いします。我が家には高1の娘と中1の息子がいます。とても心配です。
930	通知が来たので子宮頸がんの接種を受けた覚えはあるが(病院名も)2回までは記憶にあっても3回目は記憶にないです。日本脳炎も、中学の時受けた気がします。
931	もう、うちません。あとが恐ろしいです。
932	子宮頸がんワクチンは2・3回目はうでが少々はれました。問題点(ワクチンの)などテレビや新聞でやっていたので幼い頃からのかかりつけのお医者さんと相談しながらやりました。接種後30分以上は病院で安静にしてやりましたが、3回とも特に気になるような副作用はありませんでした。色んな意見あると思いますが、うちは親、本人、医師とよく話し合い考えた結果です。何でも禁止ではなく、個々、家々考えられる選択でもいいと思います。(ある程度自己責任になりますが)
933	注射が痛かったと言ってましたことを記憶しています。
934	これほどの副作用があるのであれば受けなくても良かったと思った。(娘の場合は、まったく副作用は、ありませんでした。)
935	予防接種の後、体がだるいと言って部活を休みましたが、2、3日で元に戻りました。
936	接種後にとても痛がり、しばらくの間、痛みが引くことはありませんでした。その後副作用の報道があり、大変心配になりました。下の娘は接種しない意向です。
937	3回とも接種後全身のつらい痛みがあり翌日は学校を休みました。痛みは2～3日で引きましたが今考えるとちょっと恐ろしいです。
938	高一からの月経不順が、ワクチンと影響しているのではないかと心配しております。普通にあった生理が、ワクチン接種後だんだんとなくなり、今は薬をのまないところの状態です。因果関係が知りたいです。ワクチンをうったあと、手が上がりませんでした。ワクチンをうったことを後悔しております。
939	3回目接種後、腫れがひかずしこりようになって痛みもずっと続いていました。(現在は大丈夫です)
940	無料ということで受けた。副作用が心配。これから先…。今の所なにもないが、今後の対応など…。
941	毎回射ってもらったたびに寝返りがうてない程痛かったのを覚えています。その他に症状は出ませんでした。
942	1回目23年8月25日、2回目23年9月22日、3回目24年2月16日に接種しています。病院の証明書にはLot. No.AHPVA129CA、AHPVA 146BA、AHPVA148BAと記入されています。
943	子宮頸がんワクチン接種後、体のだるさを訴え、次の日は一日中寝ており、とても心配しました。副作用の報道が出てから心配になり調べましたが4価ワクチンには余り副作用が出ていないことを知り安心しましたが、副作用の事をもっと調べてから接種勧奨をしてほしいと思います。副作用の出たお子さんには国がきちんとフォローしてあげてください。健康な身体に戻る様に！
944	子宮頸がん注射接種後、腕が上がらないくらい痛くなった。
945	たまたま我が子にはいまのところ副作用らしき症状はありませんが、重大な症状が出てしまったお子様のことを思うと、いてもたってもいられません。どうか、その方たちが少しでもより良い生活が出来るように、全力を尽くしていただけたらと思います。
946	当時は特に問題にされていなかったもので、ワクチンを受けた後に非常にイタイとうたえてはいたが、それがあたり前と思いがまんさせていました。今思えば、ちゃんと医師に伝えればよかったと思っています。
947	接種後、微熱がでる程度でしたが、TVでみるような後遺症がでると知っていたなら、子宮頸がんワクチンは接種しませんでした。娘には何もなくて安心してます。
948	子どものためと思い急いで子宮けいがんワクチンを接種しました。副反応もなく終わりよかったと思っています。しかし、表面上は何事もなくみえても、注意すべきことがあるならば、どんな小さなことでも発表して下さい。必ずお願いします。
949	子宮頸がんのワクチンを受けた後、具合が悪くなって、うった腕がはれて、微熱を出して、2日ほど、しんどかったです。
950	ワクチン3回接種しましたが異常はなく安心してはいますが、今後も注意はしていないといけないのか心配です。
951	2回接種後、副作用がこわくてやめました。後1回で免疫ができると思い迷いました。結果は、やめました。
952	3回目を打った後に腕に激痛があり、続いたので総合病院を2ヶ所受診しました。2～3ヶ月程度(?)原因不明で腫れと激痛で学校にも支障があり、子宮けいがんワクチンの副作用かと思いました。リンパを流すようマッサージ(自己流)で段々とよくなり完治しました。病院でも子宮けいがん副作用が疑われましたが、確信は持てず痛み止めに“●”を処方されました。
953	腕がはれてとても痛がっていました。

954	サーバリックス2回目接種の翌日の朝、ひどい頭痛と吐き気で起きられず1日学校(中学2年時)を休んだ。接種した医院を受診したら「低髄液性頭痛」と診断された。しかし、それまで一度もそんなひどい頭痛は無かったのでサーバリックスの副作用だと思っている。又、その後、成績が下がったので、気になっている(副作用ではないかと)。しかし、簡単な計算ができないとか、そのようなことはなく、成績が学年1位をずっととっていたのが、サーバリックスを打った半年後から学年8位ぐらいになってしまった。それぐらい大した事ではないと思われるかもしれないが、もの忘れも増え、うっかりミスも多くなったと思う。
955	当時は、かかりつけ医者から打つように促されていました。今年無料になると言われて飛び込みで打った世代です。何事も無かったので良かったのですが、やはり不安になりました。医者がよいと言えば信用します。どうぞ調査を生かして、納得できる報告をいただきますようお願いいたします。
956	予防の為、接種を受けましたが、これにより体の不調が出て来ている様に思われます。日頃の些細な不調でも生活に支障をきたし、それがワクチンによる物が作用しているかも考えると接種を止めればよかったと後悔しています。あらゆる面で安易な考えで物事を進めてはいけなと思います。何事にも慎重に実行するべきです。
957	子宮頸がんワクチンは回を重ねるごとに痛みが強まっていた。3回目の後は、2-3日接種した方の腕が上がらずとても痛がっていた。
958	原因不明の症状が次々と出て、病院(市内)では、心因性・思春期特有のストレスと言われ、失神して1時間意識が戻らず、救急車を呼んでも、医師には「この子は心因性だから救急車で来ててもやる事がない」と言われ、それ以降、市内の病院では、なかなか親身になって診ていただけない。県外の病院に片道1~3時間かけて通う日々が続いています。交通費だけでもかなりの金額ですし、通院するために親も仕事を休まなければならない、金銭面でもとても負担が大きくなっています。安心してかかれる病院や治療体制を1日も早く整えてください。
959	筋肉が数日痛く、固くなった。今は異常なし。
960	上記(前項)の接種ワクチンにつきまして、誕生以降全ての物を記入してしまいました。小6以降となりますと上記のうちの、子宮頸がん、MR、DPT、B型肝炎、髄膜炎菌、インフルエンザの6種類となります。
961	経験したことのある注射の中で一番痛く、その後一週間ほど筋肉痛のような状態になりました。字を書くのが少しつらかったので勉強はしにくかったです。
962	2006.12月~2011.1月末まで米国に転勤のため行きましたので多くの予防接種を受けています。
963	子宮けいガンワクチン、うけさせるのではなかったと思いました。実は私自身、ワクチンをうたないで大人になり絶対子供には、きちんとうけさせなくては、と思っていたのですが、くやしいです。子宮けいがんワクチンのせいではないともおもえるし、統合失調症といわれ苦しいです。ただ、何が原因なのかわからない苦しいだけです。何度か精神科でもいって見たのですが「スルー」されました。
964	1回目のあとひどく腕が痛くて翌日学校を休んだ。しかし、3回目まで打った。このアンケートの項目では、3回目まで接種した人で副反応が出た人が書くところがない。3回打って出た人は“その他”にわざわざ書くしかないのなら正確なアンケートにもならないし、副反応を詳しく聞くアンケートもないなら無意味！！
965	接種後にTV報道を見て、将来の娘の体がとても心配です。大変になった子供さんがお気の毒です。
966	2回接種済みですがワクチンはさいているのでしょうか？もし接種が再開された場合、残りの1回を接種すればよいのか？中途半端でとても困っています。早急の回答をお願いします。気になりずっと不安で仕方ありません。
967	子宮頸がん予防接種直後は、気になる症状は出なかったが、今後子宮に関する何か異常が出るのではないかと、不安である。何か異常があっても、予防接種との因果関係が証明できないとの事で、国も名古屋市も責任はとってくれないのだろう。これからの人生をこんな気持ちで過ごすことになるなんて、国も名古屋市もとんだ罪つくりをしたものだと思う。接種前に何度も名古屋市に安全性を問い合わせたのに、接種した者は、単なる人体実験だったようだ。
968	今、娘が苦しんでいる動悸、息切れ、胸が苦しいという症状が子宮頸がんワクチンによるものだったら許せない！訴訟起こすつもりです。中3という受験生の大事な時期に病気と戦って頑張っています。代わるものなら私が代わってあげたい。中1の2月まで幸せな日々が続いていたのに返してほしい！！世の中ではもっと苦しんでいる人がいっぱいいるはずです。ワクチンによるものなのかしっかりと調査してメディアに公表して下さい。
969	ワクチン接種後に起きている症状を、事実を、きちんと把握し一刻も早い対応を望みます。
970	不安にさせないで下さい。母
971	接種後一時的にでしたが体調を崩しました。ちょうど、試験前で部活がお休みのこの時にとったのですが…。3回めは確かに接種したと思いますが、日にちの控がみつかりませんでした。
972	早めに結論を出して欲しい。

973	重篤な症状が出た人がどんどん増え、実際3回目の接種の時には長い時間病院にとどまり様子を見るよう指導を受けたりして、接種をしたものの、何かあると怖い、と思いながら途中で止める事にも迷いがあり、窓口で「どうしますか？」と聞かれることに、とても違和感を覚えました。国が推奨しておきながら、問題が起きはじめたら自己責任なのか？！と思うと納得も出来ませんし、何かあった後では後悔しきれません。身近にも学校を退学せざるを得なかった方がいます。娘はこれの副作用とは違うかもしれないですが、疲れやすく、体の重いことがよくあります。副作用なのかを調べる事が出来るのか、どこで調べれば良いのか、そうだった場合、改善する方法はあるのか？などHPや医療機関、保健所等でPRが必要だと思います。費用も負担して下さい！！同じ様に不安を抱えている人はたくさんいます。やりっ放し、ほかりっ放しは国の無責任と感じます。
974	いつ接種したのかなど中学何年生だったのかもおぼえていないので記名式にして病院名を記入してそちらで調べてほしい。サーバリックスかガーダシルかもわからないので、あいまいな回答になってしまう。
975	1回目接種後に副反応が大きな問題になりましたが、母親が子宮頸がん高度異形成で手術をしているので、子供もリスクが高いと考えて接種しました。
976	注射が痛かったことと、しばらく腕が筋肉痛ではないが数日ほど上にあげられなかった事。
977	欧米ですすでに問題になっていたにもかかわらず、安く買付したからと、流布した姿勢がわかりません。娘の同級生は後遺症でしばらく登校できなかつたそうです。母親より。
978	子宮頸がん予防接種を受けた事によって、子供ができない身体になっていないか不安です。大丈夫なのでしょうか？副作用があると知ったのは受けてからの事でしたので…。不安と怒り、疑う心しかありません。きちんとした説明解答して下さい。有耶無耶はなしでお願い致します。
979	痛みの強い注射だった様ですが、体調の良い時を選んで打ったこともあり、何も問題はなく終わりました。
980	1回目接種後、腕(接種した方)が痛み、腕が上がらなかった(2~3日間位)
981	接種当日には、気分が悪くなり食事が取れませんでした。
982	第2回目に出た副作用の関係で3回目は受けられなかったのですが、大人になってから接種しても効果は同じですか？また、副作用は出てしまいますか？
983	子宮頸がんのワクチンをうった時に広い範囲で腫れてしまい大変でした。
984	このアンケートをいただくまで、子宮頸がんワクチンの副反応とは思っていませんでしたが(最初に行ったどの病院でも否定された。2年位たっている為)アンケート用紙を答えるうちに副反応と確信しました。今まで健康で、勉強に運動に、友人と楽しく過していた学生生活が一変してしまい、全てが奪われてしまいました。どの病院へ行ったらよいかもわからず、全国をまわりました。名古屋市だけではなく、全国レベルでこのアンケートを行い、実態を詳しく調べ、被害にあった子供達には、それなりの保障をすべきです。この1年間の医療費、交通費はたいへんなものです。高卒資格もなくなってしまったのですよ。私たち家族の心労もたいへんなものでした。私は仕事もやめました。
985	痛い予防接種を受けましたが、この子たちの受けた後にいろいろ問題がでて受けてよかったのか？と思います。
986	サーバリックスの接種をした時、熱がでて頭が痛くなりとても心配しました。その時は、うつことが大切と思ひ3回がんばってうつのみと親子で考えて、うちました。今考えるととても強い予防接種だと思います。他の予防接種にはない体のしんどさがありました。
987	現在高校3年生ですが、まだ生理がない。
988	症状が現れた際、保健所に問い合わせたが関連を否定され、相手にされなかった(母)
989	子宮頸がんワクチンの目的を十分に理解して受ける必要があると思います。少なくとも納得してうけたワクチンならば精神的なダメージはうけないはずです。
990	子宮頸がんワクチンを接種して翌日から1週間ほど、腕が上げられないほどに痛くなりました。
991	子宮頸がんのワクチンを打ったあと、よくわからない病気にかかりやすくなった。
992	子宮頸がんワクチン接種において、もっと充分な検証が必要だったと思う。
993	しっかりと、副作用についてわからないうちに接種させ、この様になることはゆるされたい！一生にかかわることだから。
994	副反応が出てしまっている方への支援をお願い致します。
995	平成8年2月生まれで高校1年生のときに頸がんワクチンを接種した。
996	接種は最後までうちましたが、注射のあとの痛みはだいぶつらかつた様です。
997	ワクチン接種翌日の体育教師(女性)の対応に親子共々腹ただしい思いをした。医師より、体育の授業(バレーボール)の見学をすすめられ、本人も、うでの痛みのため、教師にその事を伝え(親からも連絡したにもかかわらず)たところ、「そんな例は今まで1度も聞いた事がない！」と強い口調で言われたと…。体育の成績もその学期はガクンと落ちた。何年もち、いろいろワクチンについて言われている現在なら、あの先生は、もっと理解してくれる声をかけてくれるかどうか…？何もうたがう事なく無料という事であわててうけさせた親としても反省があるが、学校の教師には、もっと勉強、思いやりがほしい。

998	1回目にサーバリックスを注射してから次までにとっても年数が開くので、免疫効果がどうなるのか心配。新たにガーダシルで接種したいが可能か、情報提供をしっかりとしてほしい。明らかに予防接種が原因で健康被害が出ていると思う。子どもの気分的なものではなく、神経免疫系に異常をきたす副反応があると思うのでしっかり医学的に原因究明してほしい。
999	報道のようなリスクがあるワクチンと早く分っていれば、接種させませんでした。今後症状が出てきたら(詳しい症状は不理解)どうすれば良いか？
1000	接種はかなり痛い聞いていたのですが、“え！？”というくらいなんともなく驚きました。
1001	副作用が心配で1回しか受けなかったのですが、効果はないのでしょうか？今後も積極的にすすめられないようなら、期限がきてワクチン無料は終了となってしまおうのでしょうか？
1002	子宮頸がんワクチンの接種は当時無料接種がはじまったばかりで、何の疑いもなく、受けてしまいました。幸いなことに、少しの副反応だけで済み安心しておりますが、その後の様々な報道を目にし、もし自分の娘に重い副反応が出たらと思うと、こわくなりました。下の妹にも接種券がおくられてきましたが、不安で接種を受けずにいます。1日も早く調査がすすみ、何らかの方針が出ることを期待しております。
1003	何の異常もないです。
1004	2回接種しましたが、効き目はありますか？大人になりその続きをやれますか？
1005	いつ頃から又、始まるのですか？2回しか受けていませんが、いつかはやはり3回接種した方が良いのですか？上の子2人は3回終って何にもありませんでした。あと1回が気になります。
1006	接種した側のうでが筋肉痛の様な痛みが出た。2～3日続いた。
1007	子供は全く元気です。学校で勉強を一生懸命していました。学校嫌いなお子さんが「異常が有る」と言うと思ってます。(母)
1008	子宮頸がんワクチンを接種した所が赤く腫れて、痛痒かったです。
1009	我が家では、公費接種が受けられなかった7才上の姉にも実費でガーダシルワクチンを接種させました。がんが予防できるならと思い、安全性を疑う事もなく2人の娘に受けさせた後、重い副作用があると報道され、娘2人には幸いにも何も副作用らしき症状は出ませんでした。とても人事とは思えません。必ず原因を突きとめ、ワクチンとの因果関係があるのでしたら、明らかにして下さい。よろしくお願い申し上げます。(母より)
1010	接種は推奨されていたこともあり3回受けましたが、子どもは注射がとても痛いと言っていました。その後、副作用が大きな問題になり、とても恐く、心配しました。子宮頸がんそのものも、もちろん怖いものですが、予防接種でその後の生活に大きな影響が出るのは本末転倒です。親として、そんな危険なものを子どもに受けさせてしまったと悔やむことになっては元も子もありません。しっかりした調査をお願いしたいです。
1011	本人が記入後に、保護者が確認したため一部を青のボールペンで訂正しました。サーバリックスを3回接種しました。接種後しばらく、注射した部分が痛いと言っていました。
1012	子宮頸がんワクチンの接種に関して、無料対象期間が短く受験期などタイミングも難しく、接種を予定したら事故多発のため接種をすすめない時期になり、いろいろ相談しても適切な助言をしてもらえるところがなく、結果的に補助(金銭的)期間が終了してしまっ。条件付けでも良いので高校2年生以降も希望者は接種の補助が受けられるようにしてほしい。
1013	質問内容が理解しにくい。小学六年生以降に②の日本脳炎を1回しか受けてない人も“あり”になるのかが不明瞭。
1014	注射後の痛み、はれは全くなかった。友人には症状を感じた人が多くいたが。
1015	幸い影響はありませんでしたが、普通の生活ができなくなった方々のニュースを聞いてほんとうにほんとうに恐い思いをしました。受けたことを心から後悔しています。元々100%効果のあるものではありません。そもそも男性に原因がある病気の予防になぜ女性に負担を強いるのでしょうか。男性全員に錠剤でも飲ませることを義務化し、結婚前に証明書を提示させれば一般の女性には危険はないと思います。
1016	接種後、腕の痛みが強く、腕が上がらず、体育の授業に参加できない程だった。とても辛そうな状態が一週間位続いたので心配した。
1017	もっと副作用がないかどうか、検証してから、すすめてほしいと思った。(子宮頸がんワクチンに関して)
1018	年に何回か手足に力が入らなく起きられなくなるが、半日から1日で治る。医者へ行っても原因がわからず、子宮頸がんワクチンの副作用を疑うが、ここ半年ほど症状が出ないため、その専門医へかかっていない。名古屋ではどこの病院に専門に相談にのってくれる科があるのか、一覧表などわかりやすく知らせてほしい(何科にかかったらよいか、症状のない時にかかってもよいのか、わかない)。
1019	インフルエンザとは違い、初めてのワクチンだったので、不安はありました。その時は、接種勧奨がすごかったので、将来の為と思い接種しました。うちは今のところ何もないのでよかったです…。
1020	3回毎回子宮けいがんの予防注射うけていましたが、軽い副反応はみんな出ていると思います。私は、普段うつ注射でも出してしまう方だったので、病院の先生からも注意するように言われました。あのときの痛みが無駄にならないことを祈っています。

1021	子宮頸がんワクチンに強い副作用が出ることがあると、知っていたら受けさせませんでした。
1022	サーバリックス注射後、1w、注射部位の疼痛、腫れ、発赤、肩が上がらない症状がありました。
1023	副作用がないかもっとしっかり検証してから奨励してほしい
1024	2回接種したが、2回とも今まで経験したことがないほど腕の打った場所が腫れ、痛みがとてとても強かった。腕が上に上げられなかった。服がすれるだけで激痛がはしっていた。もちろん、ふれたりたたいたりしてもとてとてもいたかった。1ヶ月くらいつづいた。
1025	初回で緊張はあったと思いますが、接種後1~2分で急に倒れ、近くに私がいたので支えることができましたが、失神するなどの情報ない時期でしたのでおどろきました。(その接種後1週間?後くらいにニュースになりました)。本人は耳なりがして意識を失ったと言っております。病院の方は打たないほうがいいよ…の雰囲気でしたのでそれ以降打ちませんでした。
1026	娘の将来の健康を思って接種をしましたが、後に副反応を起こされた方々がいることを知りとても怖くなりました。幸い何も起こりませんでした。それは結果論で誰にでも起こりえたことだと思いと親としての判断の責任の重さを感じざるを得ません。接種は任意でしたが、母親の中にはまだ新しいワクチンは不安、とても信用できないとして接種していない方もいらっしゃいました。親は皆子どものためを思って判断するのですから、どうか安全な物をと願っています。
1027	受けた後、数日間とても痛がっていました。その後は特に症状ありません。
1028	接種を1回だけ受けたあと、副作用が心配で中止しました。1回だけでも効果はありますか？
1029	子宮けいがんワクチンは今までで一番いたかったらしいです。でも熱もなく少しはれはありましたが大丈夫でした。
1030	後遺症が出るようなワクチンはないです。
1031	ひどい副作用があると聞いていたら接種しなかったと思います。何もありませんでしたがとても痛かったと言っております。
1032	受けた予防接種のなかでは、子宮頸がんワクチンがいちばん痛かったです。数日痛みが残り腕が動かし辛かったです。
1033	頭痛で困っています。副作用なのでしょう。
1034	接種後、順調にあった月経がとまってしまい、しばらくして受診してみるとⅡ度無月経と診断された。今後の人生に影響が及ぶと考えられるのでとても困っています。
1035	今まで色々な予防接種を打ちましたが、腕の痛みが完全に消えたなど思ったのは、だいたい1ヶ月位たってからだど記憶しています。接種した後でいろいろニュースで騒がれるようになり、いつ副作用が出るかと心配ですが、もう2年以上経ったので、安心して良いのでしょうか？
1036	第1回目の子宮頸がんのワクチンを受けた直後に気絶した。
1037	途中接種(1回または2回)でやめてしまった後の体への影響を知りたい。
1038	何年か先に副作用が出るのかどうかを知りたい。
1039	次女は報道等で副反応の話題を見て接種を見合わせています。安全が証明されれば接種させたいとは思っています。
1040	中学生の時に、無料で接種させて頂きました。(ありがとうございます。)サーバリックス接種時母子手帳を忘れたので、接種日時を記載できずに、申し訳ありません。
1041	ワクチンの副作用があったと後日聞き、とてもこわかった。そのようなことがあるかもしれないとわかっていれはうけなかった。
1042	月経不順になったり学校へ2-3日行けなくなった事期は、ちょうど受験やクラスでの友人の悩みなどあり、精神不安定な時でしたので、あまり予防接種とかんげい無い気がします。学校の悩みがなくなったら、すぐに生理も来るようになりました。
1043	接種後、腕が痛いと言っていた。周りの子も同じような感じだったので、そのようなワクチンだと思ってしまう。
1044	子宮頸がんワクチンの影響かどうか分かりませんが、左手と左足に時々しびれが表れるので、不安を抱えています。
1045	母子手帳の接種の記録の欄も小さいし、先生方の記入の仕方はマチマチだし、母子手帳の接種の記録欄をもっとわかりやすく、正確に記入できるよう改善して下さい。先生方にも統一して記入してもらおうよう指導して下さい！
1046	子宮頸がんワクチンを接種して、筋肉痛の時みたいに腕が上がりにくくなり、少し腫れるくらいの軽い副作用でよかった。歩けなくなったり、普通の生活が送れなくなったりということを知り、少し怖かった。
1047	知的障害のある子なので症状が本人も私もよくつかめていません。
1048	子宮頸がんワクチンを接種したらひどく腫れ、痛みが何日も続いた。部活動でトロンボーンを吹いていたので、思うように演奏ができず周りのみんなに迷惑をかけた。自分もすごく大変だった。安全をしっかりと確かめてからにしてほしかった。
1049	子宮頸がんワクチン接種は、他の予防接種よりかなり痛かったと言っていました。テニス部でしたが特に接種後2日はラケットが振れなくて休んでいました。その後は変化なしです。

1050	生理が来ないことを本当に心配に思っています。公表される結果に、今後どのようにしたらよいのかを明記いただきたいです。病院では、ワクチンのせいではなく成長過程と言われましたが、初潮からずいぶんたってますので心配です。
1051	注射が平気だったのに、打った時に痛いといっていました。その後は痛くて、重くて、腕があがりにくいといっていました。
1052	3回目打つ時にTVで報道していて、副作用で動けなくなる人を見て3回目はやめました。
1053	他の注射にくらべ、かなり痛かった。打ったところも、かゆく、はれた。はれたところは、2〜3週間はなおらなかった。他の注射は、1週間もすれば、はれたところはなおります。
1054	子宮頸がんワクチンを接種した時、接種した時、大きくはれました。
1055	子宮頸がんを受けて3回目終了後1〜2週間頃から全身あちこちに毎日じんましんが出て、検査をしても原因不明でぬり薬と飲み薬を服用しています。初めの頃は背中全体じんましんでまっ赤になり痛みもありました。顔以外に出ます。
1056	友人の妹が、子宮頸がんワクチン後に、足が不自由になったと聞きました。この事を聞くまで、安全なものだと思っていたので、知ってからとても不安になりました。知ったのは、自分がすでに子宮頸がんワクチン接種後だったので、自分には大きな症状が表れなかった事はよかったと思いつつも、今も苦しんでいる人がいることを思うと子宮頸がんワクチンももっと見直しが必要だと思っていました。
1057	第1回目、うでがいたくて、いたみにたおれそうだった。3日学校を休む(体がだるくて力が入らないため)。病院にTelすると副反応でいたみがひどい人もあるがすぐおさまるとのことだった。第2回目うけて、家に帰る(10分後)までに気分がわるくなりたおれて、1週間学校を休んだ。2回目はもっとひどかったのでTelしましたが、軽い副反応とのことで大丈夫といわれた。1週間で回復したが心配でした。
1058	注射が痛かった。周りの友達もすごく痛かったと言っていた。
1059	質問のきき方がわかりづらい。質問の意図がわからない。
1060	今の頃、体の異状はないです。
1061	報道等見聞きし親として心配しております。今現状、生理不順で悩んでおりますが、このワクチンの副作用ではないかと心配です。
1062	本人が1回目の注射の後、他の予防接種より痛かったと言っていました。特に注射した腕の箇所が痛いと言っていました。2回目の接種は痛いので嫌がっていましたが、接種した時期にはまだ副作用の話はほとんどなく、将来のことを考えて接種させました。ただ現時点で接種年齢に達したのであれば受けさせないでしょう。
1063	おそくなってすみません。
1064	何も異常ありませんでした
1065	すごく痛かった様です。
1066	当時、2回接種だったと記憶しているのですが、3回病院に行ったかもしれません。
1067	しばらく接種した腕が痛かった。
1068	生理がほんとうにふじゅんでこないことが多いのですがこれも副反応になるのですか？
1069	子宮頸がんワクチン何回接種したか覚えていない。
1070	副作用の問題は知っていましたが上の2人の女の子が受けて、3人目の末っ子が受けないのもいかなものかと思ひ、悩んだ末に受けました。上の2人に何も起きなかったから、これも3人目が受ける要因になったと思います。ただし、2人とも末っ子ではワクチンの接種が違った事に、今、気がつきました。
1071	接種後3日間程度は腕が重だるく、痛かった。
1072	とても痛かった。
1073	接種年は西暦でお願いします
1074	すごく痛かった覚えがあります。
1075	3回接種しましたが3回とも体調を悪くして、学校を2〜3日休みました、
1076	接種後しばらく、気持ちが悪く、吐き気がしました。接種したところのはれがひどく、なかなかひかなかった。
1077	子宮頸がんワクチンを1回または2回で止めた場合、効果はどうなるのかが知りたいです。
1078	子宮頸がんワクチン接種後に失神。
1079	子宮頸がんワクチンの注射は、かなり痛いです。痛みが1週間ほど続いた記憶があります。
1080	子宮頸がんワクチン接種後、毎回打ったところが腫れて、腕があがらなくなったり、寝返りがうてないほど痛くなった。(数日で治った)
1081	質問4日本脳炎について(上手く書けなかったのでこちらにまとめました)第1期初回1回目平成15年4月19日、2回目平成15年5月10日これらは小学校6年生より前です。第1期追加平成23年10月14日、第2期平成24年10月30日うちはたまたま何も出なくてすみましたが、苦しんでいる女の子たちや親御さんのことを思うと胸が痛くなります。どうか一日でも早く、彼女たちに救いの手がさしのべられるよう、全力をつくしていただきますよう、強くお願いいたします。(母より)

1082	副反応が出た際の医療費を負担するとの報道をみましたが、そんな事よりも強い副反応が出ない薬を早く作るべき！反応が出て対処されてても、接種しようとは思いません。安全なら、反応が一過性であるなら今まで受けてきたワクチン同様に接種します。今この現状で自分の娘に接種させるかどうか考えたら分かる事と思います。負担なんて言葉にはだまされません！
1083	双子で2人共同時期に接種をしましたが、2人共に特に接種前後で変化はありませんでした。接種後に副反応がある方の話しも聞き心配はしていました。
1084	安全性を確かめてから薬を使ってほしい。少しでも影響の出る薬は使わないでほしい。1つ上の姉はまだ接種することが普及していなくて打たずに済んだ。新しい事をはじめの前は慎重にお願いしたい。
1085	予防接種を副作用によって廃止するというのは、もう受けてしまった者からしたらとても怖いしおかしいと思います。
1086	子宮頸がんワクチンの2回目か3回目の接種後、待合室で休んでいる間、急に身体が震え出し気分が悪くなった。しばらく休んでいたらおさまった。
1087	皮下注射なので腫れがひどく、痛みがなかなか治らなかった。TV報道などで副反応がひどいというのを見て、2回目はいかがなものかと、思いました。他人言ではない！！今のところ当時の痛みと腫れのみだったので安心していきます。母
1088	子宮頸がん、接種後、40度の高熱が1日だけ出ました。日本脳炎、第2期用の紙があります。中学の時にもらいましたが 1度打たないようにと言われたので止めていましたがその後よくなり、まだ打っていません。
1089	3回目の時間問題が出て親としては、心配です。
1090	国はその責任を重く重く受け止めるべきです。今、症状がないからといって、この先もないとは限りません。ワクチンを接種したからといって子宮頸がんにならない保証もありません。
1091	特に子宮けいがんがんで体調が悪いかどうかわからないですが、今となっては打たなければ良かったと後悔しています。
1092	娘の友達が子宮頸がんの予防接種を受けての副作用で現在も専門の施設にいます。記憶力の低下、下半身不随で車イスの生活です。突然のことで娘共々ショックを受けました。子宮頸がんは、心配ですが、もう少し予防接種のついての情報が欲しいと思います。現在、3回目をどうしたらいいのか
1093	接種をした後は、1～2週間程腕を肩より上にあげることはできなかつた。寝返りをうつことも出来ず、まともに寝られなかつた。
1094	痛くて、うでが上がらなかつた。
1095	頭痛は頭痛薬のめば治りました。めむたいのは、ねぶそく？ねるのがすきだからです。
1096	子宮頸がんワクチンを接種する際の痛みがひどい。また、接種後の腫れも他のワクチンより大変でした。もっと改良してほしいです。
1097	子宮頸がんの3回目を打つべきか、いつまでに接種すべきか？
1098	先生に説明を受けて、安心して接種できました。なぜ痛みが生じるのかを説明された上で、痛みの少ない接種場所を探してくださったため、ほとんど痛みを感じませんでした。(未熟な接種技術による痛みと神経系損傷による後遺症発生と説明)
1099	新聞、ニュース等でこの注射の副作用で通常の生活ができなくなった人たちを知りました。海外でこの接種の危険性を唱える事案があり中止していたにもかかわらず日本ではふつうに、注意喚起もなく接種されていたことに憤りを感じます。よく安全性を検証した後で副作用のないワクチンをお願いしたいです。
1100	予防接種を受ける時、強い副作用があることも調べたので受けるかぎりぎりまで迷って受けさせました。当時はテレビでもCMを流しており、無料で受けられると聞けば、それほど知識が無いので受けさせましたが影響がなく本当に良かったと思っていました。健康に関する事なので、副作用の大きさをもっと説明してほしいです。
1101	子宮頸がんワクチン接種後(3回とも)腕が赤く腫れ、腕が動かず上がらずで受診し、様子を見るように言われ1週間程かかり、痛み治ると同時に動かすことができるようになりましたが、他児より副作用、後遺症強く出て不安でした。
1102	接種後、数日間は腕のだるさと身体のだるさがあった。
1103	接種後、接種した方の腕が痛くて動かすと痛い時がありました。
1104	子宮頸がんワクチンを接種して、1週間後ぐらいに3回とも頭痛と微熱、だるさがありました。(接種後は安静にし、体育・部活動も1日休みました)
1105	副作用等原因がはやくわかり現在苦しんでいる方が辛い生活から解放される事を願っています。
1106	当時、娘は接種後すぐ痛がりました。(体がだるい訴え有)特に変化がなく安心しましたが、後に後遺症のニュースを知り、とても不安になりました。
1107	子宮頸がんワクチンの注射は、他のワクチン接種のものよりうでの腫れが一番ひどかったような気がしました。

1108	早く打った方がいいという話だったので、すぐに接種をしたのに、副作用が起きてしまって正直納得がいかない。早く原因を明らかにして、このようなことが二度と起こらないように対策をしっかりとしてほしい。とりあえず早く説明してほしい。
1109	腕が2倍くらいに膨れ(はれ)上がり、肩全体に痛みがあり腕を上げられない状態になった。物凄くひどい筋肉痛、みたいな感じ。
1110	日本脳炎は3才で第1期第1回、2回、5歳で第1期追加分、中1で第2期を受けてます。上記の1回め2回め3回めとはどのことをいうのですか。母子手帳を見てもよくわからない。小6以降で3回うけることはあるのか。
1111	高校に入学した頃から、生理痛がひどくなり、市販の痛みどめが必要になりました。量も最初の3日間がひどくて、夜間ナップキンではおいつかないくらいです。
1112	不定愁訴の一言で片付けられそうで、病院受診ができません。(新聞やテレビ報道されている程の強い症状ではないため)学校からは、進路変更の話も出ており、予防接種を受けなければ、よかったと大変、後悔しております。接種後なんとなく何かがおかしいと親は感じていますが、ワクチンによるのか、はっきりしないため、一日も早く原因究明していただきたいと思います。
1113	注射が痛い。体の具合が悪い子をよくTVでみます。ちゃんとこの薬は大丈夫なのか確かめてから実施してください。私はたまたま症状がでませんでした。他の方々は、その後の人生を変えられています。その事に責任をもって考えてください。
1114	子宮頸がんワクチン接種後は、上腕がいつもの予防接種より痛いと言っていました。
1115	子宮頸がんワクチン接種後は、他のこれまでに受けた予防接種の中で突出して腕が痛くなったと3人の娘達が話していたことが印象的です。
1116	子宮頸がんワクチンを3回とも打って、全部打った後1週間ほど打ったところに7センチくらいのしこりができて痛かった。でもその後、なくなっていつも通りになった。
1117	質問2の半分は当てはまっています。しかし、ワクチンとの関係はないと「なし」を選びましたが、こういう症状があるのかと思うと不安になります。
1118	担当して下さった産婦人科医の方は、接種後は日常生活より激しい運動は止めるように指示がありました。その頃水泳(競泳)をしていたので、必ず休むようにと指示がありました。結果良かったのでしょうか。接種直後は腕が上げられない程の痛みがありました。
1119	接種後、腕が筋肉痛のようにひどく痛がっていた。(1週間以上。3回とも)クラスや周りの接種した人も皆痛がっていたということです。私の妹は自分の娘に接種させていません。信頼できなかったからだど当時話していました。(正解だったかもしれません。)
1120	子宮頸がんワクチンは、まったく副反応はありませんでした。
1121	家の娘は注射は痛かったと言っていました。別に変化はなかったです。
1122	1回目に入ったときは少し赤くなった程度でしたが、2回目の際は接種したその日～翌日まで37.5℃～38℃ほどの高熱が出て少しつらし思いをしました。3回目も予定通りにうけたのですが、その時はこれといって目立った症状は出ていなかったと記憶しております。参考になれば幸いです。
1123	3回接種しましたが、どれも痛み、腫れて、寝返ができなかったため、病院へかかり冷やしました。4～5日で腫れがひいたので良かったです。
1124	当初、在庫不足ですぐには接種できず、入荷待ちをして接種した程でした。外国では普通に接種していると聞き疑うこともなく接種してしまいました。打った時はかなり痛み、しばらく腫れてしこりがありましたが、今は何も副作用はなく本当に良かったと思います。ひどい副作用で後遺症が残った方が気の毒でなりません。どうか迅速な原因究明、被害にあわれた方の保障、ケアなどの対応を心から願っています。
1125	因果関係を早くしらべてほしい。
1126	勉強のやる気がでなくなった。ネガティブ思考
1127	いたって健康な娘でどのワクチンの接種も副作用がみられなかったため(多分何ら心配ないと考えて)子宮頸がんワクチンもいわゆるまま接種しました。一度目で何らかの症状がみられたら、二度目以降止めようと思いましたが何ともなかったため、全て受けました。もし、薬に対して何らか思うところがあつたら接種はしなかったかもしれない・・・と思っています。乱筆で申し訳ありません。
1128	副作用の報道に恐怖を感じ止めました。止めて良かったです。辛い状況にある人達が多くいることを知り、その人達への補償をしっかりといただきたいと思います。今後同じ様な問題が起きないように慎重な政策を求めます。
1129	子宮頸がんワクチンが痛すぎてぶっ倒れそうになった。
1130	本人が海外へ留学中の為、母親が記入。全く健康に異常なし。
1131	安全が確認されていないワクチンをお子たちに打つのはやめて下さい。医療業界のお金もうけの疑いもあると聞きます。国民を犠牲にせず副作用に苦しんでいる方に手厚く対応を望みます。
1132	名古屋市は、子宮頸がんワクチンの推奨をしていた様に憶えているが、行政として、責任の所在及び、医療費の補助、助成金など今後どのような形をとるのか知りたい。
1133	思春期側弯症、変形性頸椎症、根本の原因は椎間板の水分量が少ないといわれました。関連はないかもしれませんが症状が出はじめたのは、ワクチン接種後です。

1134	子宮頸がんワクチンを接種後から急激に視力低下になり、部活、学校黒板の字が見えなくなる。眼鏡又はコンタクトの着用が必要となる。両親、姉妹、祖父母と眼鏡必要としない。視力低下遺伝性はないと医師からいわれた。原因は不明。このワクチンを接種した後なのでなにか副作用かと思っている。
1135	姉2名は中2までに受けましたが妹は今中1ですが接種するか悩んでいます。明確な政府の見解を早く出して欲しいです。
1136	頸がんのワクチンを接種した後、10日間くらい今まで感じたことのない体の異常を感じました。カゼとはちがうダルさで通常の生活が送れませんでした。そのため2回目の接種は医師と相談し、やめました。原因は何だったんですか。
1137	保護者より。ガンを抑え、無料という事で痛いから嫌だと言う娘の3回目をすすめました。2回目接種後腕が腫れあがり、日常生活に困難な日々がありました。幸い悪化する事なく数日で収まりましたが、3回目をうつ時、不安を感じました。今のところ目立った異常はない様ですがニュース等で安易にすすめた事を考えてしまう事があります。
1138	気がつけば医者の子は接種率が非常に低い注射であり、不信感が募りました。ワクチンの有効期間が長くないとか、有効な型でないという意味がないという理由からのようでした。国が勧める接種を何も疑わない事がいけないという結果になり残念です。
1139	次女が3回目を接種後、報道で大きく“副反応か”について取り上げられたため自費で(1ヶ月遅れで)接種させていた長女は、3回目はやめました。
1140	副作用の症例がなく接種するのにとても悩みましたが周りの同級生の人達が接種した人達が多く 医師も接種した方がいいようなニュアンスでしたので接種しましたがニュースで日常生活が困難な方たちがいる事も知り接種した事を後悔しました。将来子供が授かりにくい事にならないか心配です。
1141	注射を射った時貧血でになった。
1142	子宮頸がんワクチンを受けた後から、直接的な因果関係はわかりませんが睡眠障害などいろいろな症状が出始め、中学校2年生頃から不登校気味になり、今現在高校2年生を休学中です。生活環境や友人関係でいろいろな問題をかかえてきた事もあるので、このワクチンが原因だと言い切れませんが、とても気になっています。この調査をしていただき くいしい事を知りたいのでよろしくお願い致します。
1143	3回目の接種当日の夜40度近い高熱。翌朝には熱は下がった。
1144	新聞などで副作用の記事を読むにつけ今回何もなかった事に安堵しております。しかし現在中学2年生の娘に受けさせるべきかどうか考えさせられます。
1145	国が出すものは信用しているので、万全にしてほしい。今回こうして調査するのは評価できると思う。情報を早く出してほしい。よろしくお願いします。報道を見てゾツとした。全容がはっきりしないが、副作用はなかったけど、受けない方がよかったんじゃないかと思っている。今後、何か副作用が出るかもと思うと心配はある。
1146	注射している時から痛みがあり、受けた後は手が上がらない程でした。(シャンプーをするのも困難な程、手が上にあげられなかったです。)赤くはれた状態が数日続き心配しましたが3回接種しました。今のような副反応の報道が当時されていたら途中で接種を中止していたかもしれません。とても不安な気持ちでいっぱいでした。
1147	1回目の接種を受けたままになってしまい、今後どうすればよいのかわからない。
1148	打たれた部分、すごくいたい。と言っていました。そのいたみは3日ぐらい続きました。腕があがらないと言っていました。2日間ぐらい腕があげられず、服を脱いだり着たりするのが大変でした。
1149	「副作用の無い薬は無い」の考えで、もっと慎重に接種を決めてほしい。「自分の子どもにすすめるか」「自分の親にすすめられるのか」という目線で考えてほしい。責任をうやむやにするのはやめてほしい!
1150	腕は1日目、痛んたが、そのくらいの痛みでガンのリスクが落ちるなら予防接種を受けることができ良かったと思う。ガンで命をおとすリスクには変えられないからだ。
1151	子宮頸がんワクチンを接種して、非常に後悔しています。当時は今の様に情報が無く、不安だったので調べましたが、良くない文言はみあたりませんでした。その後、副作用の出たお子さんの報道を見て血の気が引きました。最初は気になる点がありましたが、現在は元気に暮らしていますが、今後何が起きるのではないかと心配です。HPVワクチンは遺伝子組み換え技術を使っている事、ASO4という強力なアジュバントが入っている事(日本人に打たれるのは初めて)も大変不安です。今回の調査で終わるのではなく今後も追跡調査を10年、20年と続けてください。妊娠、出産、遺伝・・・娘の将来がとても心配です。
1152	何も副作用がないので、これでガンにならないのなら受けて良かったと思います。
1153	3回の接種はしましたが1回目の接種後は、接種した方の手が肩から上がらず数日間痛い日が続きました。2日目3回目と接種しましたが痛みは和らいでいきました。
1154	正確な時期やワクチンの種類はわかりません(忘れた)が、3回共接種しました。特に体の異常はありません。

1155	サーバリックス接種において日常生活に支障を来したり表に見えるような副作用は今のところありません。しかし、今後何かあっては困るし不安です。時間の経過をしないとわからないこともあるでしょう。“夢のワクチン”のようなことを言われ無料での接種に直ちに娘と病院へ向かいました。詳しい接種と報道されている副作用との関係を明らかにして欲しいです。
1156	このワクチン接種後針のさしたまわりをととても痛がりました。今まで接種したことのあるワクチンとは比べものにはならないほど痛がりました。当時気になっていたのを記入させていただきます。
1157	子宮頸がんワクチンを接種した3回とも、接種した日から3日ほど接種部位を中心に赤く腫れ、だるく、重く、体全体も脱力感を感じた。予防ワクチンを受けることは大切だと思うが、そのワクチンにより別の症状がでることも恐ろしいと感じる。
1158	今までワクチン接種で痛みを感じる事は余りなかったが、子宮頸がんワクチンを受けた日から、うでがあがらない程痛みがあり1ヶ月程続いた。ただ 同じ様にワクチンを受けた友達も、同じ状況だった事を聞いていたので、1ヶ月程すれば治ると我まんしていた。3回受けるのがつらかった。
1159	副作用を知っていたら接種しませんでした。幸いにも娘は副反応が出ていませんが、症状が出られた方はお気の毒です。自治体で推奨されるがままに受け入れることは大変恐ろしいことだと実感しています。早期に回復できる対策や援助の施策を望みます。助けてあげてください。
1160	接種直後、腕がはれて激しい痛みがあった。保護者は不安に思ったが、途中でやめるのもよくないと思い、3回ともうちました。
1161	子宮頸がんの接種では、かなり痛みが強く、娘は「いつもの予防接種と違う」と訴えていました。最初の2回をしたので、念のための3回めもうけさせましたが、ひどい副作用が起きたらと考えると今は、娘に対して申し訳ない事をしたと思っています。
1162	子宮頸がんワクチンを1回→3回受けた時、3か月半ほどで接種してしまいました。(半年後に打つようになっています)詳しく教えていただきたいです。(体にどのような影響があるか…)
1163	とても痛がっていました。その翌日からもだるくて、体が思うようにうごかないと、2～3日ぐだぐだ寝ていました。後から報道を見て、娘の言っていることがオーバーではなかったのかと思ったくらいです。
1164	第1回目接種の頃には、もう重度の副作用の方の情報が出てきていました。その中でも続けて接種してよいか、又、接種後の腫れと痛みは説明にはありましたが、やはり不安なものでした。強制に近かった為うけましたが、任意であつたらうけたくありませんでした。
1165	接種が2回終わった後、副作用問題が出て、3回目の接種をどうすべきかと悩みました。テレビ報道を見てとても怖かったです。先生と相談して、新しい注射で副反応問題が出る事は多いですが、注射をする人が増えた事や、確率が低い事、(2回受って何もないので)有効性の話も聞いて3回目を接種しました。しかし、初めから副作用リスクが高いと知っていたら受けなかったと思います。
1166	今のところ体に異状はありませんが、今後体に不調が現れるんじゃないかと不安です。予防接種を受けさせた親の責任を感じます。(母)
1167	受診後 頭痛、手のしびれを起こしました。手のけいれんも起こしました。暫く数か月続きました。現在も少し症状があります。
1168	このような恐ろしい副作用があるにもかかわらず、子宮頸がんワクチン接種が推奨された事に、強い憤りを感じます。
1169	保護者からとしての意見ですが、21才と18才の娘がいますので早めに子宮けいがんのワクチンを接種させたいとは思いますが、18才の娘は2回まで接種して、副反応のニュースを見て3回目は受けていません。病院側は大丈夫と言いますが、テレビであのような映像を見るとこわくて受けさせられません。今後の娘たちのことが心配です。
1170	接種後患部の腫れ痛みが1週間程続いて心配でした。
1171	子宮頸がんワクチンですが、1回目は、なんにも反応しませんでした。2回目に3日間位、熱が続きました。心配でした。
1172	3回目接種前に報道があつたため、保健所、かかりつけ医院にも電話をして報道後の接種状況や副反応について尋ねてみましたが、やはり、詳しい情報が得られず、最終的には保護者の判断による接種になると言われました。すでに2回接種済でしたが万が一のことを考えると心配だったので中止しました。報道で見たようなひどい症状は、何回目の接種後に出たものなのか、という情報が欲しかったです。
1173	平成9年生まれの現在大学1年生ですが、中2の時にワクチン接種しました。
1174	去年、体調がととても悪くなり、学校を早退したり遅刻しておりました。扁頭痛持ちだったので、はじめはそれが原因だと思っておりましたが、もしかしたらこの注射が原因ではないかと思っています。1回接種したあとに、ワクチンがあまり良くない話を聞き、その後は接種していません。
1175	うちは特に問題ありませんでしたが、副作用で苦しんでおられるお子さんもいるとお聞きしています。原因は何か、このワクチンだけではない様に感じられるので究明して頂ければ今後の役に立てられると思います。

1176	子宮頸Caワクチンの接種後、(他の予防接種と比べ)はれや痛みが1W程度続いた。「他の接種より痛みは続く」と聞いてはいたが、3回終了後になって副反応の重いケースのことで知り、正直なところ接種を後悔した。インフルエンザは高齢家族のこともあり、接種しているが、2期日本脳炎や水ぼうそうは接種ギリギリまで様子を見ている。具合が悪くなられたお子さんの回復を心よりお祈りします。同じ世代の子の親として心が痛みます。どうか、支援を厚くお願い致します。
1177	子宮頸がんワクチン接種による副反応というのはありませんでした。
1178	子宮頸がんワクチンを、接種してから、勉強などの集中力、気力がなくなってしまったような気がします。このアンケートが来たからそう思ったのではなく、この時を区切りに、人が変わったようで、ずっと、今も気がかりです。
1179	体のほとんどの部分にじんましんが出た。
1180	子宮頸がんワクチン接種後、しばらくはれがひかず、2週間くらい、病院にもう一度行こうかと迷うことがありました。(3回目)
1181	ワクチン接種をしても、後からこのようなアンケートなどを実施しなければいけないような事態になっては、税金のムダのように思います。ワクチンの仕入れルートなど明確な対処が必要なのではないでしょうか。人体実験に嫌気がさします。
1182	子宮頸ガンの予防接種後、注射した腕がすごく痛いと言っていました。少しずつ良くなったようですが2~3日続きました。
1183	副作用がでた。(注射をうった方のうでが1週間くらい痛くて、上がらなかった。)海外での情報を見て、いろいろ問題になっているのを知ったけど、国によって考え方がちがうのにおどろいた。
1184	身体に対する質問の返答は大変難しいと思います。
1185	ワクチンのせいかと医師にきいても、たぶんちがう、ストレスじゃないか、とか言われた。本人は高校生活も楽しく、何度も海外留学をしたりして、勉強も成果が出て、目標の大学にも合格圏内で、夢もあり、ストレスの自覚は全く無いと言っていた。受験前に鉛筆が持てないほど握力が低下し、手がふるえるようになった。いつもではないが、不定期に突然ふるえが来る。その都度急救で点滴をするが、原因不明と言われ、様々な検査のため会社を休むことになる。いつも、たぶんワクチンではないと言われる。
1186	報道の内容では、苦痛を訴える方々は、神経の痛み(異常)が多いように思われました。我が家の子どもは、熱性けいれんをおこしたことがあります。熱性けいれんをおこす子は比較的神経が敏感な子が多い、と聞いたことがあり、「もしかすると他の子が大丈夫でも、神経が過敏なタイプの子はダメかも」と、不安になり、中断しました。ガンも怖いですが、目の前の危険も、親としては避けたいのが心情です。
1187	2回しか接種してない場合、免えきはつかないままなのですか？受けた意味はなくなりましたか？
1188	報道が過剰になるとワクチンを接種するのが怖くなります。上の子(高3)は、何もなかったのですが、まだ、下の子(小4)の子がいるので、接種した方が良いのか悪いのか迷っています。
1189	子宮頸がんワクチン接種後の腫れ、痛みなど副作用は全くありませんでした。
1190	将来なにか症状が出ないか心配。
1191	国の保障の体制も不安だし、副作用＝リスクの説明の無いものを進められるのは何故なのか、これからは、自分の身は自分で守る時代なのだろうと痛感しているが、効果とリスクの説明を少しはして欲しい。
1192	母親の私は、子宮けいがんだったので、わざわざ娘に予防注射をしたのに、こんなひどいことになるなんて・・・
1193	接種後、1週間程は腕の重み、腫れ、だるさなどつづきました。
1194	副作用の出ってしまった方はお気の毒ですが、子宮頸ガン対策としては有効なワクチンです。このことによって命を落とす、もしくは子供授からない人がいなくなるよう接種は続けていってほしいです。
1195	接種がものすごく痛かったらしいのですが、無理やり3度も受けさせました。こんな事ならやめさせればよかったです。体調不良になってしまった女の子達を思うと人事ではありません。なんとかしてあげてください。
1196	子宮頸がんワクチンを接種しましたが、副作用は全然ありませんでした。
1197	貧血、生理痛がとてひどく痛み止めがかかせません。
1198	他の予防接種でまれに小さく腫れることがあったが、子宮頸がんワクチンを接種した際には、その比ではなく、腫れ痛みもあった。事前にお医者様から、その旨の説明もされていたが、それでも驚いてしまいました。(腫れや痛みは、一時的なもので 2~3日でおさまりました。)
1199	生理が多く、鉄欠乏性貧血で入院をしました。また、卵巣に水泡が出来やすくなり、たまに病院で診察をします。
1200	自分と同じ世代の女の子が重い副作用で苦しんでいる現実を知って驚きました。自分は運がよかったと思うと同時に、今後何らかの影響が出てくる可能性も否定できないのは不安です。原因の究明をよろしく願いいたします。
1201	副作用の報道を見たのが、ワクチンを全部うちおわった後だったのですが、その場合は、どういった対象方を取ってもらえるのでしょうか？

1202	18才前後に無償で接種できる様にしてほしいと思います。
1203	「筋肉注射」というものを自体を他にうけたことがないので比較はできませんが、子宮頸がんの接種を受けた際、腕が腫れ、押さえる(ぶつかると?)と痛い状態にはなりました。
1204	今まで、副作用はありませんが、今後年数がたっても何ができる可能性があるのでしょうか?
1205	いつも、痛みには強いのですが注射を打った時は、すごく、痛みを感じたようです。うでも上がらないようでした。今までの予防接種で、一番、たいへんでした。
1206	子宮頸がんワクチン接種2回目の直後気分が悪くなった。少し休んでたらすぐ良くなった。
1207	子宮頸がんの注射が予想以上に痛かったのをよく覚えています。
1208	先に記入しましたが、人格的なものが変わってしまった様に思えます。後に子宮頸がんワクチン副作用についてTVなどで知り、時期が合うので不安になりました。昨年、知能検査を行い軽度の知的障害がある事が分かりました。この検査では、先天的なものか後天的なものか判別できないそうです。明確にならないまま、悶々としております。早急に調査をして頂きたいと思っております。
1209	テレビなどで副作用の放送があり、何事もなく3回打ち終えて良かったと安心しています。
1210	名古屋市独自で調査するという英断、賛同します。実態を把握してください。当時、副反応が気になり、ワクチンを接種するか否か悩みました。学校から接種をすすめる冊子をもってきたり、数万円もするワクチンが無料になったのだから、と周りでは接種することに前向きでした。結局娘に決めさせ、接種しましたが、その後良くないニュースが報道されるたび今後のことも心配でなりません。保護者より
1211	副作用で日常生活が困難な方をテレビで見ました。当時知っていたら、接種しませんでした。
1212	注射はすごく痛み、接種後も痛みは強かったです。副反応で苦しんでいる人たちに、誠実な対応をしてほしいです。厚生労働省は、効果がないとわかっている予防接種(特にインフルエンザ)を推奨しています。そういった姿勢をなおしてほしいです。経済優先ではなく、個人の幸せを優先してほしい。
1213	子宮頸がん予防接種によって身体の不自由を感じている方もいるそうで、今後、ワクチンに対して慎重になってほしい。また、接種に対して周囲は「接種しないと子宮頸がんになる」というような、過剰な認識があったように思う。接種勧奨の方法も考えてほしい。
1214	3回目の接種時、翌日40℃ぐらいの熱が出ました。
1215	子宮けいがんのワクチンの大切さを聞き、うけさせましたが、1回目か2回目の後、アメリカですごい副作用のため、このワクチンの接種が問題視されていると聞き心配でしたが3回目まで受けました。娘の学校の友人のひとは、学校に通えなくなくなるほど副作用に悩まされ、車いすになりました。下の娘は受けさせることをやめました。
1216	接種1回目の後かなり長い間痛みがありつらい様子でした。2回目は本人が痛いから嫌と言いましたがテレビなどの報道前でこんな事になっているとは知らず受けました。名古屋市で無料となった初日に1回目を受けたのでこんなにリスクがあるとは思っていませんでした。
1217	手元に母子健康手帳がなく接種時期は、はっきりわかりません。子宮頸がんMRワクチンに関しては、ぎりぎり接種できる年齢でしたので無料接種が受けられるようになってすぐに接種しました。
1218	2回目を接種してから少しして目の前がぼやけて、頭も痛くなってクラクラしました。なので2回目までしかうけていないんですけど、3回目は接種した方がいいですか?
1219	ワクチン接種により、日常生活が困難になった方が気の毒です。無責任すぎだと思います。2回受けて止めた意味もよくわかりません。(中途半端な状態なので)
1220	早く、このワクチンの問題を解決してほしいです。
1221	日本脳炎の接種をしそびれてしまいました。ワクチンの安全性を考えると接種するのもしないのも心配です。
1222	サーバリックスを打ったのですが、3回目の時にガーダシルを打たれそうになった。間違えて打たれていたらどうなっていたかと思うと怖いです。
1223	接種しておきたいけど不安で出来ない。一度受けて何ともないなら2回目・3回目を受けて良いでしょうか?
1224	アメリカ在住時に接種いたしました。
1225	当時、子宮頸がんワクチンの接種が始まるということで、医師から日本は遅れている。接種は海外では当たり前だと積極的に勧められました。その時は、安心して受けれるものだと何の心配もしていませんでした。しかし、因果関係は不明なものの副反応を訴える未来のある子どもたちがおおぜい発生してしまったことで、将来の夢がうばわれていることは大変心が痛みます。早い解決を望んでおります。
1226	注射は痛かったけどワクチンを打っておいてよかったと思います。
1227	接種した当時、1回目は何ともなく、普通の注射と同じだったけれど、2回目接種時に、痛かったと言っていた。そして、筋肉痛の症状があり、部活を1日休んだように思います。
1228	接種後のワクチンによる副作用の報道には困惑しました。もう少ししっかりしてもらいたいと思います。モルモットにされた気分です。

1229	いつも予防接種をしても痛がない本人が、今回の予防接種は痛いといっていた。予防を受けた後色々な報道が続々と出てきて不安を感じた。大変な思いをしている娘と同じくらいと年の子の事を考えると人後他ではないと思っている。子宮ケイがんだけでなく他の予防接種も不安になる。大変な思いをしている子ども達のこの先はだれが責任を。
1230	注射した時”ずん”と重く(体が)なった。2~3日したら子宮が痛くなり(生理とは異なる痛み)、我慢出来るくらいで、数日で痛みがなくなる。
1231	よろしくお願いします。
1232	子宮頸がんの予防接種のみ控えがなく、時期等よくわからなくて申し訳ありません。無料接種の案内をいただいた頃に接種しました。月経量の異常は、その後すぐです。固まりがドボドボと出ると数カ月行っておりましたが、治まりました。
1233	●の姉の●はワクチンを3回(サーバリックス)を受けましたが、そのお友達の(同級生)●ちゃんは何れも副反応で高校中退し、体調不良で普通に生活できなくなりました。●ちゃんママからいろいろ話を聞いて、●は1回で接種をやめました。●のもう1人の同級生の●さんも普通に歩けなくなりました。危険なワクチンでこれ以上不幸な子が増えないように使用中止にして下さい。母より
1234	痛みが強かった(打ったとき)そのあと、うでの上半分がはれて、1か月位ずっと筋肉痛みたいに痛くて動かすのがつらかった。夜寝る時は●で冷やしたりしてた。
1235	意見ではありませんが、娘の話ではかなり痛い注射だったようです。でもがんのリスクが減ることと無料だったので、受けさせました。4つ上に姉がいますので高額だが、自費で接種を検討しているところでの副作用の発覚でした。今は受けなくてよかったです。
1236	ワクチン接種して少しづつ体調が悪くなってきたかもしれない！どんどん症状が酷くなっていったため、現在産科に相談して薬を飲んでいる。
1237	筋肉注射がものすごく痛かったから勘弁してほしい。注射以外の方法を考えてほしい。錠剤や飲み薬のような形式で済ますことができるようにしてほしい。とにかく注射はいや。
1238	子宮頸がんワクチンを接種したら、腕が上がらなくなった。(2日ほど)
1239	子宮頸がんワクチンの1回目を接種した後に副作用の報道があり(を知り)、2回目以降を接種すべきかとても悩みました。医師に相談しても「最終的には親(保護者)の判断で。」と言われ悩みに悩んだ末、3回目の接種を終えました。特に異常が見られなかったのが良かったのですが、親としてはとても不安でした。予防接種については、副作用等の研究をしっかりといただき、安心して受けられるようにしていただきたいです。よろしくお願いします。
1240	子宮頸がんワクチン3回目の接種後、頭痛が当日から2~3日続いて、不安になった。週末で病院もやっていなかったの、鎮痛剤を飲ませてよいのか、迷いながら飲ませてしまった。その後、特に症状はなかったのが幸いですが、後遺症などもでていることを知り、大変不安になりました。
1241	娘は現在15才で、中2の頃2回の接種で身体が痛い、(筋肉痛)だるいなど、10日程訴えていたのを覚えています。その頃、ちょうど学校に行けず下半身が動かない副作用の娘さんがいるとNHKで見て怖くなり、医者と相談し3回目の接種をやめました。姉(3才上)の方は特に痛さは訴えませんでした。次女は平均の女子と比べ10cm身長が低く、体重もとても軽いです。なので負担がかかったのかとも思います。
1242	いろいろな人と話しをしました。2回接種した後、子宮頸がんのこう果は、20年経ってからは出ていない、今、接種している子供は、どうゆうこう果が出るかモルモットと一緒に、実験と同じと言われて3回打つのをやめました。そしてこのアンケート、やはり実験だったと思います
1243	ガーダシルを2回しかうっていないが、今どういう体のじょうたいなのか、3回目はどうなるのかおしえてほしい
1244	ワクチンを打ち気はなかったのに、何度も手紙がきたので、リスクも公表されていないので姉と一緒に打ちました。今は後悔しています。
1245	子宮頸がんの被害者の方がテレビに出ていると、娘もワクチンを打っているのとても不安になります。いつ頃、このような症状が」出るのか知りたいです。
1246	すごく痛かったので、ガンになったら最悪です。ニュースでよく後遺症になった方のやつを見るので、体調が悪くなった時、後遺症になったのかな？と不安になります。
1247	子宮頸がんを接種し副作用が重い方は本当にお気の毒の思うとともに子どもに何もなく運がよかったです。ワクチン不足で接種が遅くなったのでかえってよかったです。副作用がなるべく出ないようなワクチンができることを願うばかりです。
1248	ガーダシルを接種後、腕が腫れ痛くなり上がらなくなるという症状が出ました。

1249	子宮頸がんワクチンは、日本で初めて接種という事もあり、受ける前に、どういうワクチンかわからないので、インターネットでたまたま調べたら、他の国では、やはり副反応が出ている事が、いくつか書いてあり、自分の子供に受けさせて本当に大丈夫なのか？とても不安な気持ちで接種しました。自分の子供は、たまたま大丈夫でしたが、日本ではじめて接種する事になり安全だと信用していたのに、とても残念な気持ちになりました。友人の子供さんも1回めで副反応が出て、こわいからと次は受けませんでした。とても怖い予防接種だと思いました。途中から無料になったのも皆に試す為という噂も出て、とてもおそろしいです。子宮頸がんを予防するワクチンでもきちんと安全性を確立してから皆が安全に接種できるものにしてほしいです。
1250	注射打ったときとても痛かった。
1251	種類がわかりません。(1回目、AHPVA122BA)(2回目、AHPVA123BA)(3回目、AHPVA143AA)と記載してあります。
1252	副作用の報道が接種した時期より早ければ、接種させなかった。
1253	子宮頸がんの注射は、3回打ちました。普通の注射より痛かったです。
1254	まだ女の子がいるので、早く一定の結論が出てほしいと思っています。今後その子に受けさせるべきなのか、どうか。
1255	先に接種した同級生から肩が上げずらいなど痛くなると聞いていたので、多少腕とか肩が痛くなったようですが、気になる程ではありませんでした。
1256	子宮頸がんワクチンを3回接種しました。1回目の後痛み(接種した腕)がとても強く、服の着がえもできず、横になれず、あまりにも痛がるので医療機関にTEL、このワクチンは痛みが強いとの回答がありました。壁にもたれて、ウトウトしたくらいで翌日学校へ行きました。その当時は、みんなが痛いと思っていましたが、個人差があることや、あとあと副作用のことなどを聞き、本当に接種が良かったのか、どうか悩みました。本人は嫌がりましたが説得して、3回目まで受けました。無理矢理接種させたことを、今では悪かったと思っています。副作用の報道を見て、当時はそのことを知らなかったのも、親の意志で接種してしまい、子供は痛みで不安が強かったのではないかと考えています。
1257	子宮頸がんのワクチン接種後、心臓が気持ち悪かった。吐き気と胸やけが一緒に来たような気持ち悪さがあった。
1258	あの様な報道を見てしまうと、病気にかかる確率と副反応がおこる確率を考えたり、副反応が出た場合、治る保障もなく、一番楽しく美しい年頃に、体に不自由があるのは、かわいそうに思ってふん切りがつかないまま一回しか接種できていません。
1259	接種した部分がはれあがり、少しの間いたかった。
1260	アンケートですむ問題ではない！娘は今も苦しんでいます。このワクチンのせいかも？！と今も身内で心配しています。度々おこる偏頭痛で4～5時間は動く事ができません！！調査の結果連絡はいただけませんか？無意味です！！
1261	上の子の子宮頸がんワクチン接種時、腕が痛い、体がダルいという症状がでましたが、それほど気にはなりませんでしたが、でも、この子が接種した時、明らかに、おかしい症状でした。体が動かない、のどがおかしくて、息がしづらい…結局、次の日には、ずいぶん良くなりましたが、とても怖かったです。その数日後に、子宮頸がんの副作用報道があり、2回目は受けさせませんでした。1度受けた場合の今後の再接種開始時の、詳しい説明は、あるのでしょうか。日本脳炎も同じく副作用報道があったため、第2期を受け損ねています。
1262	子宮頸がんワクチンの接種1回目の時、腕の痛みがひどく、体調も良くなかった。次の日、学校も欠席した。接種2回目以降は、1回目ほどはつらくなかったが、やはり、体がダルい感じがした。
1263	接種直後、日常生活が送れないほどの、重み、痛みがあった。
1264	頸がんワクチンは、他の接種より痛く、赤いしこりが長く残りました。途中で中止になると、上の娘は接種済み、下の娘は未接種と予防接種の管理がしにくいです。副反応公表した上で任意無料接種などある程度親に責任を与えても良いのではないのでしょうか。
1265	3回目接種日の夜のニュースで、副反応の報道があり、心配しましたが、娘に関しては、何も問題はありませんでした。身体障害者は、介助者の手から感染する可能性もあると聞いていたので、無事に3回接種できて、良かったと思っています。
1266	妊娠しにくいと聞いたのですが、どうでしょうか？少し心配です。思ったより注射は痛かった様ですが、3回接種しました。無料でできたので良かったです。
1267	子宮頸がんワクチンが騒がれる前に打って何事もなかったのも、言えることなのかもしれませんが打たないで病気にかかる怖さももっと広めるべきかも
1268	接種は2回でいいと思っていました。
1269	3回目の接種の後 数日後、頭が痛いと中学校を早退してきました。2月という時期もあり、風邪かと思いい病院に行き診察を受けた時、先生に「副作用の一つ」かもと言われました。
1270	1度目の接種時緊張の為か痛みでか失神しました。なんとか3回接種しましたが、副反応については今も心配しています。

1271	他の受診をしたとき、医師からかなり強くすすめられた。副反応については用紙をもらって接種前によくよみ、不安だったので医師にたずねたが、心配はないと強く接種をすすめられた。今のところ心配な症状はでていないものの、うけさせたことは親の責任なので、とても後悔しています。学校でも接種をすすめる用紙をもらってきたので、あのときの国の方針は本当に正しかったのか、しっかり反省してほしい。
1272	子宮頸がんワクチンをH24年1月接種したあと、接種した左うでがしばらく痛いといっていた。
1273	ワクチンは●で受けてます。
1274	3回打ちましたが本人は痛いと言っていました。
1275	先に、報道されている様な副反応を知っていたら、どんなに勧奨されても予防接種を受けさせるという選択はしていませんでした。娘は、たまたま何ともなかっただけで、その後の報道を見て本当に怖くてぞっとしました。様々な症状を訴えておられる方は、絶対に予防接種の副反応だと強く思います。検討して下さいの専門家の方々は、ある日突然ごく普通である事の幸せな日常を奪われた方々の心身の痛みをしっかりと見ていただきたいです。そして何も隠さず明らかにして、予防接種なら無料…だけではなく、検診にも費用の補助をしていただき、こまめに検診を受ける…など予防接種以外の選択もできる様にしていきたいです。
1276	サーバリックスH22.11..24、H24. 12. 24、H23.7.22、3回接種しました
1277	3回接種をするも、3回目の接種後、接種側の肩関節があがらなくなり激痛がとれない、診察して頂いても原因がわからず、1カ月近く、痛みとあがらない状況が続きました。今はもんだいがないようすが…。
1278	(子宮頸がんの)注射をうった日の夜は手(注射をうった手)が痛すぎて、全然眠れなかった。
1279	母子手帳で調べたりする必要があるのでは？手間がかかってしまう…。仕方がないのだが。だから調査協力数が少ないのでは？⑩の「現在も症状がありますか」の解答に困った。いつも視力が急に低下する訳がない。私の場合AA→CDに落ち、今もゆるやかに低下している。ちなみに視力が悪いのは家族の中で私だけである。
1280	母子手帳をしまい込んでどこにあるかわからないので、正確なワクチン接種が書けませんでした。ほとんどうけています。子宮頸がんワクチンについては、副作用がとりざたされていますので、気をつけて様子を見ています。今、気になるのは、生理不順であること、月経量が極端に少ないこと、生理痛がひどいことです
1281	H24.9月に自費で1万以上でしたが、報道前で、3回打たないと効果がないと医者に言われ、本人をせっとくしてうけた。とにかくうでが痛く、上がらない、辛い…。スポーツもできずでも数日～10ヵ程で治ったようです。とても自費で受けたのに報道が有り、くやしくて、そして心配しましたが、本当に効果が有れば良いが、辛い状態の方々がかわいそう、娘のためと誰もが思ったのに…。本人は特定されない…。と書いてあるが、まだ回答がないとの手紙はどこかにナンバーが入ってるとしか思えません。どうなってるのか？なんだかこっそり見られてるような不安です。
1282	娘が接種した後に、知人の娘さんが子宮頸がんワクチン接種後に痛みと腕が上がらなくなり苦しんだという事を聞き怖くなりました。もし先に聞いていたら受けていないと思います。もっと安心、安全が立証されるまで結論は忙がないでほしいと思います。
1283	ワクチンを受けた時点では、まだ生理が来ていなく、それでも受けていいものかと医師に相談して受けやが、問題はなかったのか。その後生理が全く来ず、結局、中3の終わりに来たが、その後も量も少なく、何カ月も来なかったりと今だに不順である事が心配。後、親しくしてもらっている友人の名前を思い出せなくなる事がある。
1284	アンケートの結果を、知らせていただく時に、どこの病院にかかれば総合的に病気の原因を調べてもらえるのか教えていただきたいです。
1285	1、2回目とも何の心配もなく受けました。3回目を受けようと思ったのですが、3回目でひどい症状が出た人もいと聞いて怖くなりました。3回受けなくては効果がないでしょうか？せっかくなら2回受けたのと同じ気持ちもあります。早く、原因、今後の対策を打ち出してほしいです。
1286	私(親)が子宮頸がんになったので、安全であればH13生まれの妹にもワクチンを接種したいです。
1287	ガンになるリスクが少しでも低くなるならと将来のことを考え接種させました。当時高2だった長女も(無償の対象の年齢ではない。)いっしょに接種しました。金額それなりに高かったです。接種してから年数が経っているので、接種後すぐに体調の変化などささいなこと気づかず。又、忘れてしまっているかもしれません。今、現在、2人とも健康です。ニュースになった後遺症のこの後だったら、接種を止めていたと思います。
1288	①②月経はまだ来ていません。⑩過去吸は部活動の試合に2回なりました。④頭痛は、小学校3年生の時から片頭痛のため、一応記入しました。子宮頸がんワクチン全部接種しました。直後は他のワクチンと比べて少し腕が重いと感じました(1日くらいでなくなりました)同じように接種した友達で、数日間腕が上がらなくなっていました。一日も早い原因究明をお願いします。
1289	学校の友人が予防接種(子宮頸がん)が原因で半身マヒになった子が身近でいたので怖いと思いました。原因を調べた上で全国民に分かりやすく説明してほしいと思いました。

1290	副反応の報道を見てから、子供が体調不良(頭痛etc)を訴えるたびに副作用ではないかと毎回不安と恐怖を感じます。「これが一生続くのです！」
1291	子宮頸がんワクチン接種後しばらくの間見た目にも分かるぐらい腕がはれていた。
1292	(1)1回目はサーバリックスだと思いますが、2、3回目はわかりません。
1293	アンケート結果を是非役に立ててほしいです。安心してワクチンを打てるようにお願いします。
1294	義務と思って解答しましたが本当に必要な物でしょうか。調査結果は解答した人にだけ公表すればよいのでしょうか。答えない人は興味がないので公表しても見ないと思います。母子手帳を出して記入するのは案外面倒なものですよ。
1295	子宮頸がんワクチンを受けた時、筋肉注射だったからか、3日ほど筋肉痛がした。
1296	子宮頸がんワクチンを受けてから特に生理痛(腹痛)がひどくなったように感じます。
1297	中2の時、起立性低血圧になって、学校を休みがちになり、中3の冬に子宮頸がんワクチンを接種し、高1の夏に2度目の接種をした。状態がだんだん悪くなり、休みがちながら高校を卒業し、大学入学したが、今は休学している。(大学1年の秋から)
1298	接種後の副作用の現状をもっと詳しく公表して欲しい。どのような事例があるのかこのアンケートを配布した人すべてに送ってください。
1299	子宮頸がんワクチンは本当に安全なのか知りたい。
1300	インフルエンザの接種を毎年していますが、こちらは痛くないみたいで平気な顔してるのに、子宮けいがんの注射は痛かったらしく少しあばれました。(障害児で話す事も理解もむずかしく様子を見てですが…)
1301	タイミングが悪く行けなくなっていた時に報道が流れたので 必要性を感じなくなりました。
1302	母子手帳を見つけられなかったので、子宮頸がん以外の物を接種したかどうかはわかりません。申し訳ありません。
1303	どのような副作用があるのか書面で示してからアンケートした方がよい。また副作用のうたがいがある場合どこに相談するのか。
1304	子宮頸がんワクチンを接種した後は数日間かなり全身痛を訴えていました。接種した部位も赤く腫れ上がり心配しました。
1305	受けた日から3,4日足の筋肉が痛くて 歩く事もできないくらいでした。
1306	接種後翌日からうでがあがらなかった。(2~3日続いた)うったところが赤くはれ熱をもっていた。両うで
1307	打った後、すごく腫れて痛かった。体がだるくなった。
1308	質問内容が多い。時期が明確に思い出せない。
1309	今まで予防接種をしても何にも副反応を示したことはありません。でも、今回の様な事例を知っていたら、接種を控えると思います。
1310	腕が45度より上に上がらなかった。(ワクチン接種5日くらいまで)
1311	1回目を接種後、夜発熱がありました。医者に相談したところ多分大丈夫との事で、2回3回目と接種しましたが、後に副反応の問題が出てかなり不安になりました。結果として今の所、健康に問題なく生活していますが、親にとっては一抹の不安が残っています。アメリカが接種しているからとか他国のまねでなく本当に将来を担う子供達の事を考えてほしいです。この娘の他にも6才年上の娘がいるので同じ自分の娘に不公平がおきるのも…と考え自費で接種しましたが、この娘を育てている間に何度も副反応などで接種が変更、中止となり、親として何を信用して良いのか判断出来ず大変でした。(母子手帳の予防接種欄は訳がわからないほどになっています。)子供の健康を守る為なのか実験台としてコロコロ変更しているのか？国のやり方に疑問を持っています。
1312	この子の上に姉が子宮頸がんワクチン打ちましたが何ともなく、この子も1回はうちましたが何ともなく…その後2回めうっところにテレビ報道があり迷いましたがテレビを見た以上少し不安になり1回うっただけでやめてしまいました。上の娘たちも特になにもないです。
1313	本人が気にする(心因性)といけないので今回は、保護者が記入しております。けいれんに対する措置や副反応のケースがあれば、報告書で示して下さい。本人の友人もけいれん症状あるそうです。
1314	子宮頸がんワクチン接種後、接種した所が腫れて痛くて触れると激痛が走り、二週間程は、腕があがらなくなった。娘が接種した頃は、副作用についての報道もなく、接種の時に担当医に症状を伝えても、注射には、よくある事ぐらいな感じでした。3回接種し終わった頃に副作用の報道を知りすごくゾッとしました。
1315	娘は何事もなくよかったですのですが、皆さんの症状を聞くとおそろしいです。娘もそうになっていた可能性もあったかと思うと、人事ではありません。ぜひ、原因を追求して下さい。また、被害にあわれた方々への救済をのぞみなす。
1316	ワクチン接種した頃からずっと今も腰の痛みがあり子供がかわいそう。
1317	当時にも副作用を心配して期限いっぱいまで実施を悩みました。それでも将来実施しなかった事を後悔したくないと思い、期日に押される様に実施しました。3年過ぎて特に副作用は出ていないと思いますが、これから先も心配です。

1318	22年11月1回目を受けた時に腫れて大変痛かった。でもそんなものかと2回目を受けた。その頃、突然授業中に座ってられないほど背中痛み、身体の痛みで早退をし、その後痛みの原因を探して病院を転々とした。授業も休み、体育も休み、学校のかばんが背おえず教科書を減らしてなんとか中学を通った。大学病院も整体も原因がわからないといわれ、本人も家族もつらかった。高校に入って部活に入りきたえたので痛いということも減ったが横になることも多い。接種が原因なのか他に原因があるかわからないが、国が定めた接種なので、体調の変化のあった人対象にきちんとした検査を実施してほしい。娘の中学時代を痛みとの闘いで過ごしてしまっ親として本当につらかった。接種が原因なのかはわからないけど将来のためはっきりさせてほしい。
1319	一人一人個別に個体が違い差異があるので、様な行政で統括しないでください。アレルギーテストなどの事前テストをして緻密に行ってもらいたい。行政の無責任、責任を執れないのなら行わない方がよいと思います。「私は知らない、関与していない。」では公務員でないと思います。日本の行政は、不完全ですので慎重に対応する様、心掛けて下さい。頭が悪いと思います。ワクチン禍を起こさないでください。行っている諸々の仕事は、大丈夫ですか？
1320	接種後、軽いパニックになったり、足に力が入らなくなったりした。高校入学して緊張もあつたり、生理前もあつたが過呼吸みたいになり、右手のふるえが出て、意識がはっきりせず、入院して検査したが異常なし。高校3年間、ストレスがかかると体に出やすくなり、身体表現性障害、解離性…に近い状態と言われてきたが、元に戻るのが早くなり病名は、つけられないと言われてたがてんかんの検査も何回かしたが、違っていた。3年間●で診てもらっていたが今年4月より女性外来のある心療内科に通い始めた。自分で体調コントロールするように指導。倒れたり意識があやふやになり、救急車で●に23年4月より8回。ストレスからの体調不良、バランスがくずれての不良…。はっきりとした原因わからずでした。今は大学に通学。
1321	子宮頸がんワクチン接種後しこりができた(1回目より)。先輩からもそんな話を聞いた。1回目より2回目以降しこりが大きくなった人もいたようだ。看護師さんもそういうケースが多いことを知っていた。同級生は1回目接種後すぐに体調が悪くなり大変な思いをした。このワクチンを接種した際何らかの症状が出たかどうかを尋ねるアンケートの設問がないのはどうしてですか？そのためのアンケートだと思っていたのに！！受けた時期が書いてあればいいと思ったのですか？もっとわかりやすく接種との関係があるかどうかのアンケートにしてほしかった！
1322	母親である私の姉が子宮頸がんで(初期)手術をしたこともあり、娘にワクチンをうたせましたが、他のお子様には、絶対おすすしめしません。なぜならアンケートにも書いたとおり、もしかしたら今の娘の眼のつらい症状は、副反応かもと疑ってしまったからです。日常生活では一人で行動することができません。人の集まる所には行けず、バスや電車に乗るとき、私が付き添います。スーパーなどの買い物は、まっすぐ歩けず、いつも下を向いたままです。当然授業やテストを受けることはできませんので、大学受験も失敗し、4月から通信大学に行くことに進路変更し、希望を見つけました。唯一のたのしみである、映画鑑賞は一番前列で鑑賞します。本は好きですが図書館では読めません。本人としては将来自分の就く職業はあるのかと思案中ですが、自給自足を勧め、現在は畑で野菜作りを始め、太陽光発電でガスも引かず暮らしております。大都会名古屋を離れ母親の私と2人で田舎暮らしをはじめました。高校のカウンセラーの先生(とても理解のある先生でした。)の紹介で月に一度名古屋の病院に良くなる薬をもらいに通院しております。娘もとても信頼しております。田舎にきて症状はかわりませんが、人の多い都会での不快感は少なくなり、前向きです。人生を変えるほどの症状ではありますが、私達のように状況が少しでもかえられる環境にいられるのは幸せと思わなくてはなりません。いろいろな症状で悩んでいる娘のような若い女性がすこしでも楽になれるよう、周りの人たちがわかってもらえる環境があるといいと思っております。P.S.娘本人はこのワクチンの副反応かどうかは確固たるものがないという感触です。この症状がでる前は性格はひょうきんで周りにいつも友だちがいて、人を笑わせるのが得意な子ではありました。
1323	これからどんな症状が出てくるかわからず不安です。これからも、追跡調査をして下さい。
1324	ワクチンを打ってから生理がくる、終わる直前に3ヶ月に1回程度おなかに激痛と(ずっと休まない激痛)時々吐き気をもよおしはきつづける。
1325	次女(中1)も接種しなければならぬが副作用が心配でふみ切れません！安全なワクチンを早急に！！
1326	注射をした後に高熱がでたが、病院を受診する前にひいた。
1327	筋肉注射、痛かった。このアンケート、答えにくいです。もともと身体の症状か←たぶんこっち、注射かとか…
1328	質問2であてはまる症状がいくつかありましたが子宮頸がんワクチンとは関係ないと思います。それとこのワクチンに接種期間があるのに守らなかったのも効果があるか分からないのでホームページとかにくわしく書いてあるといいなと思いました。
1329	痛がる具合がひどすぎた為、奇異に感じ1回目をやめさせました。(母親)その後、一回でも効果がありと指針が出ていましたが、心配です。本人は肌あれがすると言って、病院に通っていますが、原因が不明。局所的に症状が出ており、長びいております。今はまだ、学生ですが、(手の平に出ているので)家事などできないままになるのが不安です。

1330	(母)肌あれの症状は次第に変化し、しっしんから、じんましん状なものになり、一部→全身へ。今では見るも無惨なくらい顔がはれることが月1~2回起きていて、病院でも、不明です。(アレルギー検査でも、原因ははっきりせず)これがもしのどがはれた時には命の危険もあるそうです。接種後(体も大きくなって丈夫になった後)説明のつかない体質の変化・原因不明の症状が、とても心配で不安です。
1331	今後、痛みが出た時心配。
1332	子宮頸がんワクチンは、16才頃アメリカ在住中に接種しました。
1333	接種を奨励する前にもっと慎重になるべきだったと思います。娘はたまたま副作用がでなかっただけ。接種の際医師に、雑誌等で色々書いてあるが、大丈夫か確認したが、“打つべき”と言われた。何が根拠だったのか。疑問に思う。
1334	子宮頸がんワクチンを接種した直後、発熱しましたが、次の日くらいには下がり元気になりました。子供の様子は、熱が出たことのみであとは特に何もありませんでした。
1335	生理不順が続いたのでH14.3月に産婦人科を受診しました。●と●を処方されました。その後は、特に不順にはなっていません。
1336	2回目の子宮頸がんワクチン接種直後に倒れました。原因不明です。
1337	注射がすごく痛かった。
1338	今後、死(ガン)に対する不安や妊娠中や多胎に悪影響は、ありませんか？
1339	副反応として翌日37.5℃程度の発熱と腕の接種箇所の腫れと痛みあり。痛みは相当ひどそうでした。
1340	話題となっている後遺症が、子宮頸がんワクチン副作用であると証明されない限り子宮頸がんワクチンの接種を続けるのがいいと思います。
1341	子宮頸がんワクチンを接種後、吐き気がありました。(何回目の接種かは忘れました)接種した医院に連絡しましたが、「副作用はないはずだから様子見て」と言われました。翌日ごろは回復していました。
1342	ワクチン後身体に異常がでてしまった方々が救済されることを協力する為に、アンケートを記入しました。
1343	サーバリックス接種直後、2~3日接種した腕の筋肉痛がひどく、腕が上げにくい状態でした。平成12年生まれ(1月)の弟が、日本脳炎を全く接種していません。どうしたらよいか悩んでいます。予防接種の安全性を確立してほしいです。
1344	子宮けいがんワクチンの3回目の時に気持ちが悪くなりました。
1345	ワクチンの成分に問題がある(外国では認められていない薬とか、殺虫剤やネズミを殺す薬の成分が入っているなど)との情報をインターネットやフェイスブックにのっていた記事を見てこわくなって下の子には受けさせていません。上の子は3回接種時は症状は何も起こらなかったけど、ひどい副作用が出た子の報道にはとても心が痛みます。詳しく調査してもらいたいです。
1346	回を重ねるごとに接種後の痛みが強く、今まで予防接種でそれほど痛くなったことはなかったので、びっくりしましたし不安になりました。母は接種を止めればよかったねと言っていますが私は幸い副作用(反応)が長びかずおさまったので良かったです。このアンケートでは、なしにつけました。昔すぎてよくしっかり覚えていないので、今は大丈夫ですし、もう少し早くアンケートをとってほしかったです。
1347	接種後、腕が腫れて、痛みが強く残った。1週間ぐらい痛かったのを覚えています。
1348	特にひどい副反応もなかったと記憶しています。今大学生で名古屋にいないため母が記入しました。
1349	副反応が接種後、何年まで出る可能性があるか知りたい。
1350	はじめから副作用は無いものとして対応していることに大変不信感を持っている。それだけに対応は遅いし被害も拡大している。今度新しい予防接種をすすめられても(子宮頸がんワクチンに限らず)警戒して接種しない傾向がひろがると大変なことになるということまで深く考えて対応してもらいたい。
1351	早く原因究明して下さい。
1352	サーバリックスは2,3日痛みがあった。体育の授業を受ける事が困難だった。
1353	接種(3回目)した日の夜に高熱(41℃超え)が出ました。その後長期間にわたり体調不良が続きました。
1354	ワクチン接種歴が分かりにくいから、もっと見やすく分かりやすいように母子手帳を変えて欲しい。(一目で分かるようにしてほしい)他国で重大な副反応の報告が出ていたのに、日本でもワクチン接種を推めていったのは無責任だと思う。今後は安全をしっかり確認してから推めて行って欲しい。がんになるよりも重い後遺症をおって生活していくなど許されることではないと思う。私自身も注射を打った当日は腕が痛く動かすことができなかった。
1355	副反応の原因が、解明されてなく、接種してしまったことを親として後悔しています。特に、何も症状がないのに、そう思うてしまうくらいで、同じ年頃の娘さんが苦しんでいると思うと、早く研究をすすめて、助けてあげてほしいと願います。
1356	(上の子と同じ内容を記入)子宮頸がんワクチンを接種する時、副作用については情報がなかった。欧米ではすでに(日本よりだいぶ前に)子宮頸がんワクチンが接種されているとは知っていたが、欧米では重症の副作用はでていなかったのか今になって疑問に感じた。子供は副作用はでなかったが、もし欧米でも日本の子供達のように副作用がでていることを知っていたら、ワクチン接種はしなかったと思う。(保護者)副作用の原因がはっきりするまで、接種はしない方がよいと思う。

1357	子宮頸がんワクチンを接種する時、副作用については情報がなかった。欧米ではすでに(日本よりもだいぶ前に)子宮頸がんワクチンが接種されているとは知っていたが、欧米では重症の副作用はでていなかったのだろうか疑問に感じた。子供は副作用はでなかったが、もし欧米でも日本の子供達のように副作用がでることを知っていたら、ワクチン接種はしなかったと思う。(保護者)副作用の原因がはっきりするまで、接種はしない方がよいと思う。
1358	種類は、わからないが2回目で接種しました。2回目は半年後(?)か期間が空いたので病院の催促がなければ行くつもりはなかったが、報道もなかった時期で、病院側も(市の無料クーポン利用)「ただだからやった方がよい、もったいない」と看護師からすすめられ接種。2回共に娘は、すごく痛い…と話していました。接種後、はれたので、(ハチに刺されたよう)相当痛かったと思います。後遺症は何年という判断で、保障はどの程度すすんでいるのでしょうか?娘は、赤ちゃんが産める体のままですか?心配しています。
1359	接種をさせた親としていつも心配しています。何かあるたびに副作用ではないかと心配になります。今は後悔ばかりです。
1360	子宮頸がんワクチンを接種して、ずい分と年数がすぎたが、まだ副反応の出る可能性があるのかないのか知りたい。
1361	封筒が小さくて入れにくいので改善して欲しい
1362	思春期特有の症状なのか、子宮けいガンワクチンの影響が多少なりとも関係しているのか、ひっかかっています。相談できる場所をしっかりとってほしい。
1363	副作用で苦しんでいる方が多く、今後の対応等のためのアンケートという事は理解できる。我が子が接種後も体調を崩す事なく過ごせているから言える事かもしれないが、子供は今、受験生です。学校祭の準備とも重なり、とてもアンケートを記入してとは言えず、保護者の自分が分かる範囲で記入した。本人が記入する場合と回答がずれる事もあるかと思う。アンケートの時期も悪く、何より質問が複雑で、わかりずらかった。もう少し回答のしやすい工夫が必要かと思う。回答の返信が少ないと新聞にのっていたが、アンケートに答えたいと思っても正直、1ページめからやる気をなくす内容だったと思う。
1364	予防接種をすすめた国はその後の副作用にも 対応するべきだと思う。副作用を心因反応と言う所は誰が見てもおかしい。きちんと取り組もうとしない所は、何らかの力が働いているからではないかと思ってしまう。今回の事件は正しく公表してほしい。そして 副作用の出た方への補償をきちんとあげて欲しい。同じ事が起きない事が望ましいが、副作用かなと思われる事には適切に対応するべきだと思う。ワクチンを採用する者は、もっと慎重に導入し、副作用が出た当事者の事をよく考えなければいけない。対応が“ひとごと”で、思いやりがないと思う。
1365	国のすすめでうったのに、後から副作用の報道が出て、本当に後悔しています。どうしてそのようなものをすすめたのか…。二度とこのようなことが無いようにしてほしい。
1366	とても元気です。うけるワクチンはすべて接種させていただきました。
1367	子宮頸がんワクチンを受けてから、異常はなかった。痛みは強め…。
1368	よろしくお願いします。
1369	接種後(3回共)腕が肩より上がらない日が2~3日続きました。(同時に痛みもすこしあり)医師にその事を伝え、みなさん同じ事を言われるとのことでした。
1370	子宮頸がんワクチンを初めて打った時は帰ってからしばらく寝なくてはいけないほどの全身への影響があったことを覚えている。自分自身は今のところ体に大きな影響はないが、ニュースなどで注射を打ったことによる後遺症に苦しむ女性を見て、本当に悲しく思う。今後、自分の子どもにワクチンを打たせるようなことがあったら、しばらく周りの様子をみてからにしようと思えるようになった。
1371	接種勧奨し無料で受けられるとの事で良いことだと思い積極的に受けさせました。接種する前に効果や副反応が書いた紙をもらいました。しかしさっと読んだだけであまり深く考えず今までも何も問題がなかったのが気楽に受けました。接種した時は、少しはガンを予防できたと安心しました。でもその後テレビ報道などで大変な症状がでている事を知りました。すごくびっくりしました。うちは重大な症状がでてないので良かったのですが勧奨したり、中止したりもっとしっかり調べてからにしてほしい。この事を知っていたら受けなかったかもしれない。
1372	もっと調査してからやってほしかった。
1373	接種ゴ、月経が約1年とまってしまいました。そのご、月経ももどったものの、とても不安になり、報道の内容(妊娠できなくなる…)が追いつちをかけました。本人の拒みが強く、受診はしませんでした。あと1ヶ月月経がなかったら無理にでも受診させる考えでした。安全性が不確かであるもの、絶対と言える程のものでない限り推しは絶対にやめて欲しいです。
1374	「物すごく痛みが強い注射だったので嫌いだった。」と言っています。
1375	子宮頸がんワクチン接種後は、腕を痛がった為2回目からは接種する時は、翌日の授業で体育の授業がない日を選んで接種しました。
1376	接種後に眠気におそわれた。腕がはれ、かゆみが出て、真っ赤になっていた。

1377	注射を打った直後1週間はずっと腕が腫れていて、痛みが続いていました。腕が上がらなくて、学校での授業がつかった覚えがあります。寝るのもつらく、しばらく泣きました。当時は心配しましたが、その後副作用もなく今は接種させていただき、ありがたく思っています。接種時の体調が万全であるよう、注意しました。副作用に苦しむ娘達と同じ年頃の人の姿をテレビで見ますと、とても、他人事と思えず、心が痛みます。“全ての人が安心して接種できる”と言う事は、無理な事なのでしょうか？今後インフルエンザ等の接種も不安になります。
1378	回答した月経不順の原因は摂食障害だと思います。ただ、「原因がはっきりしている一時的な症状は『あり』に含めない」とあったため、症状が一時的ではないので『あり』と回答しました。
1379	副作用であるのなら、早期の原因究明願います。
1380	子宮頸がんワクチンを接種した後にしびれがおさまりましたけど、これは、大丈夫だったのかしら？
1381	サーバリックスを2回接種した後に副反応の報道が出て3回目を接種していません。主治医とも相談しましたが、親の考えで決めて下さいとのこと。2回目でも接種していれば0回の人よりは効き目はあるのでしょうか？親族はガン死亡者が多いため娘にもワクチンをとって接種しましたが…このままでは心配です。もう少し情報がほしいです。
1382	接種したところを痛がった(数日?)赤く少しはれた。治った。
1383	SNS等で全世界的に問題になっているこのワクチンを何も知らずに学校から渡された案内をもとに全接種。重とくな問題にならず良かったと安堵。しかし、現在も接種され重とくな副反応に苦しむSNSを見かけます。なぜ国は中止をしないのでしょうか？薬事ビジネスでしょうか？これ以上の薬害問題に発展しないよう対策を望みます。
1384	子宮頸ガンワクチンを接種した記憶があるのですが、母子手帳に記入がなく、もしかしたら受けていないかもしれません。(保護者記入)
1385	普段の予防接種は何も言わないのに(小さい頃から)このワクチンだけは、打つ時も後も痛かったと言っていた。
1386	子宮頸がんワクチン2回目接種直後病院から帰る途中、気分が悪くなり、歩くことができなくなった。3回目の接種は悩んだが、半年期間があったので受けた。後遺症のことは、その時は知らなかった。
1387	当時はワクチンが現因とはまったく思っていなかったので頭痛や手足のしびれがあったことを思い出すと、今後また何かの症状が出ないか心配です。不妊症や子宮の病気になる確率が高くなったのではないかとも思います。母親としては娘に対して申し訳なく思う反面、日本の厚生労働省に怒りを感じます。
1388	1才前後にはしかにかかり入院してから予防接種をほとんど接種していないが・・・。
1389	注射はかなり痛かったようですが副作用はありません。小児喘息で、小学校高学卒までは専門医治療。中学に入り、体が女性として成長しだすと喘息とバトンタッチのようにアレルギー(主に鼻炎)がひどく、又、ストレスからか？片頭痛持ちとなってしまいました。食の細い子なので、とても小柄です。何か統計から原因等が判明し、今後、皆さんが安心して予防接種出来る日が来るよう心より願っております。
1390	娘は接種しても、特に異常はない様です。異常があった方はお気の毒です。早く治る方法が見つかる事を祈っています。
1391	友達など周囲の子たちが接種する子がほとんどだったので、一緒に接種した。その当時は、副作用の危険など考えもせず、がんにならないようにと思い、疑いもせず打たせた。
1392	子宮頸がんワクチンの副作用の原因追求をして副作用で苦しんでいる人を助けてあげてほしいです。決して「精神的なもの」と片付けしないでください。
1393	私の子供は、子宮頸がんワクチンで何の異常も出なかったが、副作用の出た方には、ちゃんとした対応をしてほしい。「心の病」「精神的なもの」で片付けられることではないと思う。
1394	もし、今の頭痛が副作用によるものだとすると納得がいけないので、副作用までしっかり調べてほしいです。
1395	海外では当たり前のワクチンであった為、市の無料接種で飛びつくように受けました。現在副反応で思い症状の方を見る度、一体なんだったのかと疑問が大きくなります。しっかり調べてほしいです。たまたま副反応がなかった(少なかった)者のひとりとして気になります。
1396	子宮頸がんワクチンを接種した後、1回目のときに腕がはれて熱が38度以上でました。
1397	看護師です。注射をうけて副作用がある人がでてくる人がいるにもかかわらず、予防接種で定期接種にまたなったのでしょうか？麻しん、肺炎球菌他で副作用がでた例があったとしても、予防のためなら考えて受けると思います。HPVに関しては他の方法でも子宮Kになるリスクは減らせると思うので、どういう経過で、どういうエビデンスでまた定期Aになったのかと思ってしまいます。たぶん医療に関わっている人の子供は受けている人が少ないのでは・・・？
1398	痛かったです。
1399	子宮頸がんの予防接種後に大変ひどい副反応に苦しむ少女達の事を思うと心が痛み、この予防接種を完全に中止しない国に対しても怒りを覚えます。わずかでもこの様な副反応をおこす確率があるのなら、それが当時わかっていたら絶対に娘に接種を受けさせる事はありませんでした。名古屋市でも被害に苦しむ子供達への支援を早急に進めてほしいと市長にお願いしたいです。(保護者)

1400	報道で問題になったような、ひどい副作用はありませんでしたが、今まで受けた予防接種では経験したことのないような、身体のだるさ、発熱(37度くらい)、頭痛。接種した部位(腕)の痛みがありました。
1401	子宮頸ガン3回目の時に40度近い熱がでてビックリしました。接種しない方が良かったと思いました。
1402	副反応に苦しむ方の報道に触れ、何もなかった自分は運が良かったと思う。がんという苦しみを避けるために 別の痛みを受けることにはならない方がよい。研究が進むことを望みます。
1403	子宮頸がんワクチン接種後5分後に気分が悪くなり病院のベッドで休んでいた。30分ぐらいで回復しました。病歴・・・今年平成27年7月 卵巣腫瘍で一部切除(良性)
1404	1回目受けた直後に気持ちが悪くなり、めまいがして倒れて(パタンと意識が失くなった)病院で横になった。(倒れた時は頭をぶつけないかった。)これからも何か副作用が起こる事があるのでしょうか？今は18才ですが将来、子供ができにくいとか、年をとって更年期障害が重くなるとか、とても心配しています。とにかく原因をあきらかにして欲しいです。
1405	なぜ副作用が起きたのですか？何もなかったのに逆で怖いです。
1406	多発性硬化症を発病(H24.10)
1407	日本脳炎については接種時期がずれています。(米国で生まれ、その後札幌に引越したため)
1408	自分自身、体の痛み等の症状はでなかったが、身近な友人は体のしびれを感じるとワクチン接種後に話していた。
1409	痛みなどの症状に苦しんでおられる方が、一日も早くよくなれますよう、祈っています。
1410	2回目3回目接種後少し脱力感があつた。
1411	当てはまるどころが多く、とても不安になりました。
1412	子宮けいがんワクチンを接種後の副作用についてもう少し詳しくわかっていれば接種させませんでした。娘は、いまのところ副作用はありませんが、こういう結果(何が原因かまだわかりませんが)になって残念です。
1413	子宮頸がんワクチン接種後、10日程痛みが続いた。
1414	子宮頸がんワクチンの済証明だけで無く、どちらのワクチンかわかりません。副反応の報道を見て、妹には(2才下)受けさせませんでした。
1415	子宮頸がんワクチンを接種した後、10日程痛みが続いた。
1416	当初から、失神する、不妊症になるなど、デメリットが流れていたの、ネットで調べまた医師にも相談しました。数年経ち全く異なる副作用が出て驚きました。当時流されていた情報はネットのおもしろ半分のものだったのかと、イヤになりました。あの時一笑して、うわさを否定し、接種してくれた医師に感謝しています。被害にあわれたという方も、いつまでも心配せずに大丈夫ですと胸をたたくくれる医師がいたら精神的に安心し、「やる気が出ない」などという病気にならなかったんじゃないかと思います。
1417	副反応が気になったので、3才下の妹はうけていない。
1418	子宮頸がんワクチンの無償化が段階的で第1回は実費だった。予算の都合もあるだろうが、分かりにくく不親切だと思った。娘もワクチンをひどく痛がった。当時も「痛い注射」という話はあつた。
1419	今、体調が悪く気力も湧かず学校休みがちですが、これがワクチンと関連があるのかどうかわかりません。本人は否定していますが、元気が出ず困っています。
1420	もっと調査してから、予防接種を推奨すべきである。もっと慎重になるべき。
1421	子宮頸がんワクチン3回目まで接種したが、副反応はまったく出なかった。
1422	ありがとうございました。
1423	子宮頸がんワクチンを接種した数時間後から、腕が上げられなくなったり(痛みにより)体のだるさが3日ほど続きました。(3回とも)
1424	2回目の接種の時かなり痛かったようでしばらく痛みが続いたようです。接種後ニュース等で副作用のことで子供が多数いた事を聞き 私なら今後は身内の接種は受けさせないと思います。
1425	頸がんワクチンを受けてしまった事を非常に後悔しています。なにかにつけ、ワクチンの為と考えてしまう様になりました。
1426	子宮頸がんワクチンは、無料対象になったので接種させました。さいわい、副反応はでませんでした。この予防接種で、日常生活に支障がでた子供たちのことを思うと胸がいたみます。今だったら、接種させていないと思います。
1427	受けた後、2日ぐらい腕が上がらなかった。
1428	子宮頸がんワクチンをうちましたが、何の痛みもありませんでした。
1429	一回目接種をしてそのまま大丈夫なのか心配です。二回目も接種して何も無いならうけたいです。出来れば無料で受けたいです。
1430	子宮頸がんワクチンは他のワクチンと比較して、かなり痛がっていました。接種した方の腕は大きく膨れて、夜は氷で冷やしてもなかなか眠ることができず泣いてしまうほどでした。現在いろいろな情報があり、三女の接種になかなか踏み切れないのが現状です。子宮頸がんの予防接種について正確なデータ・情報を希望します。
1431	妊娠ができにくいとあとから聞きました。親の私は、とても心配しております。

1432	娘は特に副作用、反応も何もなく良かったのですが、後で色々な反応例を聞いたり、知る事で、ワクチン接種がとても危険なものだったと思うと受けさせた事を後悔しました。
1433	子宮頸がんワクチン3回目接種後、39℃の発熱が2日間ありました。特に風邪症状もなく接種した、クリニックへかかったところ、ワクチンの影響では？との事でした。
1434	名古屋市内では子宮頸癌ワクチン接種後重篤な副作用が出た人がいるのか？また、どのような副作用が多く出たかを明確にして欲しいです。
1435	ものすごい痛みで失神するかと思ったと娘は言っていた。
1436	安全性が認められないのに、予防接種をおこなうのは、よくないと思います。保護者から意見させて頂くと、娘は4年も前の事なので、あまり記憶に残ってないようですが…部活動が同じの友人が接種後にひどい筋肉痛のような痛みが、出たと聞いて、娘がこわい注射だと言ってました、娘も接種後には、体に痛みがあったような記憶が私にはあります。このワクチンで、娘の将来を台無しにしてしまったという「不安」と「自責の念」をこれからも持ち続けていることを、市長さんや役所の方々に覚えてほしいです。
1437	今は何もないですが、これから結婚しようとする時に身体の症状が出るかもしれないという心配はあります。
1438	子宮頸がんワクチンが接種できるようになった中学1年に接種しました。幸い、うちの娘には、何らかの副作用が出ているようには感じませんが、TVなどで重い副作用に苦しんでいる同世代の子を見ると胸が痛みます。下の娘が今、小6なので、本当だったら来年接種する年になっています。予防接種は、本来その病気にかからないようにするために受けるものが、そのために重い病に苦しむことがないように、今後は、十分安全を確認した後、正しい情報もあわせての接種に向けて欲しいです。
1439	年れいの割に、生理周期が異常に短くなっていた時期があり(20間くらい)、そのことが心配でした。今は28日位かとおもいます。手や足が痛いといつもも言っていた時期がありました。本当に中学生かと思えるほど何回もころびケガをしました。外科にも行きました。
1440	副反応の他に不妊になるとか妊娠しにくいなどという事も聞きました。あれ程勧奨しておいて副反応がでたり…と、とても心配です。予防接種によって子宮頸がんになるリスクが減るのはありがたいが、これからもずっと心配です。
1441	一緒にお友達と3人で接種しましたが、強い筋肉痛が出る子とでない子と注射が痛い子、痛くない子それぞれでした。(3回とも)それでも翌日は部活(バレーボール)を普通にやっていました。
1442	3回目のワクチンを打った後、副作用で気分が悪くなった。
1443	他の予防接種よりとても痛みが強く、できるなら止めたかったと本人は申しております。時間的、かきこみだったので本人の意思を確認せず接種させてしまった事、後悔しています。身体的より、痛みをさせてしまった事。報道をみて後遺症の為、つらい人達がいるという事への精神的な事、同年代の子供さんが、苦しみから抜け出せずにいる現実もあり、予防できるのと思う面もあり、複雑です。
1444	子宮頸がんワクチンは3回接種しました。3回とも、接種した腕(接種部分近辺)が腫れました。痛みも3~4日続きました。
1445	接種したいと思うけど、副作用が起きたらと思うと接種できませんでした。報道等により私のように途中で止めた20才位までの人に、無料で接種できるようにして欲しいです。
1446	接種した事に後悔していますが、子宮頸がんワクチンにより子供達が出産時に影響(副作用)などないといいですが、どうでしょうか。
1447	子宮頸がんワクチン接種後、接種部位が腫れる、気分が悪くなるという状態になった。
1448	医者にすすめられないと言われたから2回まで
1449	子宮頸がん予防できるなら良いですが、副作用のリスクを考えると打たない方が良いのかと思い、妹は打っていません。
1450	高校生になってから激しい眠気におそわれて、前日しっかり睡眠をとっても授業中ねてしまい、辛いです。理由がわからず、困っています。これも、もしかしたら副反応なのですか？
1451	良く、頭痛が多く、病院に行きました。じんましんが多くあった。はきけ。インフルエンザを注射を打った時はかならず熱だして、やめた。
1452	子宮頸がんワクチン接種2回目か3回目の後で、数日後微熱や体の痛みが一週間ほど進いたが、受診するほどではなかった。
1453	親の判断で接種して下さいといわれ止める事にしました。2回目も予約したのに、報道を見てこわくなった
1454	普通のワクチンよりも、痛く、はれもあった。
1455	娘に、3回、子宮頸がんワクチンを接種させました。今の様に副作用が出る方もいらっしゃることを知っていれば、3回の接種は、3回とも、やめていました。娘は、全く副作用もなくよかったです。たとえ少人数でも副作用で苦しまれていらっしゃる方を思うと、心が痛みます。
1456	自費で払った分を返してほしい
1457	この調査が問題解決につながるように祈っています。
1458	3回目を接種した当日の夜高熱がでました病院ではカゼと言われましたが、副作用ではないかと心配しました。

1459	1回目の接種のあとに発熱があった。
1460	母子手帳がみあたらないので詳細書けませんでした。
1461	子宮頸がんワクチンを接種した日の夜、高熱が出て、ふるえが出たためその1年後くらいに、ニュースで副作用のことが知りました。
1462	接種後接種したうでが腫れ1週間～10日間程うでが上に上がらなかった。(3回共)
1463	最後の接種をしていません。(副作用の報道を見てから)やらないでいいのでしょうか？途中で止めてしまった人は、たくさんいると思います。皆さんも同じ気持ちだと思います。
1464	ワクチンを打ってから出血多量になったのですが、何か関係はありますか？
1465	②痛すぎて心配してました 部活動(運動部)もできなくなったくらいです。③医者の方友人に止めた方がよいとアドバイスされたから(副作用キケン)
1466	ワクチン接種後にいろいろと問題が浮上してきた、もっと早く何か情報が上がっていれば接種をとりやめたのに、この差は大きい、不安につながっている、お腹の病いのも疑っているが本人が受診する気にならないので手をやいている
1467	がん予防の為にもしっかり接種したいと思っていますが、今の状況だと、ちゅうちょしてしまいます。2回で止めてしまった場合、ワクチンの効果を得る為には、もう一度1回目からやり直して、有料との事でした。一刻も早く安全性を確認して、もう一度みんなが平等にかつ、安心して接種できる様にして欲しい。
1468	子宮頸がんワクチンの副作用はありませんでしたが、ニュースなどで、同じ世代のお子様も副作用で苦しんでる姿をみると本当につらすぎます。安全であるものだと思います注射をうけてると思うので今後、そんなことのないようにあってほしいです。
1469	かかったら死にいたる病気の予防ワクチンですから無料でできたし、ありがたかったです。
1470	そんなに詳しくかけません
1471	今まで一番痛かった。接種後2～3日は筋肉痛のような痛みがあったと記憶している。その他の予防接種はすべて期間内に終了している。母子手帳が手元ないのでくわしい日付などがわからない。
1472	接種した直後は、うった腕の方が痛くて、力がでなかった。マヒしてるような感じもした。接種してから、副作用の話が問題になり3回目をうつのを見送っていたが、医師から、うった方がいいというのと、説明を聞き、うつ間かくがあいたが3回目を打った。
1473	子宮けいがんのサーバリックス接種後翌日から38℃以上の高熱が続きました。3回接種ごと全部です。こんなアメリカで中止になったワクチンを日本で行うなんて最悪な話です。娘2人接種後数年たちあの報道を見て憤りを覚えます。
1474	子宮頸がんは1回目で副反応の報道と医師に相談してやめてしまいました。娘達の年齢ではどのくらいの接種率があったか知りたいです。今後は、どうしたらよいのでしょうか？接種年れいは高校1年生までであと1年となります。
1475	明らかに接種直後に腕の異常を訴えました。その後治まり幸い重篤な副作用は残りませんでしたが、同じ予防接種を受けて今も副作用で困っているお子さんを思うと憤りを感じます。「心因性」と決めつけずしっかり原因をはっきりさせ、対応して欲しいです。
1476	症状が発見されてから対応が遅いと感じました。また、きちんとした説明や情報提供がなかったので、残念です。子宮頸がんワクチンをうつと不妊になると聞いたことがあったので、不安もあります。あれだけCMなどで一方的な情報を与えられていたこともあるので今回のことで信用を失ったと感じます。子宮頸がんワクチン接種後、しばらく接種した部分周辺のしびれや痛みがありました。
1477	注射を打ったあとからよく頭痛をうたえます。頭痛外来に通院お薬をもらいました。まさか副反応があると思わなかったから注射のことはいわず頭痛薬を処方してもらいました。肘も痛いといひます。
1478	ワクチンに関係があるのか、わかりませんが、怒りやすくなった。高1のころから、わがママがひどくなっている。
1479	妹は接種しませんでした。
1480	無料でワクチンができて良かったです。
1481	接種の度に体調が悪くなりました
1482	副作用がひどい人がたくさん、みえたみたいですが、娘はあまりひどくなくて良かったと思いました。ワクチンを受たなければ良かったと思いました。国から受ける様定められたら受たざるえないのでしっかり調査してほしいです。
1483	サーバリックス 1回目接種後当日、寒気、吐気をとまなう39度の発熱。副反応と思われる。(次の日には平熱にもどった)2回目も接種。副反応がなかったため3回目も接種した。
1484	子宮頸がん発症すると重篤な場合が多いと聞き、2度とならないのならと接種を決めました。重い副作用の方が何百にんもいると聞いて気の毒でなりません。早く原因をつきとめなければならぬのではと思います。がんにならないためとはいえ代償が大きすぎるかも。子供の事ならなおさらです。予防接種がかけになるなんて
1485	副反応のニュースを見ると思いますが、予防接種の体調(熱や、1週間以内に風邪を引いていなかったか)や、アレルギーを持っていないか等も、明確にできないのでしょうか。

1486	この時期の子は、予防接種が、あいまいな時期もあり、中途半端でした、日本脳炎も3回目はしておりません。
1487	安全性が確定してから接種を。
1488	特に身体は元気です。
1489	予防接種を受けて何もなかったから良かったものの後遺症に悩まされている子ども達のTV報道を観たりすると人ごとではない
1490	1回目が名古屋で接種が無料になってすぐだったのでたぶんサーバリックスだと思います。
1491	こどもに接種する前にきちんと調べて、副作用がないようにしてほしい。
1492	娘はたまたま異常なく経過しておりますが、副作用が出られた方が、早く治りますように願っております。
1493	子宮頸がんワクチン3回目の後、H24年8月8日「わーわー」と大泣きイライラ、次の時38度台まで熱が上がり、病院で解熱薬をもらったこと事を記憶しています。たぶん、ほとんど熱を出さない子なのでびっくりした事をおぼえています。ワクチンの前後から月経も不順で半年以上来ないこともありH27.5月受診し、服薬しはじめ、様子を見ている所です。ワクチンのせいなのか?心配しています。
1494	インフルエンザの注射より、痛みが長く残ったようだった。
1495	子宮頸がんワクチンを接種するにあたり、副作用があるのかどうか不安になり、無料接種できるぎりぎりまで様子を見ました、友達は、ほとんどしている。新聞の相談の欄には、大丈夫な事が医師の声で書かれていた、でも不安で保健所に行って聞いてみました...十分な答えももらえずあいまいだった、大丈夫のような事を言われ、結局接種しましたが(3回とも痛み)最初の1回であまりにも痛かったので止めようと思ったが医師が皆さん痛みますよと、2回、3回とだんだん痛みが強く一週間位は痛かったので、副作用がでてきたのではないかととても不安でした。しばらくすると、報道で重症な人がいると聞きあまりにもあんに接種してしまって後悔しています。ただ、接種する事を推進するのではなく副作用の事を十分調査したうえで接種するよう呼びかけてもらいたい お役所仕事は事後的で何かあってからでないかと動かないので...信用でないと感じた。なぜ今頃なんですか？
1496	接種後、体がだるかったり、疲れやすくなったりしました。接種を受ける年齢がもう少し体格がしっかりする高校生になってからでもよかったのではないのでしょうか。
1497	上記のとおり 3回目は受けませんでした、1~2回は接種を受けています。今の段階で体の痛みや歩行困難等の大きな症状がない場合、今後心配はないのでしょうか？3回全部接種した場合との違いを知りたいです。
1498	日常生活に支障が出るような、副作用はありませんでしたが、接種時と、その後、少しの期間は腕の痛みを訴えていました。
1499	身体のだるさ等で受診しましたがとくに異常なく、問題ないと云われています。
1500	予防接種の日付の記入が病院によって平成だったり、西暦だったり、バラバラで、できれば統一してほしいです。
1501	日本脳炎3回目が接種していませんでしたので、近日中に接種したいと思います。
1502	我が子は、副作用もなく、生活しております。報道等を見ていると、副作用の出ている子供をみるとかわいそうでなりません。早く、すくわれます様に。
1503	副作用の事例を、あまり明確にせず、予防接種を行ったのは何故か？しかも期限付の無料で...国としては、米国から購入させられた、ワクチンを、早く、使用してしまいたかったのか？どちらにしても、これ程、大変な副作用のある予防接種は、国の信用も無くすことになり、生活に困難になってしまった人に対しても多大なる責任があります。名古屋市の信用及不信感がつる、しっかり責任をとってあげてください。許されない。
1504	子宮頸ガンのワクチン後、色々な症状が出だして、時間がたってからだったり、それほどひどいものではなかったけど本人が痛がったり、おかしいと思える事もあったので、病院に相談をしたけど、「原因不明」で、漢方を出されたけど治らずで、とても不満でした。症状があると眼科、内科、整形など相談しても不明で改善されず。視力もメガネが必要になり、視力低下が進み、眼科ではアリス症候群(まぶしい人が小さく見えるなど)で治ると言われて数年。整形も数回痛みで自転車が乗れないと言っても原因不明。接種した産婦人科では「副反応はない」との対応。軽度な人でも、きちんと相談できるように対応してほしい。どこに相談して良いかわからない。
1505	注射と聞くと、子宮頸がんワクチンを受けた時の強烈な痛みがよみがえり、体がかたくなるといっています。
1506	3年も前の事なので、記録が定かではありません、各質問に対して、不明ですが、なしという回答しか出せない状況です、この調査は本当に活かせるのでしょうか疑問です、もう少し行政は、迅速に動いてほしいと思います。
1507	(1回目)接種後体調が悪くなった。吐き気がして目が見えなくなった(一時的に)
1508	子宮頸がんのワクチンを受け終ってから、問題が浮上し、将来の妊娠への影響リスクも上げられたりしていたの不安を感じます。
1509	予防しきれないので接種よりも検診を重要にしてほしい。学生の頃から検診を受ける大切さを教えてほしい。

1510	H26・6月、医師から、てんかんといわれ現在、薬を飲んでいる。●薬を飲んで、1年半近くになるが、1週間の内、何度か発作(けいれん、硬直、手足のしびれ失神)がある。
1511	子宮頸がんワクチンの副反応のニュースは人事ではありませんでした。娘は特に副反応はなかったですが、動けなくなる人もいようで心が痛いです。ガンにならない為の予防接種で10代の子供達が学校にも行けなくなるような副反応に苦しむのはかわいそうです。海外ではよく接種されている物だときました。なぜ日本では副反応がでてしまうのでしょうか？原因が分かるといいのですが…。
1512	何らかの利権関係があり、ワクチン接種が始まったのかもしれませんが安全性は確立されていたのでしょうか？●の知り合い2人が体が不自由になり、若い一番良い時の健康を奪われました。許せません。一步まちがえば、うちの娘2人も同じようになっていたのです。こんな危険なワクチンは即刻禁止にして下さい。国の責任？市の責任？早く 不自由になってしまった子の救済を始めて下さい。母はネットの情報や、高い民間の薬に頼っています。動けなくなった●のお母さんにいろいろ話を聞いてやるせない気持ちでいっぱいです。早く救ってあげて下さい。治療を始めてあげて下さい。
1513	子宮頸がんワクチンをうったから生理不順になったとは思っていませんが、もしそのような可能性があるならワクチンをうったことをとてもこうかいしています。もっと情報を公開してほしいです。
1514	うちの子は運よく何ごともなく元気に過ごせているが、今も副反応に苦しんでいる子ども達は、本当に気の毒です。国の善意ある対応を望みます(医療費の無料化、将来的な援助)
1515	接種してから1年半がすぎ症状もほとんどなくなりましたが、これから先もずっと症状がでないとは言いきれないなか、とても不安です。接種前は、とても元気に毎日を過ごす普通の女の子でした。本当につらそうに毎日をすごすのを見てきました。本人は死んでしまいたいと言った事もあります。保護者の責任で注射しました。保護者の心の痛みもこれから先ずっときえないでしょう。
1516	知的障害があるのでいいと思い接種させた後に、いろいろな報道があったので正直とまどっています。
1517	子宮頸がんワクチンで、1回目2回目ではあまりの痛みに腕が上げられなくなりました。3回目では39℃以上の熱がでて体調不良になりました。
1518	3回目をうけたあと、サーバリックスをみつかう会社の黒いウワサや、副作用のでた女の子の話、効果に持続性が期待できないことがわかり、長女に対して申し訳ない気持ちでいっぱいです。接種すべきではなかった、と後悔しています。次女には接種していません。
1519	サーバリックスを1回目うった時はとてもうでがはれました。いつも、注射をうつとはれる子なので気にしませんでした。
1520	とても痛みがあり、注射した後も2～3日ほど痛みが続きました。いたみのあまり、腕が上がりませんでした。生活にも影響したので、もう二度とやりたくないです。
1521	今でも病院に通いながら専門学校に通っています。
1522	母子手帳を出すのがめんどうなので記入しませんが予防接種はすべて適正な時期に打ってあります。
1523	知り合いの女性が副作用でとても苦しんでいます。早く原因が究明され、治療法・治療薬が開発されることを心から願います。国が積極的な接種勧奨をしたことは事実なのだから、副反応・副作用のある方に国が手を差し伸べるのが当然だと思います。
1524	子宮頸がんワクチン接種の副作用かわかりませんが、高1から体調に様々な症状が出始め、病院で診てもらっても、「年齢特有の、気持からくるもの…」とか原因不明の診断がされるだけです。もしかしてワクチンが原因なのでは…と疑っていますが、どこに相談して良いのか分かりません。そういった情報をお願いします。よろしく願います。
1525	もし、このワクチンが原因で娘の体調不良の原因ならば、何とか助けてほしいです。普通の子供に戻ってほしい 体のいたみなどはないものの、明らかに体調が悪くなりました。原因が特定する事が思春期とも重なるため、どうしていいかわからないのです。
1526	テレビなどで副作用のニュースを見ると心配になってしまう。副反応は接種して何年後にでるとか聞いた不妊症になるとか聞いたのでくわしく知りたいです。
1527	子宮頸がんワクチンを娘が中2～中3時に打ちました。当時、自費だと5万ぐらいするものが名古屋市が無料にするという事でお得な感じがしたし、社会全体で受けた方がいいという風潮でした、ところが最近のニュースでは、重度の副反応が出た方が映像として流れ、怖くなってきました。子宮頸がんは若い時に性行為をしなければ防げるものです。定期接種ではなく任意にするべきだと思います。
1528	ワクチンを接種しました。副反応の事を知った時は、やはり、とても恐くなりました、接種しなければよかったと思いました。無事に何事もなく過ごしていますが、予防接種について、考えさせられました。よろしくおねがいします。
1529	子宮頸がん無料しん談してほしい。
1530	母親の意見として、他の予防接種より注射の後の腫れはひどかったと思います、また腫れがひくのも時間がかかり、ました、本人に大丈夫と聞くと「友達はもっと腫れている子もけっこういて痛いと言って」と答えました、接種後、不安に思いながら様子を見ていたのを記憶しています。
1531	保護者より 子宮けいがんワクチン接種後、注射したところかがかかなりひどくはれ、痛みがひどく当日は塾を休むほどでした。はれ、痛みは一週間続きました。

1532	接種を受けた時(1回)受けたうでが、痛く上がらなかった。一週間、ベッドから起き上がれなかった。(2週間ほど)普段のいたみとはあきらかに違う症状に、恐怖すら、感じました。症状は2週間ほど回ふくしましたが、2回目の接種は、受けませんでした。
1533	予防接種で副反応が出て後遺症で苦しんでいる方には救済措置をしてあげてほしいと思います。
1534	頸がんワクチン接種後、足のこむら返りのような症状は、3回目接種後の夏頃からはじまりました。当時はサーバリックスの副作用だとは思わなかったですが、異常なほどのふくらはぎの硬直は病院を3ヶ所受診しても原因不明といわれました。足より少し前くらいから頭痛がはじまりました。嘔吐するほどの激しい頭痛で髄膜炎を疑われ入院したこともありました。その後も頭痛が続き何件か受診し、漢方薬療法で嘔吐するほどではなくなりましたが、今でも疲れたり、天気の良い日は頭痛があります。
1535	注射後、うでが痛すぎて動かさない状態が2日間ぐらいあった。
1536	子宮頸ガンワクチン1回目接種時 当時の昼頃から首が固くなり動かしづらくなった。症状は2~3日程度で回復したが他の原因が見当たらず、接種の説明等にもあったので副反応ではないかと思われる。その他の症状は特になし。
1537	子宮けいがんワクチン3回目の接種後、微熱が出ました。
1538	副作用のことがとても心配です。現在、苦しんでいらっしゃる方が多数いらっしゃるのとこと、なぜ、このような事態になってしまったのか検証していただき、二度とこのようなことが起こらないように、対処していただきたいです。
1539	今のところ目立った症状は出ていませんがこの先も心配です。
1540	子宮頸がんワクチンは、他の予防接種よりも接種部位は2~3日痛みが続きましたがその後何事もなくおわりました。副作用が出る子は、多分痛みでショックになると思います。それだけ痛かったようです。痛み弱い子はなりやすいと思います。副作用で苦しめる子には気の毒と思いますが、接種できて良かったと思います。
1541	子宮頸がんワクチンを注射する病院によって、副作用が多かったり、痛みが極端に違っていたりするという話を周りできいたので、そういううわさが立たないようにしてほしいと思いました。
1542	副作用の報道を見て怖くなり2回でやめてしまったがよかったのかどうか今まで不安です。
1543	実際、身近に子どもの友人がこのワクチンによって車イス生活を送っています。苦しい病状を聞いています。しっかり、原因不明をしてもらい国からの補助金、必要以上に病院代などかかっている事と思います。援助を最後までして頂き彼女達の人生をムダにしないで下さい。姉も、この時期、自費で高いお金を出して接種しました。平成5年生まれ。他の自費払いで接種した人のアンケートもした方がよいのではないかと思います。
1544	うちの娘は子宮頸がんワクチン接種の際、他の注射より痛いからイヤだと言っていました、特に何事もなく、ふつうに生活しています。
1545	受けた後 しばらく筋肉痛(打った場所だけ)みたいになった。
1546	2回目のときに視界がまだらに暗くなり、のどがかわき、手足がしびれてきました。車いすでベットまではこぼれ、30分あんせいしたらなおりました。
1547	同級生の方で、やはり副作用で、長期で学校をお休みされている方が見えました、人ごととは思えません。健康で生まれて、接種のすすめに従って、しただけなのに、子供の人生が大きくかわってしまう。親としては、やりきれないと思います、自分は1回だけで終わらせたこと、紙一重で救われたような思いです。
1548	国のワクチン接種がはじまる前に急いで上の娘も接種しました。どちらも元気でホッとしております。幼稚園や小学校の母親方と話す機会が多いですが、うたないつもりの方が多いです。がん検診をこまめにする方向が良いそうです。
1549	今のところ目立った症状は出ていませんがこの先も心配です。
1550	質問4、ありは①子宮頸がん平成23年7月、8月、平成24年1月。④麻しん、風しん平成24年5月。⑦インフルエンザほとんど毎年です、まちがえてしまい見にくくなってしまいました。申し訳ありません。
1551	子宮頸がんワクチンを接種し、特に副作用、副反応が出なかったが、現在、そのワクチン接種が問題となり中止になった事実を考えると、もう少し、私自身も国も慎重になっても良かったのではないかと？！…と少し後かいもあります。親は、子供に対して、少しでも 良かれと思い接種しているのですから、、、それによって重々の副作用、副反応が出るのは、どうか？！と思います。
1552	もう少しアンケートを簡単にしてほしいです。
1553	注射が思ったより痛かった。また注射をした後、2、3日は注射をした周辺が痛かった。(注射をした周辺に人や、ものがぶつくと痛かった)上記以外の副作用はとくにでなかった。
1554	現時点で症状が出ていないが、今後がとても不安、時間が経ってから症状が出ることもあるのか。
1555	液が尋常でなく痛く、腫れ方もひどかったです。
1556	3回目の接種後に腕が激しく痛み、習い事を休んだ。
1557	回数を重ねる度に筋肉痛が強くなる様でした。
1558	子宮頸がんワクチンはアメリカで接種。
1559	副反応が心配で接種できません。
1560	その後、2回目の接種が未だですが、そのまま保留すべきかわからない。

1561	痛いけど、がまんして接種しました。
1562	副反応が出た場合、とても重くなってしまうようなので、とても接種を進める事はできない。
1563	子宮頸がんの接種は、とても痛く感じ、うった後 数日は腕をあげる動作等に支障がありました。
1564	子宮頸ガンの予防接種の副作用が心配で今回の予防接種は、未だうけていない。早く原因が何なのか？を調べてほしいです。
1565	せっかく高2生も接種できるということで接種した。その後の報道でおどろいた。接種後クラスでも痛くて体育の授業に出られないこともあった。だるい、ねむい、すぐ疲れたと言っている事は多く、ワクチンとの関係は不明、理由は、なまけていると親が思いこんでいるからだが、影響しているならかわいそうなことをした。
1566	子宮頸がんワクチンの副作用が出なくて良かった。こんな恐ろしいワクチンだとは思いませんでした。今後、予防接種は受けたくないです。
1567	治療薬や治療方法など、私たちのような軽度の症状を持つ患者に対しても救済措置を検討願いたい。また、実証が得られなかったからといって「終わったこと」にされるのはとても遺憾であるので、思考を停止せず何かしらのカタチちゃんとこのアンケートの結果をいかしてもらいたい。
1568	安心して接種できるものになってほしいです。
1569	2回目の注射の時1ヵ月くらい接種した所を痛がっていました、娘も副作用が強ければ…と思うと恐しいです。
1570	子宮頸癌ワクチン接種後、気を失った方がいらっしゃったようで、その病院では、接種後ベッドでしばらく休んでから帰宅させるようにされていました。
1571	接種してから身体が疲れやすくなった。副作用に問題があるのなら接種しなくなかった。
1572	もう少し副作用に慎重になって進めてほしかったです。もっと早い時点で副作用の情報がほしかったです。病院では痛みがあっても異常ではないと説明がありましたが周りの子達もかなり接種後痛みがあったと聞きました。予防接種でそんな痛みや腫れがある事もその頃から心配でした。接種させなければ良かったと思っています。重症の子が気の毒です。
1573	副反応の報道を知り、娘のために良かれとおもい接種したのに不安でなりません。みなさん同じおもいだとおもいます。1日も早く安心できるよう副反応から救っていただけるよう研究をお願いします。副反応で苦しんでいる方を助けて下さい。いつ自分の娘にも出るかもしれないと思うと不安でなりません。娘にこのアンケートを記入してもらおうにあたり、不安にさせないように親としてどうすべきなのか、不安でしかたありません。そもそもこのワクチンそのものも不安でなりません。副反応以前にもう1度安全性を説明していただき、安心させて下さい。
1574	質問2回答に書いた症状はワクチンとは関係ないかもしれませんが。しかし、このワクチンによりあまりにも多様な症状が出るとするなら、もしかするとこの症状は、と思われる方も多いと思います、わからないまま抱えこんだまま終わってしまわないよう調査及び症例研究を続けていただけるとよいと思います。
1575	もし、副反応についてももっと早く報じられていれば接種をひかえる事ができたのに…0%なんてないことはわかっていますが、これほど重大なものも多いワクチンがすすめられたのはなぜなのでしょう か？
1576	子宮頸がんワクチンを接種したあとは3回とも1週間ぐらいうでが上がりませんでした。その後は、なおりました。
1577	注射後、腕がとても痛くて、にもつがもてなくなりました。副作用がより軽減されてほしいと思います。
1578	接種がギリギリになり、医者や看護師さんからしっかり嫌味を言われた。もっと安全性をしっかり確立してから実施に踏み切ってください。今でも、副反応がでたらと思うと背筋が凍る思いです。
1579	難しい問題ですが、私は接種を受けさせて良かったと思っています。
1580	3回目のサーバリックスのワクチンを打った後、39度5分以上の高熱で3日ほどねこみました。インフルエンザではなく、病院ではカゼといわれましたが、熱以外の症状はいっさいなくワクチンを打つ前は正常でした。
1581	痛かったです。1回目の接種の時には「気分が悪くなるかもしれない」などの情報がなかったにもかかわらず、2回目以降はピラがくばられたりなどしたのは、どうかと思います。そういったテストをきちんとしてから人々に接種するべきではないか。受ける身としては怖いし、信頼できません。
1582	子宮頸がんワクチンを3回受けましたが、身体に異常は起きてないです。怖いことが、将来的におきることは受けたくないです。
1583	筋肉注射で注射した後に注射部をもんではいけないと聞いていましたが、受診したクリニックではもまれたのでちょっとしたことなのですが気になっていました。そこのあたりどうだったのでしょうか。
1584	子宮頸がんワクチンは、通知の指示のとおり、接種しましたが、後になって、副作用の後遺症の事を知り、たいへん驚きました。接種する前にもっとはやく、副作用のことを詳しく正確に通知して、ほしかったと思います。
1585	この度、ワクチンを接種され、症状が出られた方々に心より御見舞申し上げます。娘と同じ年頃の方々だと思つと心が痛みます。本当に悲しく思います。一日も早い御回復を心より願っております。国や行政の皆様には、一日も早い原因究明をお願い申し上げます。保護者より
1586	注射を打った周り(腕)が少し腫れました。

1587	副作用がでた方に国がちゃんと医療費を払ってあげて下さい！
1588	娘には影響がなかったのですが、アンケートの結果を元に、未来の女の子たちにとってもより良いワクチンができることを祈りつつ、そのことにたずさわって下さる方々に感謝しています。大変なお仕事と思いますが、命や、人、一人一人の人生に関わる大切な調査かと思しますのでご尽力頂けることを希望します。
1589	現在は大丈夫でも、将来、発症しないともかぎらない。とても不安です。妊娠、出産に影響はでないのか、それをきっかけに体に異常がおこらないのか、不安です。不安です。打たせなければよかったです。だれもたすけてはくれないのですから。母親として、娘に打つといたら“ただだから”と言って、一生をだめにしたのなら、どうとりもどせばよいのでしょうか？教えてください。
1590	不眠、抑うつ状態が初回接種から1年、(最終接種から3ヶ月)後より、おきている。精神科でカウンセリングを受け、高校を通信制にかわって改善しているが、まだ完治はしておらず、ワクチンとの関連はこれまで考えていなかったが、問診表を見ると、関連があるのかどうか心配。普通のクリニックでは通りいっぺんの答えしか得られずどこにかかればいいのか不安。
1591	ワクチン接種(サーバリックス)は、CMで推奨され、友人母同士でも、打った方が良い等と会話になり、打つことが当たり前みたいな風潮だった。今後年をとって副作用がでることがあるのか心配。
1592	子宮頸がんのワクチンを接種してから10年後くらいに副作用がでないか不安です。
1593	子宮頸がんワクチン補助がでてすぐに打ちました。今まで異状ありません。
1594	子宮頸がんワクチンを接種して、2、3日は痛みがあったみたいが、特にはれたりすることはなかった。
1595	めだった副作用はないですが、将来、子供が産めない体になってしまったんじゃないか心配です。
1596	子宮頸がんワクチンは他の予防接種よりも一番痛かったそうです。副反応も腕が赤く腫れて、1週間以上は直りませんでした。重い副反応が出なくてよかったです。
1597	本来ならば、女性として大切である子宮を守るために、開発されたであろうワクチンによってこれからの未来を生きていく少女たちが苦しんでいる現実に関心を痛めています。同じ女性として、母親として、怒りがこみあげます。このアンケートが原因究明の一端を担うことを願い提出します。
1598	当前、身体に危険のないよう十分な調査、研究をされた上で、接種の推奨を行政がしていると信じて接種させましたので、今回の様な後手になった形での調査、非常に残念に思います。
1599	娘には、副反応がでなかったのですが、本当にホッとしましたが、2回接種を早めにしたところでの、テレビ等の報道で、大変びっくりしました。そんなことは、2度とない様に、お願いします。
1600	ワクチンを接種後、帯状疱疹がでて、(顔、体)1週間点滴に通い、学校を休まざるを得なくなったため、3回目接種は様々な副反応をTVで見る事が多く、やめてしまった。後遺症で片方のみ頭痛がひどい。
1601	「接種年齢に制限があるが、特例措置で期限内なら接種可能である。」とのことで、子どもに接種させました。その後、様々な副作用の症状の報告が相次ぎ、怖い思いをしました。親としては、将来のリスクに備えたつもりなのですが、今となっては「これで良かったのか」と思うこともあります。幸い、子どもには何の症状もなく、元気に生活していることが、救いだ実感しています。
1602	子宮頸ガンワクチン接種後、ひどく痛がる娘を病院の先生の言いなりに2回目、3回目を接種させました。今、思えば娘のためと思いながらひどいことをしたと思います。後遺症で苦しむ同じ年頃の娘さんのことを思うと早く原因究明して解決してほしいと思います。
1603	今まで、数種類のワクチンを接種してきましたが、子宮頸ガンワクチン接種後、娘はいつまでも注射のあとを痛がっていました。通常のワクチンと何か違うと感じました。
1604	接種した後、はれて、痛みがあった。4、5日ではれは、ひいて、痛みもおさまった。
1605	子宮頸がんが今後接種可になったとしてもさせることは絶対ありません。
1606	副作用のことは気にせず無料だからと接種しました 副作用の報道を見てから 娘に副作用がでなくて本当によかったとホッとしました。
1607	現在、●病院の総合診療科で「慢性疲労症候群」と診断されています、症状の出た時期から、ワクチンとの因果関係が深く考えられるとのことです、3/4くらい横になっており、親子でとても苦しいです。
1608	副作用がある方には、医療保証、追跡調査を最期までしてほしい。子宮頸がんワクチンを認めた責任だ。症状の程度により、副作用のある方へ一生経済支援すべき。
1609	アンケート提出へのうながしのハガキもいただきましたが、それに代えて、提出した人への御礼状にすると良いと思います。確実に返送してもらうために●などを返送後受けとるなどにすると返送する人も増えるかと思いました。
1610	子宮頸がんは3回受けないと意味がないのか。今からうつことができるのか、もううつのはやめた方がよいのか。
1611	報道を見て、心配になり、途中でうつのをやめたので、少しでも効果があるのか不安。
1612	副作用の確認をしっかりと(安全を!)検証した上で、接種を奨励してほしい。
1613	因果関係がわからないのではっきりとは言えませんが、子宮頸がん予防ワクチンの1回目を接種したすぐ後に脱毛が始まり、今も全頭脱毛のまま毎日ウィックを着けて生活しています。

1614	重度の知的障害とてんかん発作があります。現在21才です。当時、高校2年生まで受けることが可能ということで、主治医ともよく相談し思い切って接種を受けました。副作用が問題になっていますが、言葉の話せない子なので異変に気がつくのが遅れてしまいます。接種を受けてから数年経ちますが、大丈夫なんでしょうか？もし接種する前に報道を見ていたら、受けなかったと思います。(障害のある方や体の弱い方などは、受けない方が良くもありませんね)健常者むけのアンケートなので質問に答えられないです。障害のある方が接種した場合、もう少し細かくまたアフターケアも必要かとおもいます。
1615	子宮頸がんのワクチンを接種した後、頭痛、発熱、吐き気、食欲不振、起き上がれない、腕が上がらない、全身だるい痛い！！などの症状が出た。回数を重ねるごとにひどくなり、3回目の接種の後翌日は38度を越える熱が出て、もしそれが平日だったら学校を欠席していたと思う。かかりつけの先生に、連絡して、指示を仰ぎました。
1616	サーバリックス1回目接種直後に医院にて、貧血、失神、その後 その他、何も症状がなく、健康にて現在にいたります。接種時、疲れていた。以上。
1617	不妊の可能性のあるワクチンを国が推奨した罪は大きいと思います、予防接種のエビデンスもあいまいな為、今後は、自ら、調べてから、行動したいと思います。
1618	1回目の接種時、注射がとても痛く、発熱、頭痛の症状がありました。接種を受けた医院を受診しましたが、副作用ではないと言われました。しかし、本人は、報道が出る前から、あれは副作用だったと言っていました、2回目の接種時には、その様な症状はありませんでした。現在、副反応と思われる症状に苦しんでおられる方の報道を目にすると、娘は、軽い副反応でおさまったものの、続けて接種したことは良い判断だったのかと考えます。決して他人事ではありません！！
1619	“インフルエンザワクチン”をうつと毎年うった腕の方の脇下に結構大きめのしこりができます。1ヶ月位たつとなくなりますが…今回の質問事項には関係ないと思いますが、お知らせさせていただきま す。本人海外留学のため、親の覚えている範囲で書かせていただきました。
1620	接種した後、他のワクチンの時より痛みを感じ3回とも赤くはれた。
1621	妊娠、出産に今後、成人するにあたり影響がないか、心配。
1622	報道の前に2回接種していました。3回目をどうしようかすごく悩みました。かかりつけの病院の先生に相談をし3回目の接種を決めました。自分の娘が、...と思うと私ひとりで決められずにいたからです。私自身が検査で異常があったばかりだったので娘には同じ思いをさせたくないでワクチンを喜んだのも事実です。
1623	3回目の子宮頸がんワクチンをうった1週間後、手足にぶつぶつができパンパンにはれあがり、医者へ行きました。飲み薬、塗り薬を処方されましたが、なかなか治らず、医者かえても薬をかえても治らず、1ヵ月足のはれはひきませんでした。結局、病名はわからずじまいで、1ヵ月半でやっと完治？しました。ワクチンの副作用では？と今頃思います。もっと早く気付いていれば、1ヵ月もの間、●を服用することもなかったのにと後悔です。●服用にとっても抵抗がありましたが、その時はどうしようもなく服用しました。今でもあの時の薬の副作用が心配で仕方ありません。
1624	子宮頸がんワクチンは、個人的には接種した方が良いと思うのですが、子どもに接種させようとする と、周囲の人に反対されてしまいます。どんな予防接種にも副作用はあるので、早く接種勧奨してもら えることを望んでいます。下の子にも受けさせたいです。
1625	もし、副作用があるかもしれないということだったら、予防注射はやめていました。もっとよく研究してから認可すべきだと思います。(私の場合は副作用は、ありませんでしたが…)
1626	子宮頸がんのワクチン接種で副反応がでている方々をテレビで見るととてもこわくなりました。たまたま 何もなかったから良かったですが、接種後ははれ上がってすごく痛かった様ですし、本当に何もなくて 良かった、(副反応のあった方々には申し分けないですが)もう少し状況をみてから接種すべきでし た。姉がいますがまず無料接種という事で妹が受けましたが姉には受けさせるつもりは今はないで す。接種しても一生効果があるというわけではないと後から知り、自分の不勉強も反省しました。
1627	12年11月頃に打ったインフルエンザワクチンで、接種部が赤くはれて熱を持った。
1628	無料で子宮けいがんワクチンを受けられる期限が決まっていたので忘れないようにと思い急いで受 けに行った記憶がありましたがその後に副作用のニュースを見、聞きする機会があり、もっと慎重にす るべきだと思いました。
1629	予防接種を受けた直後は、体に異常はあらわれなかったのですが、この後、数年、数字十年後にワク チンの影響が何か体に問題があらわれなにか心配です。無料で接種を受けられて、国が法律により 実施したもので安心して接種をしました、今となっては娘の将来が不安です。きちんと原因究明 してほしいです。
1630	効果があるということで子宮頸がんの予防接種を子供にすすめ、1回目を打ったところで副作用が重 篤になる場合があるとの報道に子供が不安がるためやめました。今後どうすればいいのかきちんと説 明して欲しいです。
1631	今更おそいと思います。

1632	ニュース等で娘と同じ年頃の方が副作用で苦しまれてる様子を見てとても辛く、もしかして娘も同じように副作用が出ていたらと考えると胸が痛いです。もし、もう一人 下に娘がいても絶対に接種はしたくありません。どうぞ、副作用で苦しんでいる方達を全力で助けてあたり前の普通の生活ができるようにしてあげて下さい。
1633	サーバリックスを接種後腕が相当に腫れ、発熱も有りまして、本人は相当辛い思いをしました。
1634	なかば強制的に指導されて、親として 良かれ思い接種させたものが後から問題があったといわれたことに国の無責任さと医療に対する不信感が強くなりました。
1635	2回痛く辛い思いをしたにもかかわらず、十分な予防策を得られず、受けさせたことも後悔している。2回目から1年以上たっても接種し、効果はあるのか疑問。保ゴ者より
1636	一種類のウイルスにしか効果がないと後に知り、そんなことなら接種させなければよかったという気持ちでいっぱいです。まるで実験ですね。その材料に娘を使ってしまった。と反省です。報道で、生活に障害がでた娘さんを見て、人ごとではない、と思いました。ワクチンの開発にお金がかかることはわかりますが、だからといって、安全でないものは、認めてはいけません。予防なのか何なのかわかりません。それなら、定期検査を勧めたらどうですか。娘はとてもガマン強い子で、大丈夫といっていました。とても心配でしたし、これからも心配です。病院側も、痛いから、とソファに座らせてくれ接種しました。痛みで倒れた例があったそうです。本当に接種を後悔しています。タダより怖いものはない。このような形で意見が言えてよかったです。
1637	何かあった場合の補償はどうなるのでしょうか？大切な体を簡単に済まさないでほしいです。不信感が強まり、将来に対する不安を感じています。
1638	接種をやめる程ではなかったが、注射がとても痛かった。とくに1回目は接種後数日間、痛みで腕が上がらず、勉強の際、ペンを持つ手に力が入らなかった。
1639	子宮頸がんワクチンは相当痛かったと言っていました。
1640	接種する時もいろいろと副反応の話を聞いてとまどいました。たまたま何もなく2回接種する事ができたけど、こわくて3回目は止めてしまいました。(痛みもあった様なので)
1641	月経に関しては、年齢が上がるにつれてひどくなっていっています。今後がとても心配です。子どもを産むときに影響が出ないことを願っています。
1642	ワクチン接種後は腕が重くて肩より上に腕が上がらなかった。当時、同級生も同じような症状が出ていた者が多数。
1643	注射後、背中にニキビやカビが出来るようになった。
1644	注射後の痛みしこりが3ヶ月～半年つづき、とても心配だった。
1645	副作用として書いていいのかわかりませんが射ったあと2日間ほど筋肉痛のようないたみがありました。
1646	●生まれの娘は、中学3年の時、平成24年秋頃に子宮頸ガンワクチン接種しました。事前に先に打った友達から「腕がすごく痛くなるよ」と聞いていて、こわがりの娘は、尻ごみしていましたが、当時のかかりつけの内科医師の方が、「国が提唱して、高額なワクチンを無料で接種できるので、あなたの将来のためよいと思いますよ」と好意的な説明をたくさん事前にしていて、娘は安心・信頼して接種しました。しかし、翌年には、娘より1才下の女の子がワクチン接種で下半身マヒに. . .とても信じられませんでした。わが子が…と思ったら、絶望の何ものでもないと思うと心が痛みます。ぜひしっかりと指導してもらいたいです。
1647	こちらの理解不足もあったが、子宮頸がんワクチンを病院の指示で1ヶ月の間隔で3回接種されていた。気がついたのは接種が3回とも終わったあとだった。今のところ娘に異常な反応は出ていないようですが、心配です。
1648	子宮頸がんワクチンを接種して以降、生理が止まってしまいました。ワクチンの影響なのか、はっきりとわからないため、ずっと悩んでおりました。同じ症状のある方が他にもおられるなら、知らせていただきたいです。
1649	子宮頸がん接種後、かなり腕がはれ、翌日は体育ができず、見学をさせました。他のお子さんも、そのような話をききました。
1650	3回目のワクチンを接種した時、うでが上がらないと言っていたので心配しましたが、2～3日でおさまりました。
1651	本当にワクチンを接種した事で、体に異常が出て、もしこのまま治る事も無く将来が奪われた子がいるのだとしたら、もし自分がそんな事になったら本当に許せません。この先この不安を抱えながら生きて行かなければならないのでしょうか。この予防接種が薬品会社や国の人体実験で無い事をいのります
1652	子宮頸がんワクチンによる副作用は全くなかったです。ただ注射をうったときの痛みは長くつづいてました。
1653	子宮頸がんワクチンは打ってからしばらく打った方の手が思うように動かなくなるという友達が多数いた。自分の子も！親や子どもたちの間では、試験前や部活の試合前、学校行事の前1ヵ月は打たない方がいいと言われていた。他の予防接種に比べ、かなり痛いし、その後副作用も大変と多数の子が言っていた。安全性や子どもへの負担がないようにしてから実施して欲しい。

1654	副反応に苦しむ方を拝見すると 大変お気の毒で、一日も、早く元の体にもどっていただきたいと願っています。いまのところ娘の体には副反応は出ていませんが将来どんな影響があるかわかりません。ワクチンを接種する以外に定期検診の必要性や女性特有の病についての教育をもっとしたほうが良いとおもいます。
1655	娘はガーダシルを接種しましたが、特に副作用もなく、むしろ、子宮頸がんのリスクを減らせたことで、安心しています。副作用のみについてだけでなく、効果についても広く公表し情報を開示して頂きたいとおもいます。(母筆)
1656	1回目に接種したとき、気分が悪くなった。腕が上げられなかった。2、3回目は異常はなかった。
1657	軽いものから重いもの全ての副作用なのか原因を早く調べて治療の方法を見つけてほしいです。⑭が気になり、最終接種時と発症がほぼ同時期なので副作用ではと心配しています。
1658	緑内障の疑いがワクチン接種後に判明し、視野等に関してもいわれたのですが、子宮頸がんのワクチン接種関係ありますか？
1659	アンケートを送付するなら、なぜもっと早く送付しない。接種してから、かなり経過していて、わからない。
1660	特に問題なく普通に生活しております。ただ異常に長く寝る、風呂の中で朝まで寝るようになったのはワクチン接種と関係あるのでしょうか。
1661	娘の同級生2人の方が同ワクチンの副作用と思われる症状に苦しんでいらっしゃいます。1人の方は症状が重く、大学受験を見送られました。1日も早い原因の究明と治療法の確立、御回復を祈るばかりです。
1662	予防のためと思い娘に接種を勧めましたが、大変トラブルが多く、生理がなくなってしまったこともあり(現在はあります)接種を後悔しております。将来、子どもができにくくなる、子どもができなくなる産まれた子どもに影響があるのかも、という心配でいっぱいです。今現在の後遺症もですが、将来のお産、又は産まれてくる赤ちゃんへの影響に関しては、かならずはっきり情報をお伝えいただきたいとおもいます。
1663	1回目接種後ほとにかく痛み、翌日の体育は欠席した。かわいそうなほど痛がっていた。2回目接種後の夜、高熱がでて大変怖い思いをし、心配した。あちこちの医療機関に電話をするなどし副反応の報道を思い出し、もう2度と接種させたくないと思った。
1664	今まで、何の大病もなく生きてきたのに、突然に、このようになり、納得いきません。はっきりと原因をつきとめてほしいとねがいます。よかれと思注射を受つ決心したのに、このようになり、何ともくやしい思いでいっぱいです。
1665	1回目、2回目接種後1年半の間は特に副反応は出ていませんでした。3回目接種時、赤くはれて痛がったので少し心配しましたが、病院に相談するが特に心配ないと言われました。しかし、半年後色々な症状が出はじめています。！！
1666	ワクチン接種してからは生理痛があり、薬を飲むようになりましたが、何か関係があるのでしょうか？
1667	遅くなってすみません。「現時点では唯一予防できるがん。」と、大きく報じられていた記憶があります。外国での10年程の接種後の経過観察もありますとの記事も新聞で読みました、たしかに、にわかに入ったワクチンの情報でしたが、他のワクチンと同様に、大きな病を避けられるなら、親として接種させなくてはならないと思いました。国や市が民に全体に提唱するものは、十分な裏付けを取った上でのごとだろうと、信頼しました。不調の出た方とそこご家族も、接種時のお気持ちは、同様だったのではないかと思います、でも、問題が出てきた以上、これからが大切だと思います。追跡調査や不調の方の支援は大変だと思いますが、求めます。
1668	副作用に対して、親として、大丈夫かなと半信半疑でしたので、今、ワクチンを打たせた事後悔しています。この先何かの症状が出たら、娘の将来はどうなるのか大変心配しています。いつ、我が子が、体調が崩れるか分からない生活を送っています。報道は、いつも何か問題がおきてからです。自分の身は自分で守るしかありません。
1669	子宮頸ガンワクチン接種後3年経過し今の所何も症状(変化)がないのですが今後何らかの症状が出る事もあるんですか？
1670	子宮頸がんワクチンは1回目は非常に痛かったようで、気分が悪くなり、ベッドでしばらく寝させてもらいましたが、2回目はそれほど痛みはなく、3回目は全く痛くなかったようです、いろいろ副作用の報道がなされる前でしたので、3回受けました。それにしても、名古屋(愛知県)は子宮頸ガンワクチンをどうして産婦人科でしか受けられなかった(ない)のですか？私達夫婦は●出身ですが、仕事のため、●に7年程住んでいました。頭が固いというか、何でもそういう点で遅れている●は子供が小学校で教育を受けると、そういう事がよくわかります、●に久し振りに引越して小学校に入学したら、軍隊養生所のように感じました。●の友人に聞きましたら子宮頸がんワクチンは何科でも受けられるということでした。名古屋の友人達は産婦人科に中学生の娘を連れて行くのは嫌だとみんな言うていました。そんなこと想像できないのでしょうか？文化不毛で、ブルーカラーの、軍隊養生所のような●はうんざり。

1671	3回接種した後に副反応の報道があり、しばらくはなにかあるのではないかと心配していました。あの頃は大々的に接種を勧めるCM等があり、お金がかかる前に受けなければ。と急いで接種させました。同世代の娘を持つ者として、障害のでたお子さん、親御さんがお気の毒でなりません。その方々のために早く原因が究明され、症状が回復されること、また、適正な補償が受けられることを望みます
1672	次女に子宮頸ガンの予防接種を受けさせるか決めかねている
1673	なぜこのワクチンが定期接種になったのでしょうか、効果が見込めず副作用の危険性が高にもかわらず。その認可が降りた経過が知りたいです、公表をお願いします。
1674	どんな予防接種(定期でも任意でも)でも、受けないデメリット(副作用)をもっとくわしく説明すべきです。
1675	1回目の接種直後にめまい、気分が悪くなり病院からでたところふらつき車に接触しケガをした、(後方から走行してきた自動車にはねられた、運転主によると「フラフラして道路にとびだしてきた」とのこと)
1676	1回目の接種でうでにしびれ・だるさ・うでが上がるなどの症状があり、心配になり2回目を受けませんでした、症状は、4日目以降、回復しはじめた。現在は問題なく生活している。注射がとても痛かった。
1677	対応が遅い。何年もたっている。今度 何年、何十年後に何かあったら責任をとってくれるのか？子どもがうめなくなったらどうするのか？調査票 わかりにくい、書きにくい。だから回答率が悪いんじゃないか？今後、引越したらいろいろどうなるのか？
1678	頸ガンワクチンを3回打ちました。3回ともに接種した数日後からしばらく吐き気と食欲減退の副反応があり、吐き気止めの点滴をしました。
1679	副作用の出た方の救済を、きちんとして下さい
1680	めまい、吐き気、耳鳴り、頭痛が同時におこったので、休んだ。
1681	3回目は報道が怖くなったのでやめました。2回だけでも効果があるのか知りたい。
1682	子宮頸癌のワクチンを普通に受けると、6万以上お金がかかったと思いますが、市長は早々に補助していただき 負担金がなかったと思います。副作用が出た方もみえますが 私個人は 市長の早急な予防接種の補助には大変感謝しています。産婦人科の医師からはワクチン接種は有効だと云われています。
1683	アンケートはパソコンスマートホンで回答できるようにした方がたくさんの回答が集まったと思います。
1684	中学に入学してから毎年のように学校からの配布物として(子宮頸がんワクチン)接種を勧めるレターをもらってきていたように思います。その時は副作用の件はあまりとりざたされておらず、(忘れないうちに早く接種を!)という考えから受けていたと思います。接種後(3回目)にTVなどで大きく(副作用)について報道されました。親としては学校からの連絡は絶対的なものと思いがちなので、行政の指導、指示の仕方に問題ありと思っています!
1685	友人のお子様は子宮頸がんワクチンを打ったらめまいがひどくて学校を1週間休んだそうで、その時に今まで予防注射を打ってこんな症状が出た事がなかったので、すぐに●保健所に電話したそうですが、全然問題にせず、その時体調が悪かったのでは?で済ませられそうです。今のように大問題になる少し前です。その時、ちゃんと報告事例として取り上げて下さることをなせしてくれなかったのか疑問です。その時に危ないんじゃないかと私達の間では話題になっていました。
1686	色々な事があるみたいなので、今は接種するのが恐ろしい気持ちです。ただ、頑張って2度打った娘のことを思うとムダだったのかと思います。2回打ったのは完全にムダだったのか、少しでも効果があるのか知りたいです。誰も教えてくれません。そこもお知らせしてほしいです。
1687	接種後手や足の痛みがありました。
1688	子宮頸がんワクチンは、とにかく痛みが強く、腕を動かす事が1週間程出来なかったと記憶しています。日本脳炎ワクチンについては、よくわからなかったので全部書いておきました。
1689	サーバックス接種後、はれがひどく肩が上がりにくいなどの症状はあった。他のワクチンに比べて、明らかに副反応は強く継続期間も長かった。現在日常生活に支障のある後遺症は出ていないが、報道されているような症状の出ている子供達がふびんで仕方ない。なんとか、助けてあげてほしい。
1690	特に子宮頸がんワクチンの副作用は、打った翌日、腫れたり、腕が上がりにくい以外の症状はなかったです。
1691	副反応はどの予防接種にもつきものですが、今回のワクチンの副反応は予想以上のものでした。打つ前に報道を見ていたらもちろん接種することはなかったと思います。今、苦しんでいる人達に行政・国の治療に対する救済の急務を願っています。
1692	2回の接種では効果がないのか、あるのか教えてほしい。
1693	日本脳炎の第3期をうけていません。接種の用紙もないのですが、どうしたらいいのでしょうか。未接種の人へ再度用紙を送って下さるとありがたいです。
1694	子宮頸がんワクチンは、とても痛みが強く、腕を動かす事が1週間出来なかったと記憶しています。日本脳炎ワクチンについては、よくわからなかったので 全部書いておきました。
1695	子宮頸がんワクチン接種しましたが、まったく異常なかったです。

1696	他のワクチンと同じ様な感覚で受けたが副作用の事例が明らかになり受けたことをとても後悔している。下の子は途中接種をやめました。
1697	現在は副反応は出ていないが、何年か経過してから副反応が出ることもあるのか？また、出た事例はあるのか？という情報を知りたいです。
1698	接種部位の腫れがありました。
1699	あんなに恐ろしい副作用があるものを先に知っていたら打たせなかったかもしれません、本当にお気の毒です。(母)
1700	子宮頸がんワクチンを中学生になるのを待ちに待って打ちましたがそれからしばらくして、ワクチンを打たれた方がいろんな症状が出ていると知り打ったことをものすごく後悔しました。今だに報道を見聞きするたびにぞっとします。もっと早く報道してくれていたらと思うほどです。症状の出ている方が回復されることを心から願います。
1701	現在副作用が残っている状態です。注射あとに、しこりができ、今度オペで除きます、ありえません。手術あとも残りますし、本当、どうしても良い予防接種をいい加減にして下さい！
1702	時々、生理が来なくて不順です。子宮頸がんワクチンとの関係は大丈夫でしょうか。次女は新聞で記事が載ってから、不安になり、まだ接種してません。女の子なので将来、出産もあるでしょうし、安全なワクチンであってほしいです。
1703	質問5の子宮頸がんのワクチンの種類はわかりませんが、ロット番号(1回目)はAHPVA143CAでした。質問4の③ですが、3種混合を1期、2期と計4回接種済です。
1704	子宮頸がんのワクチンを使用した前後で、自分の身体の変化に気づけていないことがあると思います。貧血っぽい症状が多少ありましたが(めまい、ふらつき)これが子宮頸がんのせいかは私自身わかっていません。このように自覚症状がない人はたくさんいると思います。
1705	日本での接種の前から海外では副作用が多く問題になっているという記事を●新聞で読んでいたので、親としては接種を見合わせるつもりでした。が子の方が周りの友達が接種してるのを知り、皆に合わせる様に接種しました。そもそも危険性の高いワクチンを公費補助するなんて製薬会社と一部政治家が癒着していたのではとかんぐってしまいますし、その報道を事前にしなかった大手マスコミにも責任はあるとおもいます。薬害として、行政で副反応の方には補償してあげてほしいです。
1706	何の症状もなく元気に過ごしております。
1707	ワクチン接種後、うでが痛くてあがらなかった。クリニックにTel(その後受診)にて問い合わせ様子みとなって1W程で治りました。
1708	ワクチンを打って腕があがらず部活(弓道部だったため)に一部影響はでたものの、同級生の女子はみんなそうだったため特に困らなかった。それ以外の症状は何もおきなかった。
1709	娘は子宮頸がん接種の時に日本脳炎(第二期)も同時に接種しました。先生に中学生な忙しいからとすすめられたとはいえ、今となってはとても恐ろしいことをしたとも思っております。接種後の夜は発熱、次の日も熱は下がらずでした。娘にとっては中学生生活でこの1日だけ休んでしまい、とてもくやんでおりました。
1710	安全がどうか不明確なため3回目は接種がこわくて出来ません。
1711	3回接種しました。色々な報道があり、周りには止める子もいましたが、3回接種しないと効果がないかと思い、思い切って接種させました。ありがたい事に娘には副作用はありませんでした、まだ下に妹がいるので、因果関係があるなら 早く結論が出ることを期待しています。
1712	娘が中一になった頃、国の推奨も有り、早い方が良いと思い接種させました、現在、娘に異常は有りませんが同じ学校の娘さんには報道されている症状が出ています。娘が接種する頃には報道も無く、お友達を誘って接種した次第です。1~2年程、経過した頃に副作用で苦しんでいるお母さんと知り合い、愕然としました。子供を育てていくうえで予防接種は必ず関わってきます。副作用のことも考えて親は接種を決断するのです。それなのに今回の様に曖昧な対応しか出来ない状況ならば子宮頸がんワクチンは、推めるべきではないと思います、自分の子が大丈夫だったからと思う親ばかりでは有りません、もっと慎重に考えて欲しいです。
1713	子宮頸がんワクチンの接種を推進していたためさっそくお金を払って接種したが、その次の年から無料で受けられるようになったため、損した気分だった。
1714	今回、私達の子供には副作用と思われることが起きなかっただけで、もしかしたら自分の子供が何かの副作用が出ていたら…と思うといたたまれません。もっと、人の命の重さを十分に考えて本当に安全なものだけをご提供いただきたいと思えます。でないとい何を信じていいのか、わかりません。
1715	接種後1週間くらい接種した腕を痛がりました。
1716	●でH22頃、子宮頸がん予防接種の大切さを聞き、姉はワクチンを全3回接種しました。ただ、その時、このワクチンの効果が確認されている期間は最新データで約8年との話でした。そこに疑問があったものの、娘の健康を考え、接種しました。しかし、TV、新聞の報道で何人かの副反応を知り、妹の時は、第2回目接種した後でしたが、3回目は接種しませんでした。
1717	副作用が問題になる前だったので、何の疑いもなく、子宮頸がんを受けました。何もなくてよかったです。

1718	対応が遅い。事前にどのくらいのリスクがどのくらいの可能性をもっているのか教えてほしかったです。ただ「副作用や後遺症が残る可能性もあるから同意書にサインしてください」だけじゃあとから後悔します。書いた自分も事前によく調べなかったのも全部自分が悪かったと思っています。
1719	奥深くにさす感じで普段より痛かったです。
1720	痛かったです。
1721	注しやそのもの自体は、普通のインフルエンザなどの予防接種と違い、かなり痛くて、2～3日、痛みがひかなかったようです。
1722	ワクチンの安全性をもっと確かめてからにしてほしい。まじめに接種をして、TVを見てがくぜんとした。健康に生まれてきているのに、予防接種で歩くのもままならないお子さんもいるのを見て1回目以降うけていない。保障とかあるのですか！？
1723	ガーダシルを接種して、2日間ぐらいは、腕の力がぬけた感じや、だるいと言っていました。
1724	子宮頸がんワクチンはアメリカで接種したのでよくわかりません。(小学校6年生時)
1725	腰に痛みがでた時期と、子宮頸がん予防接種の副反応が出た事例が発生した時期が同じような時期で不安です。何か症状がでた場合はどのような病院に行き、どのように説明したらよいのか教えて頂けたらと思います。
1726	無事です。安心して下さい。
1727	接種後、ひどく腫れました。痛みも強く出ていました。筋肉痛に似た痛みの様子でした。一週間～10日程で、痛みも腫れもおさまりました。
1728	子宮頸がんワクチン接種後、2日後発熱、インフルエンザBにかかってしまう。副作用かもと不安になった。症状が重くなる事を心配していましたが、大事にはいたらず、2、3回目接種できました。副作用が大きなニュースになり、恐怖感を感じたのを今も覚えています。痛みは強かったようです。
1729	やけに痛かった記憶がある。
1730	幸いわが子には、子宮頸がんワクチンを接種した事による副作用はありませんでした。本人はニュースを見て、びっくりしていました。学校にも行けなくなってしまう程の痛みでしょうか。とてもかわいそうですね。1日も早く普通の生活が送れる様に治る事を祈ってます。
1731	わが子には、子宮頸がんワクチンを接種したことによって、困った事は全くありませんでした。ニュースを見て、びっくりしてしまいました。せめて日常生活は支障なく過ごせるくらい、治るといいと思います。
1732	接種した翌日は腕が痛くてあがりずらかった。大体2～3日くらい。
1733	子宮頸がんワクチンを高1の1月から3回受けました。1回目の副反応が腕が腫れて痛かったが、2回目、3回目はさほど痛みも無かった。他には何の反応も無く、現在も元気である。
1734	体調の悪い事があり、内科で検査をしたところ鉄分欠乏症であるとわかり、2、3ヶ月前から鉄剤を飲んで治療中である。
1735	子宮頸がんワクチン痛かったですけど特に後遺症もなく、むしろ打って良かったと思っています。
1736	右手接種した翌日に手が痛かった。
1737	子宮頸がんのワクチン1回目投与した翌日、学校で歩けない程の腹痛を訴え、嘔吐しました。2度目、3度目の接種をためらいましたが、内科から産婦人科に病院を変え、接種しましたが、2回目以降は異常はみられず、大丈夫でした。
1738	私が打たせてしまい、後悔してもしきれない。この子宮頸がんワクチンには、娘の人生を狂わされました。そして、これ以上、苦しい思いをする方がいらっしゃるのが現実です。因果関係が、はっきり解明され、辛い日々から救済される方々が笑顔になれるのを願っています。乱筆乱文、お許し下さいませ。この様に、調査を行って頂けた事に、深く感謝します。この回答が少しでも、お役に立てれば、幸いです。有り難うございました。
1739	注射が痛く、筋肉痛がわりと長く続いたが、皆もそうだったので、こういうものだと思っていた。後に副作用で重い障害が出た事が多くあったときき、心配だった。何らかの連絡を入れてほしかった！
1740	子宮頸がんの注射がとても痛かったため、2回目以降、接種するのに勇気がいった。
1741	子宮けいがんの注射は痛いと言っていたが、娘は2度とも痛みは感じなかったようでした。
1742	接種後、痛みが長く続いた。
1743	女子だけにしても無意味。むしろ20歳(18歳でも)以上の成人男性に接種したら良い。
1744	痛みが強く驚いたそうですが、接種後に気分不良等の不快な症状は何もなかったとのことでした。
1745	このワクチンを接種後に、計算力がおちたり、月経不順が始まったので、同じ症状が出る方がいらしたら、間違いなく副作用によるものだと確信しております。このような危険なワクチン接種はただちにやめるべきです。国も認め、副作用に苦しんでいられる方への補償を強く求めます。
1746	ワクチン名、H23.2.16、AHPVA122AA、H23.3.23、AHPVA123AA、H23.8.24、AHPVA123BC、●
1747	予防接種の副作用についてよく調査してほしいです。また接種前にも、体調をととのえて接種するよう、啓発活動にも力を入れて下さい。友人の娘さんが子宮頸がんワクチンを中学生の時、接種して、学校生活を送れなくなりました。公的な予防接種を受けて、副作用が出てしまった。こういう人がいることをきちんと公表して、原因も究明してほしいです。
1748	報道を見て控えた。

1749	副反応が他のワクチンに比べ、高いことは何か理由があるはずですが。この調査をいかし、今後、安全に、子宮頸がんのワクチンが受けられる様、結果、解答をまちたいと思います。
1750	子宮頸がんワクチンとの因果関係があるようなら知らせて欲しい。(公に公表して欲しい)
1751	(今回の子宮頸がんワクチンについて思うこと)その頃、たぶん7、8年前だが無料でワクチンが接種でき、なおかつ不足がちで近くの内科から入荷したら接種をしたように記憶しているが、幸いにもうちの娘には副反応がでていないが、副作用をおこしている方々には本当に気の毒でならない。また将来的に自分の娘に対しても副反応がでるのでは？と不安に思うこともしばしばある。これを機に、また最近の日本社会にはまず信用せずに疑うこと、なぜに必要か？不要か？という自分の自主的判断をせねばならないなあと自分自身のいましめにもしている。
1752	接種した時期、ワクチンの種類も覚えておらず、参考にならないかもしれません。幸い今のところ副作用もないようです。ワクチン接種の効果は女性だけがワクチン接種をうけても、効果がないときいたことがあります。男性にはないのですか？
1753	調査がんばってください。
1754	子宮頸がんワクチンを接種しても全く何もありませんでした。
1755	テレビのニュースなどで見る為、不安になり、これから妊娠、出産を控えた我が子に接種させて良かったのか、この先何か症状が出たらと心配しています。ワクチンによる副作用があるのかどうか原因を早急に追求、発表をお願いしたいです。そして安全なワクチンであることを切に願っています。
1756	子宮頸がんワクチンの接種後、腕のはれと痛みは、ほかの予防注射より、大きくなりました。
1757	娘が接種したワクチンが安全であることを切に願っております。
1758	ワクチンを接種したからといって100%ガンにならない事はないし、接種しなかったからといって100%ガンになる理由ではない。この事実の中、一生続く副反応というリスクのあるワクチンを接種するべきでは無いと思ったから。
1759	子宮頸がんワクチンで副作用の出る人と出ない人は、はっきりと分けられると思います。もう少し注射は痛くない方が良くと思います…。私は我慢して3回接種しましたが、友達は注射が痛すぎて腕が腫れ、学校のリュックを背負えないまでになってしまっていました。(一時的なものです)
1760	近所の同世代の子供も受けましたが、髪の毛がバサバサ抜けたと言っていました。
1761	子宮頸がん予防接種による健康被害にあわれた方の原因解明と救済を切にお願い致します。
1762	子宮頸がんワクチン接種での異常はありませんでしたが、通常のワクチンよりも腕の痛みは、すごく強かった様に思います。1週間程、字を書くのも、辛そうにしている接種する度に心配した記憶があります。
1763	任意接種の人も多数だと思います。その人たちは、なぜ接種を希望し、接種を受けたのか？接種後の後遺症報道を知った前後では接種に対し考え方に変化があったのか？
1764	予防接種は無料でありがたいものでありますが、任意であり、親の判断によるものであるため、万が一の副作用がいつも気がかりで、心配でした。ですから子供の接種日の体調には気をつけ、今もインフルエンザの予防接種を受ける時は、鼻水一滴出ない、万全な時に、予約日接種ではなく、予約し、都合の良い日に接種をしてくれる病院で、接種しています。子宮頸ガンワクチンの接種は、年齢的に体調とスケジュールに合わせるのが大変でしたが、無事3回接種させていただき、とてもありがたく思っております。
1765	子宮頸がんワクチン接種後のはれ(注射したところ)は、回を重ねるごとにひどくなったし、一週間以上はれがなおらなかった。積極的にワクチン接種が推進されていたため、接種したが、多くの人の副反応が出ている状況を知り、早く因果関係がわかればいいなと思います。
1766	わが家の場合、異常が今のところ出ていないと思いますが…。副反応のうたがいで苦しんでいる方の為、原因の解明や治療の方法が早くわかる事を願います。女の子をもつ親なら、良い事だと思いつ接種させたと思うので…。よろしく願いいたします。
1767	もともとアレルギーを持っていますが注射の後うった所がいじょうにはれた。
1768	3回目に接種した、子宮頸がんワクチンで、高熱が調べたら1週間出ました。1回目も2回目も特別な変化はなかったので、3回目を接種した翌日の高熱。病院を婦人科から内科へ行く様に言われ行きました。(最初に接種した3回とも同院)内科へ行っても原因不明。子宮頸ワクチンが原因ではないかとのこと。あんなに恐ろしい状態は初めてでした。高熱と頭痛全身の痛みで苦しんでいました。どうか、このワクチンは中止して下さい。恐ろしいです。1回目や2回目でこの様なことになったなら3回目は接種しません。今のところ特別変化はありませんが、普通に妊娠できるか、心配です。
1769	この子宮頸ガン予防接種は、任意とはいえ、名古屋市からの案内など、かなり推奨してたので、忘れないうちに、3回すべて接種してしまいました。その後、副作用についてのニュースが飛びかい、とても心配しました。娘は、接種しおわってしまい、とても憤りを感じています。娘達は、実験台ではありません。何かあってから辞められても、とりかえしがつかないのです。時々あるせきこみなどは、もともとの娘の体質なのか何なのかわかりませんが、今、現在大丈夫であれば、接種してしまったからといって、副作用が出てくることは今後ないと言い切れるでしょうか。その辺りの回答を明確にし、このようなことは決してないようにして頂きたいです。

1770	子宮頸がんワクチンを接種すると不妊になると聞きました。ネコや犬の避妊に使われている成分が含まれていて、欧米ではワクチン接種後不妊に悩むと聞きました。本当なら恐ろしい事です。3回目を接種しない事にしたなら医者にも怒られました。誰が責任を持つのでしょうか。このワクチンをすすめる事になった本当の理由は何か、どこかが利益を得る為の物でしょうか？今後も調査を何十年にもわたってすべきではないでしょうか。
1771	かかりつけの病院の医師にもすすめられましたし、公費でやってもらえるので、当然安全が確立されていると思って接種してもらいました。幸いな事に、3回接種後も、今のところ、特別な異常はありませんが、接種後いつ頃まで、副反応が表われるのかも知らされていないし、不安です。副反応がでるかでないか、紙一重で、我子も半身マヒになっていたかしれません。必らず、元の体に戻してあげてください。こんな事で人生の夢も希望も絶ち切られるのかと思うと、自分の事の様に辛くてたまりません。治療も全額公費でまかなって下さい！それでも足りない！！それ以上に彼女たちや親御さんは辛く悲しい思いをしていると思います！（母親、記）
1772	下腹、子宮のあたりが毎日のように痛いと言っている。診察はまだ受けたことはない。この様に大々的に調査するなら、記名式で正確に情報はあくしてほしい。記名式により適切な対応を望みます。
1773	子宮頸がんワクチン最後まで接種しましたが私は何の異状もなく終了いたしました。
1774	予防接種なので、進んで受けた結果、沢山の同年代のお嬢様が色々な障害にあわれている現状を知って大変心が痛みます。この様なアンケートで少しでも原因が分かり後遺症の状態が良くなります様、願っております。本当に悲しい事です…。
1775	副作用について、2回目、接種後、生理が3ヵ月ほど(4ヵ月過ぎた頃ありました。)、とまり、3回目接種後、再びとまり半年以上、生理がとまって、婦人科へかかりました。個人的にサーバリックスの副作用だと思いました。次女には、子宮頸がんワクチンを打たせるつもりはありません。長女の生理不順は、この時だけです。こういった調査は必要だと思います。
1776	私は中学生の時に接種しましたが、当時テレビのコマーシャルや母からも聞いていたので迷わずワクチンを接種しました。(接種年月日は忘れましたが)私は全く何ともなかったのですが、1~2年後同じ年頃の女の子が多くではありませんが、副作用の被害が大きく普通に生活できないケースをニュースで見たりしてその症状がひどいのでびっくりしました。救済措置がとられています、その人達は全員元通りに生活できるようになった(なる)のでしょうか？…とこのアンケートで思いました。
1777	ワクチンを打った後、腕でがはれあがって上がらなくなりました。痛かったです。それで体育を休んだことがあります。
1778	子宮頸がんワクチンは3回接種しましたが、3回とも接種後に高熱(39℃以上)出て受診しました。接種した医師に確認したところワクチンの副作用ではないと言われましたが、他に思い当たることはなく不信に思っていたところ様々なニュースで副作用を知りました。複雑な思いでいっぱいです。
1779	多くの方が現在も苦しんでおられるのは、大変残念に思います。もし自分であったのならと考えるだけで恐ろしいことです。一日も早く原因究明をしていただき このワクチンの安全を証明して下さい。もう打ってしまった者としてそれを望みます。有耶無耶にしないで下さい。今も苦しみの中にいらっしゃる方の一日も早い回復をお祈りいたします。
1780	娘の場合は、接種部位の疼痛が強かった程度でした。マスコミで取り上げられている様な事例が起こっている事実があるのであれば、今後の接種について情報がほしいです。小3になる次女がいますので、気になっています。ワクチン接種により予防できるのであれば、子宮頸がんワクチンに限らず、接種すべきだと考えています。
1781	接種前に、心配だったので、病院の方に相談しましたが、「まあ大丈夫だと思うよ…無料のうちにやっとなかるとネ」と…しか言えないのも分ってはいますが、体調不良はいろいろ出ていますので、何が原因か特定するのは難しいかと思えます。この世代が親になった頃が一番心配です。
1782	引越したばかりで母子手帳が見つからず予防接種の時期等がわからないので、すみません。子宮頸がんワクチンの副作用で苦しんでいる方をテレビで見かけると同じ年頃の子供を持つ親として胸が痛みます。一日も早く治癒と願います。
1783	ワクチンの2回目を接種しおえてから数ヶ月で体調を崩し難病となつてしまい、子宮頸がんのワクチンの影響があったのではと、早急に接種をさせてしまった自分を責めました。関係ないのかもしれませんが、副作用がほとんどないと思い安心してうけたので、うたがってしまいます。もしかしたら、頭痛、体のしびれや、動きが出てしまう副作用以外にもあるのではないのでしょうか。
1784	注射がかなり痛かったと他の人も言っていました。接種後、かなり汗をかいていたのを覚えている。(そういうことは珍しかったので)何年もしてから副反応など出ないか心配。このような調査もして、結果は詳しく発表すべきだと思います。
1785	筋肉注射であったため他のワクチンより痛みは後々まであったようですが、3日程でおさまったようです。まわりに子宮頸ガンのワクチン接種で調子が悪くなったという人のことをきいてなかったし、そのようなことがおこっているとは知らないにせよ、原因を早くつきとめてほしいです。30年間ワクチンが効くと聞いたことがあるので、接種した方がよいと思いましたが、補助がなく、接種料金がとても高かったのを覚えています。

1786	子宮頸癌ワクチンは他のワクチンと違って筋肉注射で注射部位の痛みは、いつもよりあったと思います。学校行事の予定表をみて、3回の接種を行ないました。副作用もなく、よかったと思いますが、多くの方々が重い副作用で苦しんでいると思うと、早く原因を究明してほしいと思います。
1787	子宮けいがん接種した2日後ぐらいから、腕がかなりはれあがり痛みも伴いつらそうでした。体調は悪くはならなかったが、「もうこりこり」という本人の感想です。
1788	3回子宮頸がんワクチンの接種を受けましたが、2回目の時に肌が痛くなって、40度近くの高熱が出ました。副作用として熱が出ることもあとと書いてありましたが、副反応の報道を見て不安になったことはあります。
1789	接種を2回で止めてしまった場合はどうなりますか？途中で止めた場合効果はありますか？安全性を確認し、途中で止めた人にも有効なワクチンを考えて下さい。全く今後の事もわからないのは困ります(情報提供が少なすぎる)。
1790	どのような形で結果を公表するのか知らせてほしいです。できれば回答した個人に送付する等して欲しいです。
1791	ニュースみて驚いてます。疲れやすく、物覚えが悪いのは、ワクチンの副作用なんですか？あの頃は、ワクチンを是非受けて下さいと言っていたのに…
1792	頭痛をよく訴える。1回位へ/1week
1793	子宮頸がんの接種3回めに原因不明の高熱(40℃)が出、救急外来にかけ込みました。確か、翌日には下がりました。
1794	役所の推奨にのってしまった母親のせいです。家庭事情もあり、4~8万もする注射をあとから自費するのもむずかしく、それによって娘がガンになったらと思うと迷いもありましたがうたせてしまいました。信じるべきでなかった。浅はかでした。とり返しのつかない事をしました。この先、子が子供を産む時、その後ずっと影響はないか不安の中で生きていかなくはなりません。私は責任があるので、その仕打ちをうけるのは仕方ありませんが娘がかわいそうです。試しに推奨するのはやめてほしい。すすめた人達はどうせ他人事、こんな統計も、形だけで終わるでしょう。やりましたというパフォーマンスのように思えて仕方ない。どんどん時間は過ぎていく。治らないまま、娘にそんな後遺症があるのも、他に知られたくない。将来のことを考えると。保障してもらえないのに公の場に出ていくこともかわいそうでできない。娘の出産などに(孫に)影響があったら、どうつぶなれて良いか…。生きていてはいけないくらいの責任を感じる。わからないですよ？わからないでしょう。
1795	注射を受けた後にひんげつを起こした(痛すぎて)。
1796	特に異常は出ませんでした。1回目だけ、強烈に痛かったようです。
1797	接種してから、だいぶ時がたっているので、いつ症状があらわれたのか月日はおろか、年もおぼえていません。副作用などで、こまっている方がいるという報道を見たのは、だいぶ前のことです。なぜ、もっと早くにこのようなアンケートを実施しなかったのか、とても不思議です。
1798	子宮頸がんワクチン接種後は、副反応で腕がはれてすごく痛がりました。
1799	やめればよかったです。大事に大事に育ててきた娘の体に親の判断で大変なことをしてしまいました。この資料を書くことさえ申し訳なから辛く、1日では書けませんでした。封筒を開けるのも辛く時間がかかりました。今さら、という気持ち強いです。書きながら体調が悪くなります。症状が注射のせいでも、とわかった時の体中の血が凍って逆流するような感覚は役所の方々にはわからないでしょう。こんな統計をとってくださっても治りはしないです。何かと理由をつけて対象者からははずされるでしょう。この先も一生不安を持ったまま生きていくんです。人の人生を何だと思っているんでしょう。元に戻してほしい。私の命をかわりに取ってほしい。
1800	子宮頸がんワクチンの3回目接種後の痛み(下腹痛)が、かなりひどく2日程寝こんでいました。1回目や2回目にこのような痛みがあったら、中止していたと思います。
1801	痛がらず、特に何もなかったので安心していましたがアンケートをして、少し不安になっている。(母)
1802	子宮頸がんワクチンを接種した次の日発熱あり、うでも結構腫れました。
1803	現在、両手、左足の痛み、しびれ、腫れ等様々な症状で苦しんでいます。学校に行きたくても痛みが強くと休むことが多いです。内科、婦人科、整形外科、脳外科へ受診に行きましたが、どこも原因不明で終わり、TV報道やインターネットで子宮頸がんワクチン接種後の副作用だと判明しました。早くもとの元気な体にもどりたいです。助けて下さい。
1804	副作用がニュース等で報道され心配です。今後、子宮頸がんワクチンを接種した事で体に悪影響があるのではないかと不安です。接種しなければよかったですと後悔しております。
1805	接種後1週間くらい接種した部分周辺が腫れてとても痛がりました。
1806	今のところ副作用は出ていないが、いつ急変して副作用が出てくるかもしれないと思うとすごく心配はしています。このワクチンをうったことで、子供に申し訳けないと思っています。
1807	念のためワクチンNo記載いたしますH22.11AHPVA100AA、H22.12AHPVA100AA、

1808	23年に子宮頸がんワクチンを受けた頃娘は、月経は始まっておらず(中学3)高校生になったら月経が来ると思ってましたが高3になっても来ず、病院へ行き、ホルモン剤のおくすりを飲みました。その時はすごくひどい月経になり2~3日寝たまま、動けませんでした。また、数ヶ月経って、高3の終り頃、病院へ行きホルモン剤を出され飲みました。又、ひどい月経にあい今ではくすりはこわくなって飲めません。もちろん月経も来てません。もうすぐ20才です。ワクチンのせいだとすれば何かしていただけるのでしょうか?いい方法はないのでしょうか?
1809	サーバリックス3回目接種後、死んだように眠りこんでしまってかなり心配であった。知り合いの人に接種後、1年位、うつ状態になった人がいるのでおそろしい。
1810	子宮頸がんワクチンの副作用がニュースになっていたのを覚えています。確実に安全だというものしか、案内しないでください。うちの子にも打たせてしまい、後からすごく後悔しました。子宮のうほうも、その副作用ではありませんか?
1811	子宮頸がんワクチン導入のきっかけをつくった●の責任を問いたい。
1812	このようなアンケートを出すような、ワクチンをどうして受けさせたのでしょうか。もっと早い段階で接種を中止すべきではないのでしょうか?この経費もすべて公費でやられていると思うと、すごく無駄が多いのではないのでしょうか?アンケートはまだですか?というハガキ(これ特に腹立たしい)もすべてに。公費を使いすぎだと思います。ワクチンを無駄にした方が安くはないですか?
1813	予防接種がしたいです。
1814	接種した後顔色が青くなり、気分が悪くなった。すぐ横になった。
1815	H25、てんかん発症しました。前記症状は、てんかんによるものと、同じようなものなので、あえてであると答えてあります。てんかんとのがんが関係は、ないのか知りたいです。病院の先生は、関係ないと言われますが、症状が非常によく似ているので、なんだかもやもやした感がありますが・・・。
1816	このようなアンケートをすること事態が税金のムダだと思います。こうならない為にもワクチン接種は、安易にしないことにしようと思います。人体実験ではありませんので!!
1817	我が子に”子宮頸がんワクチン”の目に見える重度の症状が出るのが無く、今のところは安心していきます。報道で重度被害症状のお子さんの存在を知り、人ごとではないと、心配です。
1818	このアンケートを書いていて、気になった事があります。高校生の頃より時々偏頭痛を訴えます。夜間寝つきが悪く、本人も睡眠の質が悪いと気にしています。それも同時期くらいより。体力がないと思っていましたが疲れやすさもあるようです。このワクチンを摂取した事と何か関係があるのではないかと不安になりました。是非、しっかりと調査して頂き、因果関係について明らかにして下さい。そして治療が必要とならば、保障して頂きたい。
1819	今回のワクチンは正直受けさせる前に副作用を心配しながら受けさせました。無料であるとともに案内が自宅に届いたので接しゅしましたが重症な副作用が出た人がいていきどおりを感じます。近所の医療機関ではたらいっている人は子供には受けさせなかったみたいです。やはりワクチンは神様ではなく万能でもありません。これから、子供達がこのような場面にあったらじゅう分気をつけるように言いました。
1820	たまたま我が子は副作用が出ませんでしたでしたが中には副作用でくるしんでいる方をテレビで等で拝見しました。副作用が何が原因で出てしまうのか追究解明していただきだれでも安心してうけることができるよう望んでいます。副作用がなくならなければいくらよいと言われても接種する人は多くならないと思います。
1821	うちは、けっきょく受けましたがみんなすごくまよって考えてどうすればよいかわからなかったみたいです。
1822	接種した後に1回目、2回目は皮膚がはれていた。(1週間ぐらい)
1823	質問4で「小学校6年生以降に」とありますが6年生以前で受けたものも誤解して書いてしまいました。ごめんなさい。
1824	接種後、めまい、生理不順、自律神経のみだれなど体調がわるくなった。
1825	友人で、ワクチンの影響で記憶障害になったお子さんが居ます。
1826	子宮頸がんの後遺症で苦しんでいる方に、少しでも協力できたらと思っております。治療方が見つかり、健康をとりもどせるよう、祈っております。返信遅くなり、すみません。
1827	注射をうったその日に、腕が上がりなくなるほど痛くはれ上がりましたが2~3日で、ひいたし、まわりの子ども達も同じ様子でした。本人は嫌がっていましたが、3回接種しました。
1828	子宮けいがんを接種したが、異常な事は何もありません。(接種した後、うでがだるく少し痛みがありました。)どんな、予防接種でも、反応はあるはずです。1番体調の良い時に、接種をして、少しでも予防ができるようにしたいです。
1829	接種時期には他県在住でしたので、お知らせしておきます
1830	このような不安定な接種をさせてしまい、何もなかったからよかったようなものの、大変後悔しています。

1831	1度目の接種したその夜、激しい胃の痛みが起こり副作用かと心配になった。続けて接種しなければと思い、2度目以降接種を悩んだが接種をした。けれど副作用的な痛みはなかった。注射の痛み、その後の副反応についてももっと知っておいてから接種すべきだったと思う。打った後に色々副反応について知りこわくなった。
1832	娘は、子宮頸がんワクチンを受けてよかったと言っています。ありがとうございました。
1833	もし副作用がでていたとしたら、どんな症状なのか、いつ位から出るのか、全くわからず過ごしています。情報が足りなさすぎです。
1834	子宮けいがん予防接種を本当に受けた方が良かったのか、どうか未だ疑問と不安があります！！義務的に接種しましたが・・・！
1835	すごく痛かった。一週間ぐらい腕が上がりませんでした。
1836	体に異常があらわれてしまった子ども達が気の毒です。体調や体質でかわってくるものなのか不明ですが回復してこれからの人生を楽しくすごしてほしいものです。アンケートが回復への道しるべになることを祈っています。
1837	子宮頸がんワクチン(サーバリックス)注射する時は、痛みがあるとされていましたので、事前に説明し、注射前後は、付き添いし観察し様子みてました。特に症状がなく、良かったです。
1838	中1の11月、12月と中2の6月の計3回、子宮頸がんワクチンを接種しましたが、もともと小学1年の頃より花粉症などのアレルギーが出始め、それ以来、犬の毛、ホコリ、乳製品、他の色々なものにすぐに反応してしまうタイプなので、子宮頸ガンワクチンを打ったから何か症状が出たか・・・と言われると全く見当もつかず、正直、分かりません。
1839	子宮頸がんワクチンの後遺症をテレビで見た時に、やらなければ良かったと思いました。過呼吸も、後遺症じゃないのかな？と思ったりします。今年の夏は、急に手足が固まる事があり、今は落ち着いてますが、今後とても心配です。
1840	接種後にじんましんが出て、かなり広範囲に、ひくのに3~4日かかりました。若干の微熱も。しかし、ワクチンとの関連があるのかわからず、自宅で安静にしてとくに医師にはかかりませんでした。わりと、ストレス等でもじんましんが出る時があるので
1841	TV報道を見てから2回目、3回目をワクチンを打つのを止めました。1回目を本人、13才になったお誕生の頃うちました。1度打ってなにも異常がない人は2回目、3回目の接種をおすすめしていますか？それ共、異常が出ていなくてもこれいじょうは中止、打たない方が正解なのですか？女性の体の為にはやはり接種した方が良いのですか？その比別などはっきりと教えて欲しいです。よろしくおねがいします。
1842	大学の友人が子宮頸がんワクチンを接種してから、体が悪くなったと言っています。大学には通っていますが、車いすやつえを日常で使用している状態です。その友人以外にワクチンのせいで、体が悪くなったと言っている子はいませんが、心配です。自分も友人も。
1843	子宮頸がんワクチンを接種した際、とても痛がっていたのを憶えています。しばらく(数日)接種した腕がだるそうでした。
1844	子宮頸がん予防接種をおこなった日は腕がいたく次の日はムラサキ色に変色をしていたので、3回もうつことをためらいながらも接種した記憶があります。当時は副作用の話しでもなかった時なので、今ならうたせなかったと思います。
1845	ワクチンには副反応がでてしまうことがあるのは当然だと思います。どんなワクチンにも大なり小なりあるかと・・・。子宮頸がんだけとりざたされるのはよくわかりません。ワクチン接種で子宮頸がん発症がおさえられています。接種は必要かと・・・
1846	幸いにも我が娘は何事もなく3回接種して現在に至りますが、副作用や後遺症で嘆き苦しんでいる同世代の女の子が少しでも早く良くなる事を願っております。
1847	私の高校時代の知り合いがこの予防接種を受けて部活(バスケットボール)ができない体になってしまいました。とても有能なプレーヤーだったのに・・・よく対戦していたのでその事実を知った時は本当に悲しかったです。どうか彼女を含め一人でもこの後遺症に悩み苦しんでいる人達を助けてあげてください。お願いします。
1848	私の娘は注射による異常はありませんでした。でも影響がでている方もみえるようなので、よく検討していただきたいと思います。
1849	副作用について、もっと真剣に考えて下さい。こんなアンケート、無意味です。
1850	名古屋は無料で子宮頸がんワクチンが接種できると知り、早速うけましたが、こんなに副反応が重いとは知らず、とても心配しました。我慢強い子なのにとても痛がり、身体もしんどそうでした。何とか学校は休みませんでした。体に負担がとても多いのに驚きました。あとで知った有効年数も、中学で接種するには短かく、意味あるのかと思いました。むやみに推奨するのではなく、もっとよく欠点を知らしめる必要があります！

1851	子宮頸がんワクチンは、他のワクチンに比べて副反応が強いと、知っていたら、また、無料でなかったら、人に勧められなかったら、受けていなかったかも知れません。実際、打った当日より2~3日痛みで腕が上がらず、だるさが強く、今までのワクチンとあきらかに違うと思われました。友人には学校を休んだ子もいました。中学生でワクチンを受けても2~3年しか有効でないと思っていたら、受けなかったと思います。CMでの啓もうではスポンサーの都合なのが、利点ばかり強調されていました。全てをうのみにしていた私は恥かしく思いました。
1852	副作用の報道についても、実際のところ危険性が高いかどうかの明確な回答、結論がなく、自己判断に任せるような無責任な行政の対応に信頼も何もありません。1, 2回目接種後に、数々の報道があり、医師に相談しましたが”絶対安全”とは言えず、3回目も大丈夫だと保証はないので心配なら止める選択を親の判断に任せられました。そもそも安全性を確認された薬ではないのであれば、接種を推奨するのはどうなのでしょう。万人に大丈夫な薬はないのは仕方ないことなのでしょう。素人判断で、何もわかりませんが、安心して受けられるしるみを様々な面から検証いただき、他に替わる薬ができることを早く望みます。
1853	ジフテリアはDTではなく3種のDPT接種。H11.5.18/H11.6.11/H11.7.6./H12.8.3の4回です。
1854	定期日本脳炎の第2期接種用の用紙をもらっていますが、今年19才になるので、期限が近づいてるので、接種したほうが良いと思いますが、心配で、今日までできていません。
1855	よろしくお願ひします。
1856	子宮を頸がんワクチンを接種した後は、腫れて腕が上がらないため、習っていたスイミングを2、3日休みました。周りでもその症状の人が多かった(スイミングスクールでの知り合い)
1857	回答された方が特定されることはないとかいておきながら、回答していなかったら、早く書いて下さいといったはがきが届いたのは何故ですか？もうこの時点で特定されていますよね？
1858	現在、頭痛、だるさが強く、医者に通っている状態です。薬を処方してもらっていますがあまり変化はみられません。これもなにかしらの影響によるものなのでしょうか？
1859	あいまいな回答もあり、申し訳ありません。お困りの方が良くなる事を願ひます。(母)
1860	4/8ページにも書きましたが、生理の異常が見られます。とても早い周期で生理がきます。薬を飲んでやめると元に戻ります。接種してから一年くらい経ってからの症状です。それまでは、40日くらいの周期で、遅いくらいだったのに。ワクチンの影響を心配しています。
1861	1回だけでも副反応はでるのでしょうか？子どもが心配しています。後悔しています。
1862	この調査が、今後の予防接種のあり方について、役に立てばと思ひ協力しました。どんどん良い方法を考え出してほしいと思ひます。
1863	子宮頸がんワクチンは、接種した後、1週間程、うでが痛いといっていました。
1864	すごく頭痛がし、吐き気、起きられる状態ではなかった。(1回目接種の時のみ)
1865	サーバリックス3回目接種の翌日、38℃の発熱がありました。
1866	H5年生まれ姉も自主的にサーバリックスを3回接種しました。H24.6に1回目の接種をしましたが、その後原因不明の咳が数カ月にわたり続きました。かなり症状がひどく接種をして頂いたかかりつけ医に診てもらいましたが、咳をおさえる薬を飲んでなかなかよくなりませんでした。とくに大病をした事もなく、ぜんそく等もない子でしたので、予防接種の副作用なのではないかと思ひております。咳が完全におさまるまでには、2,3ヶ月かかりました。接種時期、1回目H24.6、2回目H24.9、3回目H24.12
1867	記憶力がすごく落ちましたから、心配です！
1868	ワクチンを接種する時(3回目)微熱があったのだが、病院の先生(●)がこの位だったらOKとの事だったので、それも何か関係があるのでしょうか？とにかくワクチン接種後、同じ子供なのに別人の様な体質になってしまい将来不安でたまりません。元通りの元気な体になれば良いのですが、このままでは何らかの型で、子供を助けて下さい。
1869	早くにワクチンを打った子たちは、打った腕がだるくなる、力が入らなくなる、体がしんどいと言っていたので、あとから打つ子たちは、部活の試合やテストなどの時期をさけて打ちました。私も打ったあと打った腕がおもくあがりにくくなりました。
1870	1回目をうけたあと、腕が痛くてあげられないと云い、下に降ろしたままの状態でしたら、水が留まったような状態で冷たくなり、ビックリしてマッサージで暖めた。2回目は少しマシだったが、やはり痛がって、ビックリした覚えあり。最近になり、後い症のあるワクチンだと聞き、腕の痛みでおさまって良かったと胸をなで下ろしている。
1871	行政(医師)から接種を半ば強要されて行っているにもかかわらず、副作用の為に苦しまなければならないのは納得できない。何を信じて何を疑っていけばいいのか……。大切な子どもたちを一瞬のうちに苦痛の人生を送らせなければならないのは親として本当に辛いことです。確定的な検査をもって接種を勧めしてほしい。
1872	質問2に関しては原因もはっきりせず、いつからか時期もはっきりしないものが多く、答えるのに困ってしまいました。ここで止まってしまい、なかなか提出できませんでした。
1873	留学中の為、母親記載
1874	副作用がある事はわかっていましたが、身近に(同年令の方に)症状が出た事は、とても恐ろしく感じました。現在、副作用で苦しんでみえる方の回復を心より願ひています

1875	産婦人科で接種した時、接種する腕はどちらでもよいと言われたが、他の人に聞くと左右交互だと聞いた。大丈夫なのかと心配になった。
1876	「積極的な接種はしないで下さい」という意味がわからない。副反応なのかさえわからない状況や、接種後の重症患者が出ている状況を重くとらえるべきではないでしょうか。「接種は中止」にするべきです。
1877	産婦人科で接種した時、接種する腕はどちらでもよいと言われたが、他の人に聞くと左右交互だと聞いた。大丈夫なのかと心配になった。
1878	長女は子宮頸がんワクチンを接種して、今の所異常はないと思います。次女が今年中1になりワクチンを接種してもいいのか迷っています。長女は早めにワクチンを接種したので、まだそのころは副反応についてあまり問題にはなっていないかもしれませんが、現在は色々問題になったままになっていて、接種すべきか悩むところです。
1879	3回(23年4月、23年5月、23年12月)接種しましたが、接種より副作用があったようには、保護者として見えません。
1880	報道された為(副作用)子供が恐がったから。
1881	受けた後に副作用の報道を知りました。たまたま今、副作用がでていませんが、この先どんな事になるか心配です。
1882	今のところ何の副作用もありませんが、今後のことが心配です。接種後、何か不安材料が見つかるようでしたら、接種した人全員に知らせてください。よろしくお願いします。
1883	子宮頸がんワクチン接種後、失神してしまいました。怖くて、2回目を受ける気にはなれませんでした。また、痛みも長く続き、接種後、一週間以上、腕が上げられず、着替えを母に手伝ってもらい、体育の授業も休みました。
1884	接種時、その後も問題なし。
1885	接種時、その後も問題なし。
1886	日本脳炎など接種途中で中止になったりすると、何を接種して、何を接種していないかわからなくなるので義務教育の間は学校を通じて、もっと周知してほしいと思います。
1887	接種後、首～腕、背中に強い痛みだった。接種は全て行ったが、今は大丈夫かと思うが、今後何ら身体に異常がでたときには、医療費を、名古屋市は助成してほしい。今でも、子供心配、テレビニュースで観ていると心が痛む。母
1888	病気で免疫がなくなった為、再度予防接種を打ち直しました。
1889	接種した事に後悔していますが子宮頸がんワクチンにより、今後子供達が出産する時などに、副作用(影響)なければよいと思いますが、どうでしょうか。
1890	子宮頸がん健診を受けたことがないので結果は今後どうなるのか。不安です。
1891	1回目の時に、副作用かどうかわかりませんが、倒れました。点滴をしました。しかし、2回目、3回目とそのまま受けましたが、何も起きませんでした。
1892	意図はわかるが、このアンケートは色々と本人に確認しなければならず、また、本人だけではわからない内容も多い。最初、協力しようとすぐにペンをとったが、難しく遅くなってしまった。もう少し回答しやすい内容にならなかったのかと思う。(母)
1893	娘は注射を打ってから、学力も落ち、精神的にもイライラする事が多くなりました。生理も半年以上無く、婦人科に行ったら、子宮が小さいと言われました。赤ちゃんを授けられないのかと心配な日々です。明らかに副作用がある危険な注射だと思います。正直、恨んでいます。薬害なので、即刻やめて頂きたい。誰かが利益を得る為に、導入が早かったのでしょうか…。少子化で「子は宝」なのに、本当にヒドイ薬害です。
1894	子宮頸がんの予防接種を当然のように、受けさせました。子宮頸がんの予防接種については、あまり良いウワサがなく、娘は嫌がっていましたが、迷いながらも、病院からも高2の頃が一番良い時期を相談し、子供の事を考えて3回全部接種しました。その後、娘は特に何も副作用が無く、現在に至っていますが、テレビ等でニュースを観た時は、2人目の娘には受けさせる勇気がありませんでした。特に、2人目はアレルギー体質のため、やめました。
1895	13歳までに日本脳炎の予防接種を受けていなく、医師に相談したら打った方がよいということになったためH26と接種時期が遅くなってしまいました。3回目も近々接種予定です。子宮頸がんワクチンは副反応が怖かったので本当は打ちたくなかったです。打った後何の副反応もなく過ごせているのでホットしています。
1896	接種翌日、発熱、おう吐があった。病院では「肩こりのせい、接種は関係ない」と言われたが、接種を後悔している。
1897	現在、副作用的な症状は感じられないようですが、今現在症状がなければ、今後も副作用の心配はないのでしょうか？はつきり、知りたいです。
1898	副反応は、うちの娘には特にありませんでしたが、まだ、改善されず、苦しんでいる同じ年頃のお嬢さんを見ると、かわうそうだなと思います。どんな注射にもリスクはつきものですが、安全第一だと思います。

1899	副作用と思われる原因でわが子と同じ年頃の女の子が苦しい思いをされている報道を見ますと人ごととは思えません。少しでも早く普通の生活に戻れる様、原因究明と、医療費や心のケアなど、手厚い補償がうけられる事を望みます。
1900	とても面倒でした。でもこの子宮頸がんワクチンを接種し副作用で苦しんでいる方がいると知ったので記入しました。ただ、紙に記入し回答して、返信するよりもネットのアンケートにするなど、もっといい方法があると思いました。その方がアンケート回答率も上がると思います。紙の印刷代もかかり、税金の無駄使いにもなりますね！個人的にはアンケートに回答してくれた方に、何か小さなプレゼントでもあると、ちゃんと答えようと思えます。
1901	接種した後、生理の時の腹の痛みが増えました。
1902	最近髪がよく抜けてしまいます。予防接種を受けたにも関わらず風疹とムンプスの抗体値が異常な程少なかったです。
1903	サーバリックス注射後の腕の痛みが異常だった。直後1週間は肩より上にあげられず、体育の授業や部活動に支障をきたしていた。私1人だけではなく、周りの友人も口を揃えて同じことを言っていた。
1904	娘は無料で接種できる年齢だったし、国が薦める予防接種だった為、迷わず接種しました。その時は「サーバリックス」で打ったすぐから腕が肩より上がらず、痛みが強く、一週間程腕が上がらず痛みもありました。(腕が重いとも言っていました。)もう1人上に娘がおり(H5.8月生れ)同じ様に受けさせようと思い、自費で3回接種しました。(①H24.9月②H24.11月③H25.3月)その時は「ガーダシル」で打った後もその後もほとんど痛みはなく通常に生活できました。強い副作用があると知っていたら全体接種させませんでした。国が薦めていたから接種しました。もし我が子だったらと思うと怖いです。是非とも定期接種と同じ様に救済してあげてください。この先長い人生に希望が持てる様にしてください。
1905	接種後、数日間、腕があがらない状態が続いた(子宮頸がん)
1906	全ての子宮頸がん効くわけではない(インフルエンザのように)為、副作用を起こす確率、リスクを背負いながらも摂取する必要があるかを今後検討してゆくべきだと思う。
1907	すごく痛かった記憶があるようです。
1908	2度目の接種の後、激しい頭痛がして、気分が悪くなりました。
1909	子宮頸癌ワクチンを他の子(姉妹)に打たせていいのか悩みます。副作用があるなら早く中止して下さい。
1910	突然無料接種の制度ができたことに違和感がありました。副作用の報道を見てとても怖いと感じ、どのような経緯で無料接種が決まったのか等くわしく知りたいという思いがあります。
1911	是非今後も追跡調査をお願いします。副作用と思われる症状がいつ出るとか、親子ともに心配しています。又、子宮頸がんのワクチンに対する研究が進んで安心して接種できるようになるよう国にはたらかかけて下さい。よろしくお願いします。 保護者
1912	1~3回目の副反応がひどかった。特に3回目接種後は、次の日に高熱がでた。
1913	接種後うでが痛くて字を書くのも辛く、試験の前は接種しないようにした。(2回目以降)
1914	子宮頸ガンワクチンはかなりはれて、うでが動かさしくいと娘が言っておりました。友達も、そういう子が多かったそうです。
1915	子宮頸がんワクチン1回目を接種した後、意識がなくなり、少し横になって(10分位?)目がさめたのでよかった。2回目、3回目は何事もなかったが、危険性があると知っていたら止めていたと思う。今思えば怖いです。妹(平成12年生まれ)には接種していません。
1916	たまたま副作用が出なかっただけだと思うとぞっとします。発症された方が十分な補償を受けれる様希望します。
1917	子宮頸がん接種後、3回とも固くはれて5日間程の痛みあり。
1918	子宮頸がんワクチンが不妊の原因になるetc、よくないことを聞きますが、実際のところ、どうなんでしょうか？
1919	接種後、影響が出て大変な思いをされている方々の報道を拝見すると、本当に他人ごとではないとつらくなります。接種をうけた頃は、とてもすすめられていて、死に至る病の可能性を低くできるならという思いと、この時代にこんなに大々的にうたうのなら副作用は大丈夫だろうという安易な考えで(信用していたのですが)受けさせました。行政の「影響は思い込みだ」「予防接種のせいではない」という回答には、憤りを感じます。(最近認めはじめたみたいですが)関わる方々はご自身の娘さんだったらそういう結論を出せましたか？と聞きたい。だれがそうなってもおかしくなかった。感情に流されるのはおかしいですが、誠実に調査して下さい。よろしくお願いします。
1920	治療法が早く見つかることを願っています。
1921	これは子宮頸がんワクチンのアンケートの意味がありますか？副作用について調べているのではないですか？全く意味がないアンケートだと思います。
1922	副反応については、正直な情報を伝えていただきたいと思います。体に出ている症状について対処することができると同時に、たとえ見通しがたたくなくても気構えることができます。一番大切なことは、何も情報がない、知らないことが最大の不安なのです。長年に渡って調査と情報告示を続けてほしいと思います。

1923	サーバリックス、3回接種、内、3回とも、軽度の副反応があった。(インフルエンザワクチンを接種した時と似たような反応、腕の痛み、腫れ、腕があがらなくなるなどの症状)途中で接種を止めなかったのは”十分な予防効果を得るためには、3回の接種が必要”と案内を受けたため。
1924	知り合いの子で、ワクチンの影響で、車イス生活になってしまった子がいるので、しっかり国や県、市で検討してほしいです。
1925	確かに接種した後は腕が痛くなったが、その他の異状はない。2～3回目も同じく。なので学校へ通えない、寝たきり、留年などの重い方の症状が個人により、どうしてここまで差が出るのか、私の用な症状が出ない人と、徹底的に調べればよいと思います。
1926	子宮頸がんワクチンを3回接種後に生理不順が1年以上続いたので●保健所の予防接種課(?)に電話相談をしたがそんな事例はないからと感じの悪い対応をされた。今さらこんなアンケートをされてもムカつきます。
1927	接種してから、数年経ちますが、今後も副作用がおこる可能性があるのでしょうか?もし、症状が出た場合、国が保障して下さいますか?
1928	子宮頸がんワクチン接種後、上腕が腫れ痛かった。注射をうつ時も痛かった。
1929	すいません。きちんとワクチンうつべき物はうってます。子宮頸がんワクチンは打ちましたが異状は今のところはまったくありません。
1930	重度の心身障害児の為、参考になるかどうかわかりませんが、親の判断で回答させて頂きました。
1931	3回接種しましたが、とても痛かったらしく、直径4cmほどの丸印が1週間近くはれていました。
1932	サーバリックス3回接種しましたが、とても痛くて、直径4cm近くの丸いはれが1週間近く引きませんでした。
1933	これから何か体にしようじょうが、あらわれるとしたら、どんな事が起こるのか、3回の所を2回でやめたがそれは、大丈夫なのか。
1934	うちの子は現在、健康ですがこの後副作用が出ないかと不安になります。親の勝手に子宮頸がんワクチンを打って本当によかったのかと思います。当時はワクチンが出てしばらく様子を見、副作用の情報などを得ながら打つという判断をしましたが、その判断がよかったのかわかりません。
1935	こんな危険なものを国が推奨しないでほしい!うちの娘は運良く、副作用はでていないようだが、画面で、苦しめられている娘たちをみると生きた心地がしなかった。
1936	接種後から、患部が腫れかゆみと痛みを伴った。
1937	安心できるワクチンが出来てからきちんとしてほしい。このままでは子どもに打たせれない。
1938	国が勧奨する予防接種を、子どもの為にといい、まじめに受けさせてきましたが、副作用の事を考えると、接種させた事を一生後悔します。子供は、身体的には動く事ができますが、その他の面で人生において負の面を一生おうていくのでしょうか。
1939	ガーダシル3回接種しましたが、何の副反応も現れませんでした。姉(当事小学5年頃)が、インフルエンザの時にタミフル接種した時、夜中に突然起き上がり、何か大きな声で叫んで、また何もなかったように寝むり込んだ事がありました。
1940	注射がとても痛いと言っていました、「先生が、痛くない様にうってあげるから・・・」と、本当に痛くなかったと言っていました。同時期に2才上の姉も実費で接種していますが、同様です。
1941	副作用は接種して何年後まで影響されるのか不安です。お知らせしていただけたら幸いです。
1942	学校からワクチンについてのお知らせの用紙をもらってくると接種しなければいけないと思い、子宮頸がんのワクチンも接種させたが、それだけはやめておいた方が、本人にとっても良かったのかと思う日があり、身体のことを思うと接種させたことが良かったとても複雑です。本人にはワクチンのことはふれず、毎日普通の生活をさせています。自分は頭が悪いと悩んでいます。
1943	平成15年頃に名古屋市へ転入している。
1944	必ず、この解答を今後の材料にして下さい。公表内容を個々に送って下さい!(解答した人のみでも結構です)よろしくお願ひします。
1945	入試に対しての緊張の為か、中3ではとにかく体調が良くなかったです。その後高校生になりましたが、ぜんそく気味、自律神経失調症とも主治医に言われていて、病院に通っています。生理はとにかくずっと不順です。これらが、この予防接種を受けた事が関係しているかは分からないため、娘にも伝えた事はなく、生理不順の件で病院に通ったりはしていません。高校を卒業して大人になっても調子が悪ければ、本人に婦人科系の病院に行くようすすめようと思います。4つ下に妹がいますが、妹には、子宮頸がんの予防接種は、今の所受けさせる予定はありません。
1946	1回目、高熱が出て学校を休みました。2回目、微熱が出ました。接種した所は強い筋肉痛のような痛みで泣いていました。(2～3日)3回目のとき、接種後すぐに顔色が真っ白になりその場で倒れました。アナフィラキシーショックのような症状で、横になり30分ほど安静にしていました。本人の意識はもうろうとしていました。症状はその時だけだったので、良かったのですが、本人は一瞬で血が下がったような感じだったと言っていました
1947	子宮けいガンワクチンを受けてから、生理が2～3ヶ月止まった。その後は普段通りに戻っている。
1948	子宮頸がん予防のワクチンで予防できると思うがこの様に(テレビで)副作用があると受った後も少し不安になります。早くベストなワクチンができるといいと思います。

1949	名古屋市民の人は子宮頸がんワクチンを無料で受けられる、という知らせが届いたので接種しました。3回も受けた記憶がありません。(実は受けているのかもしれないですが)
1950	質問2の症状については、持病のものです。
1951	思っていたより痛くはなかった。
1952	今、娘に何の症状(副作用)がないから良かったですが、TVなどを見て心配になってしまいました。もし自分の娘だったらと・・・副作用が出てしまった方達のケアをもっとしてあげてほしいです。
1953	ワクチンの副作用で、いろんな症状が出てしまっているお子さん達がいてもし娘に出ているらと思うと複雑な気持ちです。症状が出てしまっているお子さん達のケアをもっとしてあげてほしいです。
1954	とつても痛かった。もう接種はやりたくない
1955	リスクがあったのをもっと早く知りたかった。それを知っていたら受けていなかったと思う。
1956	子宮頸がんワクチンはものすごく痛くて、数日うでが使えませんでした。アンケートも手間でした。
1957	身体の症状については、いつごろからかは意識してないのでわかりません。この様な症状が出るかもと、最初からわかっていたら気を付けていられると思いますが、目に見えての異常ではないので、はっきりいってこのアンケートを見ておどろいています。(親)
1958	接種させるべきではなかったと思いました。
1959	まちがいを訂正するため一度封を開けてしまい、封筒が汚くなってしまいすみませんでした。
1960	子宮頸がんワクチンを接種したことにより、日常生活に困難が生じたお子さん達に深く同情しております。また、国側が、原因があきらかでないという理由で何ら手をさしのべていない現状に憤りを感じております。私の娘に、異常は発生しておりません。が、娘さんの将来を突然うばわれたご家族の心情を思うと、とても心がいたみます。1日も早く、よりよい対策をして頂ける事を願うばかりです。
1961	子宮頸がんワクチン接種後しばらくはうでが痛くてしびれるような感じがあったと話していましたが今は大丈夫です。
1962	1度目に左腕に子宮頸がんのワクチンを接種したときに腕が2～3日あがらなくなるほど痛かったです。2回目、3回目はそれほどでもなかったです。
1963	子宮頸がんワクチンが中3まで無料という情報だったので、高1だったので「あー無念・・・」と思っていた矢先に高1まで大丈夫という話を聞き、まわりのお母さんたちは、「これ幸い！」とけっこう急いで接種したことを覚えています。3回も接種しなければ効果がないという事にちよっと”キツイかな・・・”と思いましたが、早めに打たないと意味がない。無料。親として安心。過去、予防接種で問題はなかった。で急いで病院へ行きました。副作用があるということを報道で知るのでなく、各病院で知りたかったと強く思います。横につながっていく情報が遅すぎ！！
1964	子宮頸がんのワクチンをうって良かったのかよくわからない。
1965	途中で止めたため、このままで良いのか不安です。
1966	今、現在、てんかんの薬を処方されて飲んでいます。主治医の先生にも頸がんワクチンの副作用ではないですか？と聞いた所(ちがいますね！)で終り、そのまま年1回の脳波検査と血液検査、2・3ヶ月に1回の問診(親だけ)普段の様子を聞いて終了。納得いかないです。きちんと調べて下さる病院名をお教えて下さい。
1967	親としては、接種しなくてもという思いでしたが、娘の意志で接種しました。友達が接種してるからと思いますが、娘は、月経小5の秋からでした。毎月きちんと定まって、月経があり、中学3年後半に接種致しました。不安定な時よりもという思いもありました。接種したその日は身体が一時的にだるさがあり、目もうつろでした。次の日はいつも通りと・・・ホッとしました。成長時期も関係があるのだろうかと感じました。副作用の事でテレビとかの放送を見て、びっくりしましたが、又、接種して、本人も何もなく良かったと言っています。
1968	2回受けたが、これから副作用が出る事はないのか？2回受けただけで、どれ位いの効力があるのか？
1969	子供が接種したあと同級生のお母さんから「副作用があるから打たない」と聞かされ不安でショックでした。集中力がなく連休(4日あったとして)1日中家で座ったまま終わっても1つの課題しか手をつけなかったり、眠いのにもボーッとして毎日のように1時すぎ、時には4時頃まで(朝の)起きて、体内時間が狂っていることや、視力が落ちたこと(0.1?)検索していてワクチンを接種した方がガンになりやすいとか、日本人の型に合わないワクチンだとか、14才で打ったら早すぎたんじゃないか？と思うこと、いろいろ心配しています。接種した子供を重点に調べて頂きたいと思います。
1970	3回目に打った時に、外出をしてしまったら、発熱してしまった。(特にかぜはひいてなかったのに)
1971	(保護者より)質問4の⑥風しんについては、母子手帳に記載がないので、確かではないのですが、中学校の時に、接種の案内をいただいたような記憶があって、記入させていただきました。もし、当時対象者ではなく、案内のプリントをいただければ接種していません。よろしくどうぞお願いします。返送が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
1972	子宮頸がんの予防接種のとき、とても痛がっていたのを覚えています。今までうけた予防接種とはけた違いでした。
1973	本人は、打った方の腕があがらないと言った。(1回め)

1974	ひどい副作用のニュースを聞き、恐くなった。何事もなくよかったと、申し訳ないけれどホッとした。姉は受けさせなかった。
1975	いろんな情報が耳に入って、すごくこわかった！！もう少し説明があっても良いと思いました。注射すごく痛かったです。
1976	どんな予防接種でも多かれ少なかれ副作用はつきもので、ほんの少数の原因不明？の症状のために今回の調査等、余分に税金を使うのはやめてほしい。
1977	H6.3月生まれの姉は実費で3回子宮頸がんワクチンを接種しました。副作用については当時あまり(ほとんど)発表されていなかったように思います。強く推奨されていたのでわざわざ実費で接種したことを覚えています。後にたくさんの副作用の症例が紹介されたのでびっくりした記憶があります。姉と同様に妹も接種をしましたが、無料だったので助かったと思っていました。ひとつしかない大切な命なので、予防接種は安全性がしっかりと確認されてから実施すべきだと思いました。
1978	しきゅうけいがんの注射やった後、半分から上いうでがあらなくてすごくいたかったです。
1979	遅くなり申し訳ございません。よろしくお願ひ致します。
1980	非常にはれて、痛かったので心配になった。
1981	3回打ちましたが、受けるのを忘れていて、1回目と2回目の間が半年ほどあいていました。
1982	痛みがひどく3回目を接種した後は体がぐったりしたので●に確認したら1週間は様子を見るように言われた。翌日は正常だった。
1983	注射がメッチャ痛かったと言っていました
1984	接種後、指先が痛くなった。数日間痛みが続いた。
1985	今、初めて2種類のワクチンがある事をしました。正直、何も疑う事なく受けさせたので、副作用の事を聞いて驚いています。子供の事なのでもう少し慎重に接種していいか判断して欲しいです。
1986	サーバリックス1回目接種後、めちゃくちゃうでが痛くなり部活に支障がでた。数日痛んだ。2、3回目も痛みがあったが1回目ほどではない。
1987	子宮頸がんワクチンが曖昧な対応で終わったので、受ける必要はなかったのではと後悔しています。この子だけ接種し、上の子と下の子は接種するのが怖いので止めました。
1988	副反応が解決したら、再接種を希望します。1回目接種から期間があいてから、2回目接種の予約をしようと思いましたが、病院から拒否されました。
1989	とにかく頭痛がひどい
1990	今のところ別に異常はありません。
1991	生理不順(無排卵)で本当にとても悩んでいます。因果関係はありますか？
1992	サーバリックスの接種後数日は筋肉痛のような痛みがあったようです。
1993	アンケートの症状の例があまりにも日常的な症状で、予防接種を受けてからの症状かなどわかりづらい。例えば 皮膚が荒れるやからだか痛むなど、もともとあった気もするし、そうでない気もするし、ただ日常生活に支障はない程度なので、なしの回答にしました
1994	接種してから3年経ちますが、テレビやニュースでこのワクチンの話になると大丈夫なのか気になってしまいます。今回のアンケートをもとに、もっともっと調査の結果やワクチン接種に対して、国や厚生労働省がきちんとした結果をもとにして、ワクチン接種を進めてほしい(母解答)(今まで予防接種で、日本脳炎と水ぼうそうのワクチンで副反応が出たことがあります。子供3人の内2人に)
1995	子宮頸がんワクチンを接種後、午後から接種した腕が重くなり、腕が上がらなくなりました。2回目は1回目ほどではありませんでしたが、少し同じ症状はありました。その後はいろいろな情報を知り、こわくなり、3回目は接種をやめました。今もワクチン接種をしたことでつらい症状に苦しんでいる方のため、どうかアンケートの結果を出して役に立ててください。
1996	子宮頸がんの後遺症への補助金を愛知県でも何都市かが配布していましたが、どうして、名古屋市は補助金をださないのですか？
1997	子宮頸がんワクチン接種翌日は熱が出て学校を休んだことがありました
1998	子宮頸がんワクチン1回目を接種後、接種した所が大きく腫れて痛みがあり、数ヶ月間痛みとしこりのような物ができていた。痛みのひどい時は少し膨れただけでも痛く、激痛がありました。
1999	予防接種は体調の良い時に接種しました。又、接種後は自宅でゆっくりできるよう予定に気をつかいました。子宮頸がんワクチンについては、接種した医院も注意深い対応をしていたと感じました。①来院30分前にTELで連絡する→ワクチンは冷凍保存されている為、常温に戻っていたようです。急に冷たいワクチンが体内に入る事により、びっくりしたり、ショックが出るのをふせぐ為。②接種後も30分は院内で様子を見る。現代は親子ともども忙しく予防接種をきちんとうけるのはスケジュール調整と体調管理がむずかしいと感じます。患者の皆様は不安な事でしょう。IPSで患者の皮膚から症状を再現し原因をつきとめる事は出来ないのでしょうか？
2000	今回の調査に協力したいと思いますが、中2頃より不登校、学校や家庭内での反抗、リストカット等ここ1～2年は家族に姿も見せずに引きこもっており、身体が状況が把握できません。ワクチンとの因果関係があるのか不明ですが、今、保護者のわかる範囲での解答しかできない事を恐縮する次第です。

2001	3回接種しましたが、娘の友達から思ったより注射が痛い等の情報を聞いていたので、娘も不安が大きかったらしく、1回目の接種の時は、接種後、気分不良、血圧低下がありクリニックで休ませて頂きました。2回目接種するかどうかその時悩みました。
2002	報道をみて心配でしたが、接種した後、1週間程、腕が痛かったり、だるい程度で治ったので 3回とも受けました。
2003	なぜ実家にこのアンケートが届かなかったのでしょうか。ハガキが届いて初めてこのアンケートの存在を知りました。もっとしっかりと行ったほうがいいのでは？
2004	子宮頸がんワクチンを2回接種した時に、副作用の報道が出ました。接種を受けた小児科の先生に、3回接種しないと意味がない。副作用はよっぽど大丈夫だと言われ3回目を接種しました。副作用は今のところ出てないですが、今後副作用が出る事があるのか知りたいです。
2005	他のワクチンより 注射のあと(腕)を痛がっていた。
2006	本当に苦しんだので(今も苦しんでいる)きちんと原因をつきとめて、よくないのは確かなので何かしらのきちんとした発表をしてほしい。
2007	子宮頸がんワクチン接種について接種後、部位がかなり痛くて不機嫌でした。一週間ほど続いたので打つのがいやだったようです。
2008	質問項目2のところに記載しました。現在、このアンケート対象の子供以外に、小学3年生の娘がいます。ワクチン接種の安全性が確立されるまでは接種できませんが、正しい情報の広報をよろしく願います。
2009	海外の接種者と同様全く、副作用を思わせる症状は認めませんでした。不幸にして何らかの症状、後遺障害の生じられた方々の一刻も早い回復をお祈り申し上げると共に、ワクチンがより安全かつ着実に実施され、海外と同じ疾病予防対策が確保される様、希望します。
2010	今回の名古屋市のアンケート、とても感謝しています。2回目の接種後すぐ白目をむいて失神しました。幸い前方に倒れ医師が受けとめてくれたので、頭を打たずにすみしました。2～3分後意識が戻り、1時間程病院のベッドで休みました。今まで数多くの予防接種をしましたが、こんな事は始めてでした。癌での死亡率の方が副作用より高いと、3回目の接種を医師に勧められましたが、副作用の事が報道された時期で、怖くて打たせられませんでした。国には早く原因を特定し、指針をはっきり示してほしいです。がん予防か副作用かの選択を何の知識もない親がしなければならないのは酷です。うちには下に中1の双子の女の子もいます。宙ぶらりんのまま、接種せずにいます。
2011	これから、どのように対応していけばよいか不安ですわかりやすい情報提供をお待ちしております。
2012	子宮頸癌ワクチンを受けた後の症状なのかどうかははっきりしない為、答えられません。
2013	名古屋市は無料だし、当たり前のように接種をしました。3回接種後、娘に副反応が出なくて、本当によかったと思います。時期が遅ければ連れて行ってないと思う。
2014	接種を迷っていた頃、担任から「未接種は良くない、早く受けなさい。」と言われたと子供から聞き、接種しましたが、今となっては悔やまれます。このまま月経不順が続き、妊娠が難しくなったとしたら、治療法はあるのでしょうか。どう救済措置をとるのでしょうか。
2015	3回とも接種を受けました。今は何も無くても、今後、何か起こる可能性はありますか？(特に妊娠、出産時に)妊娠 出産に影響はないですか？
2016	今、思えば接種しなければよかったと思っています。副作用の事はわからないが予防できると病院から進められたので接種してしまっ
2017	3回接種した直後に、軽い手のしびれ、ふるえが半日程あった。すぐおさまったので受診はしなかった。いろいろな不調があった事が、ワクチン接種と何らかの因果関係があったのかもしれないと考えて、不安で恐ろしい気持ちになった。現在日常生活に無理はないが、少なからず影響があったと考えられ、安易に接種してしまっ事を後悔し、申し訳なく思う。
2018	子宮頸がんワクチン接種後は、他の予防接種よりも接種部位が腫れ、かなり痛みもあった様です。
2019	2回目接種後に勧奨が中止になり、3回と決められていた回数を打っていません。途中でやめてしまったことで、なにか悪影響が出ないか心配です。また、もし再開された時は、どのように接種をしたらいいのか わからず不安です。2回でも効果はあるのでしょうか？ 今後は3回目として接種できるのでしょうか？ 途中接種だった人にも今後どのようにしたらいいのかをお知らせいただきたいです。よろしくお願いします。
2020	子宮頸がんワクチンを初めてうった時、痛みで腕が1週間ほど上がりませんでした。
2021	子宮けいがんのワクチン接種後、3カ月して甲状腺の病気になった。家族にはだれも甲状腺の病気の人がない。大学病院で、私と同じような人がいると聞いた。子宮けいがんワクチン接種と甲状腺の病気の関係を調べてほしい。
2022	ワクチンはしっかり臨床をおこなった上で実用にふみきるべきだと思う。補助金まで出して、積極的に推奨したあげく、逆に不安を与えては、何も情報を得るすべのない市民には、何を信じていいか疑心暗鬼になってしまう。

2023	注射は思った以上に「すごく痛くて嫌だ！」と言っていた。正直、痛みに強い(我慢する性格)娘からの訴えに、毎回異状がないか娘のことをそれまでの予防注射の時よりも数倍気にして見守り続けていました。幸い娘は普段通りの生活を送っていますが、今の情報を知ることができていれば、接種しませんでした。この時期は、ネットで調べても、保健所2か所に電話で問い合わせても、悪い情報は何ひとつありませんでした。
2024	今回とても不安です。大きな症状はまだ出ておりませんが、めまいやおりもの、手足がつめたい、突然視野が暗くなったりした経験があるなど、今後このような症状が進んでいくときまります。しっかりと調査をして欲しい。そして必ず結果を正しく、うそがないよう全国民に報告をして下さい。私達で実験させている様でとても不愉快です。
2025	私は特に何の症状も起きませんでした。2回、3回と回数を重ねるごとに注射を打った場所が3、4日痛みました。腫れは接種1回目の時だけ起こったと思います。
2026	周りの子供さんが1回目受けた時に失神した子がいたので、受けるのかどうかは少し不安でしたが、1回目は何事もなく、2回目は次の日に熱が出て、目眩があったりで、病院に通院したりしました。いろんな報道をみていると、子供も私も副作用で足が痛くなったのかも・・・と不安に思っている所もあります。国が推奨していただけない、今後のこともあるので、もっと安全性を明確にしてほしい。
2027	子宮頸がんワクチンの1回目が風疹などの予防接種に比べ、かなり痛みがあった。(泣きたくなるほどだった。)第2・3回目は1回目より痛みは全く自製内。
2028	娘は特に異常はなかったが、大変な状態になっている方がいるので国として安全な決定事項を案内してほしい。
2029	子宮頸がんワクチンの注射が痛すぎた。
2030	ワクチン接種にはなかなかふみきれない。定期的に3回接種のうち、1回しか受けていないのであと何回必要なのか、時間があっても効果があるかどうかとわからないことも多い。検診+ワクチン接種の必要性はわかっているけど、副作用の怖さはある。
2031	子宮頸がんワクチンと関係があるかわかりませんが、接種後、胸にしこりができて、婦人科で診察を受け、線維腺腫と診断されました。特に治療はしていません。(高3の時の話です)
2032	接種前に娘とかなり悩み話し合いました。信頼できる小児科医や婦人科医に相談したところ接種をすすめられたので・・・しかし今は娘に接種させたことを後悔しています。接種後に娘におこった異常がこのワクチンが原因であれば親として、とりかえしのつかない事をしてしまったと思ひ毎日不安で仕方がない。医師に相談したところ、メンタル的な問題だと言われて、現在メンタルクリニックに半信半疑で通院しているが、全く症状は変わらない。今後他の症状も出るのでは？との心配もしている。調査結果だけでなく一日も早くこのワクチンについてはっきりと解明してほしい。
2033	周囲には、副反応で苦しんでおられる方は居ませんが、報道により、大変な状況になられている方が多くおられ、予防接種との因果関係を早急に解明、対処していかねばいけません。また今後も、このようなことを繰り返すことのないよう、厚労省、健康、保健医療に関係する各所では、慎重にすすめていただきたい。農薬(残留)、添加物、薬剤、様々なことが心配で、「安心、安全な日本」などという言葉は、幻想でしかないように感じています。
2034	子宮頸がんワクチンをうった後、2、3日接種した腕が痛かった。
2035	アンケートが分かりにくいです。
2036	痛くて腕が上がりませんでした。
2037	同じ年頃の子供を持つ親からすると、この件はとても心配しました。うちの子は何もなかったから良かったと素直には思えません。どうか親子で大変な思いをされている方たちに、何かいい方法で支援をしていただきたいです。
2038	子宮頸がんのワクチンを接種したのが5年程前になるので、同時期かわかりませんが、中学生の頃倦怠感や朝が起きられない、頭痛、腹痛など症状があり通院したことがあります。その時は成長期に伴う自律神経からくるものだと診断でした。
2039	子宮頸がんワクチン接種時、海外(ドイツ、フランクフルト)在住だった為 現地で接種しています。
2040	3回目接種時に失神、痙攣が生じた。
2041	”副作用が全く出ない”または”副作用に気づいていない人”はいるのか少し心配になりました。ニュースでは副作用の話が多いので・・・。
2042	H6.9.21生で 名古屋市から無料の助成を受け3回接種しました。
2043	1回目の接種後も、友人の同級生が大変なことになったと聞き、迷ったが、期限から延長期間もあり、あせって接種した。少しでも数が挙げればもっと早く報道してほしいと思った。男性の方にも注意してほしい。
2044	ワクチン接種後、上腕(接種側の)がパンパンに腫れて、痛かったです。
2045	子宮頸がんワクチンを接種した後(特に2回目、3回目)に39℃前後の発熱をしたことがあります。
2046	子宮頸がんのワクチン接種後にTVなどで副作用の報道が連日ありましたが うちの娘は副作用は出ませんでした。
2047	背中、胸などの肌が荒れました。
2048	すごく痛くて何日もはれた。

2049	ワクチンを受けた部分にしこりを感じました。今はありませんが、当時は触れると少しだけ痛かったです。
2050	2種類あるのもしらなかつたし、説明もない。国からすすめたのだから、もっと、慎重にすすめてほしかった。大勢の人が後遺症になっているのを聞いた時、親として何かあったら、どうしようと、不安になった。予防接種に対して本当に必要かどうか疑問に思ってしまう、国が進めたものに信用がなくなった。
2051	生理痛が寝こむほどひどく出血も多いみたいですが、それも子宮頸がんワクチンの影響によるものか、しらべてもらえますか？
2052	痛かった。
2053	私は特に何も症状や痛みなく受けれました。
2054	筋肉痛になったが、2、3日したら治った。
2055	母・娘とも家を離れている為母子手帳がありませんが3回目だけ覚えています。公的な必要なワクチンは期間を必要なだけあけてすべて受けています。
2056	体調不良のため、2回目をやめました。
2057	現在中1になる妹(次女)がいます。長女には、副作用がでませんでした。かなり注射は痛がっていました。副作用との因果関係がはっきりするまでは、次女への接種は、ためらわれます。対象者の無料接種期間を延長することは、できないでしょうか。
2058	副作用の報道がある前に接種が終わっていたため、多少不安がありました。日々の様子をみている範囲では、特に問題はありませんでした。又、上の子は3才違いですが、同じ時期に自費で子宮頸癌のワクチンを接種させましたが、副作用の症状はありませんでした。回答が遅くなり、申し訳ありませんでした。
2059	2年前頃から、体調不良が続き、良く学校を休むようになった、朝起きる事ができず、夕方まで寝ている事もある。ワクチンが関係あるのか考えてしまう。何かわかれば教えて欲しいです
2060	体調が悪くなった事がワクチンの影響なのかと考えてしまいます。日常生活で大変困る事が多いのが事実です。
2061	母親の私は小児科の看護師をしています。サーバリックス・ガーダシルどちらもですが、接種時の痛みはかなりつらいようで中学生であっても悲鳴を上げるお子さんがほとんどでした。泣き出す子もありました。こんなに痛みが強いワクチンは見たことがなかったので、逆に大丈夫なのかという思いもありました。
2062	ソフトボール部だったが接種した腕がはれ、痛みがあり、休んだor見学した。
2063	子宮頸がんは、●クリニックで3回間違えず接種済みです。今現在、変化はなく、異常なしです。
2064	遅くなりまして申し訳ありません。よろしくお願ひします。
2065	この予防接種(サーバリックス)のあとは、まわりのみんながびっくりするぐらい接種部位が広範囲で腫れ、本人も腫れている間、だいぶ痛がっていた
2066	母子手帳が現在出せない所にある為、ワクチン接種の時期がわからず、申し訳ありません。大変提出が遅くなり、申し訳ありません。
2067	痛すぎて2日ぐらい腕があがらなかった。
2068	かなり痛くてはれた記憶があります。
2069	郵送する気持ちが薄く、記入も適当にしていたのですが、名古屋市の独自に調査されることを知り、その取り組みに敬意を払うべく、遅れましたが提出させていただきます。正直言って国のやることは信用できない部分が多く、これは厚生省関連においても昔から度々感じて来ました。これからは各自自治体の負担が大きくなると思われませんが、ぜひ安心して住める街、名古屋としての手腕を発揮してください。期待しています。
2070	我が子は現在までいたって健康そのもので まったく異常なしです。
2071	接種後、痛みが続いてました。(うで)他の予防接種より、痛みが強かったと言っていました。
2072	接種した後、今まで経験したこともない程の激しい頭痛に襲われた。必ず打たなければならないと思い、とても怖かったが3回とも接種した。
2073	次回接種が必要な時期が来るまでに、副作用についてはっきりさせてほしい。
2074	ワクチンをうったあと、他のワクチン(インフルエンザなど)よりとても痛かった覚えがあります。
2075	子宮頸がんワクチン1回目を接種して、数日後(はっきりと覚えていない)に、体がだるいと言ったことが1度あります。その時に足のひざが、ガクガクする感じがすると言っていました。我が家では、体調が悪いと赤ちゃんのときから整体へ行っていて、その日も整体へ行き、その後は症状もなくなりました。ワクチンとは、関係あるのか、ないのかは、わかりませんが、接種した日も近かったので、ずっと気になっていました。今はとくに何も体調が悪いことはないのですが、こういうことがあったということだけ報告しておきます。(病院もとくに行っていない)
2076	今ごろ？という印象です。まさか、このような事になると思っていないので、慎重に様子を見て来たわけではありません。見過ごしていることもあるかもしれないのに、今さらアンケートと言われても困りますね。

2077	子宮頸がんワクチン接種直後は、異常な症状は出ていないと思って生活していました。年が経過したらテレビで、接種後の症状が出たとのことを見て、後から、もしかして、うちの子もそうだったのかな？と思うようになった。小～中学～高校への生活環境の変化で体がついていってないと思っていたのですが、今回のアンケートで、接種したから？と少し思いはじめてます。
2078	子宮がんにかからない為の予防として受けましたが、副作用はかなりショッキングではありました。確かに有効とわかるのも、随分、先のことだろうと思うので「やってよかった」と笑える日がくるものであってほしいです。
2079	子宮頸がんワクチンの副作用で、いろいろと報道され話題となってからは、いつも心配です。
2080	何の効果もない薬を時間をさいて、受けに行ったことが後悔ばかりです。学校や医者から強く言われしぶしぶやったのが、大変な目にあってる人がいるなんて、国の医療事業のことは一切聞くのをやめることにします。無料ほど怖いことはないですね。
2081	筋肉注射でとても痛いようです。何か改善策があればと思います。重症症状が出てしまった方々への早急な対応を望みます。娘が接種して、2、3日してから報道を観ました。血の気が引く思いです。他人事とは思えません。
2082	注射が倒れそうになるほど痛かった。気分が悪くなるほど痛い。腕がパンパンにはれ、1週間ぐらい上がらなかった。
2083	①～⑦(P6)の予防接種は、ほぼ全部受けていると思いますが、母子手帳が行方不明のため接種時期がわかりません。申し訳ありません。
2084	3回目の子宮頸がん注射を受けた翌日に発熱(38.5℃位)しました。受診した所おそらく注射の副作用でしようと言われました。熱はすぐに下がりました。子宮頸がんワクチンを受けてよかったと思っています。
2085	現在も通院、心理療法を継続中、いったいどこに相談するのがよいか？入院中、現在もこのワクチンの影響という検査などはあるのか？
2086	病院の診断⇒結節性紅斑、再発するH24～今までに3回
2087	名古屋は無料接種なので助かりました。娘がもう一人いるので、副作用も気になりますが、無料なら接種したい
2088	注射で3日間うでが上がり、部活を休んだ。4日後は通常に戻りました。全ての子供達が副作用で苦しめない事を願います。
2089	学校のみんが痛い痛いと言っていたからこわかったけど、逆におどされていた分、痛くなかった。
2090	子宮頸がんワクチン接種後 うでがだるかった。うでがだるかった。2～3日間。
2091	子宮頸がんの予防接種(何回目かは覚えてませんが)を受けた翌日ぐらいい気分がわるくなり、吐き気と腹痛で立てなくなるほどになった事がありました。その時は風邪だろうかと思って病院にも行きませんでした。今となってはあの時の予防接種が影響してたのではないかと心配です。そのあとも生理不順で1～2年婦人科に通ったり(生理が何ヶ月も止まらなくなり)して、年頃の子には良くあると生理を正常にする様に薬を処方してもらったりした時期がありました。今は月に1回くらいのペースでくるようになりましたが生理痛はかなりひどく生理前には口が血の味がするくらい気分悪くなると言ってます。
2092	子宮頸がんワクチンの2回目の接種の後、副反応の報道をみて3回目の接種を見合わせています。その後、接種が再開されるようになった場合、3回目の接種のみでいいのかわからないので指針を示していただきたいです。
2093	ワクチンの説明をもっと丹念に見るべきだったと思っています。子宮頸がんワクチンを途中でやめた事はよかったと思っています。
2094	19才秋頃から 体調がすぐれず(疲れやすい)、20才の4月に甲状腺亢進。バセド一病と診断されました。現在も●を服用中です。
2095	1応3回は受けさせましたが、2回目を受けさせた後で1ヶ月位痛みが続いたらしく、3回目を受けようとしなかったので、無料で接種できる時期を1ヶ月過ぎてから無理やり連れて行って3回目を有料で受けさせたので、もし子供に何か障害が出てたら今頃ものすごく後悔していたと思う。ひとつまちがっていたらウチの子供だったかもしれないと思うとぞっとする。
2096	接種後、上記のような様々な症状が出て、現在も続いている症状もある。医療費もかかっているの、国や自治体で負担するべきだと思う。リスクのあるようなワクチンの接種をなぜ勧めたのか？国や自治体に責任がある。
2097	子宮頸がんワクチンの件ですが、母子手帳を見てもどこにも記載がありません。間にあわないのでこのまま提出させていただきます。遅くなりすみません。
2098	ワクチンを接種してから時間がたっているのでも本人もよくわからない所があった。本人しかわからない症状などがあるので、保護者だけでは書けないと思った。テストなどでなかなか時間が取れなかった。遅くなって申し訳ありませんでした。
2099	子宮頸がんワクチンを接種したら、体が徐々にだるくなり、痛みも生じてきました。

2100	現在、娘には重い副反応はでておりませんが、将来何があるか不安です。子の件を取り扱った番組も娘は恐ろしくなるのでみることはできません。国を信じて娘のためと思い痛い思いをして接種した結果がこういった事態になったことは非常に残念です。今後も何を信じていいかわからなくなりました。
2101	接種してから1週間から10日ぐらいだったと思いますが、注射をした所がひどく痛いと言っていて数日は、親としては「はれているのか」と思った感じがあります。
2102	”インフルエンザの予防接種”2～3度受けたことがあります。隣人、妹はお風邪の症状になり、帰って体調が悪くなるので、ここ数年接種していません。(全て●クリニックにて不備がありましたならお問い合わせ下さい)
2103	副反応はありませんでしたが、本人があまりに痛がるので1回でやめました。
2104	子宮頸がんワクチンを受ける前に副作用がおこる時もある事をもっと説明すべきだったと思う。政府は子宮頸がんの防止をという考えだったけど、親は危険なワクチン接種は望んでいない。
2105	本当に必要な接種なのかどうかと思いつつ、娘に接種させてしまいました。大変問題になっていることを後日知り、娘に大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。下にもう1人娘がおりますが、接種を見合わせるつもりでおります。散り返しのつかない作用がある以上、接種勧奨すべきではないと考えます。
2106	ちょうどそのころ学校にいけなくなり車で送り迎えをしました。ひどい時は学校にいけなかった。高3年の9月で学校をやめてしまい途中から通信の自宅学習+学校登校でかろうじて高校卒業した。ワクチンが原因とは思いますが、学校でいやな出来事が大きかったのだと思う。心の病院にも通ったが回復せず学校に居づらくなった。
2107	子宮頸がんワクチンと関係あるでしょうか？今でも生理痛がひどいです。接種後は、1週間ほど、気持ち悪さ、ダルさがありました。
2108	大学3年生(成人した子)の記録を記入するのはかなり難しかったです。(母子手帳に予防接種の記録はあっても、病院によって和歴になっていたり、西暦になっていたりするので、接種年月日が、不明なものが多々ありました。)
2109	子宮頸がんワクチン接種後、何週間か、頭痛や腕のダルさが続いた。その後、今現在は、普通に元気です。
2110	3回目接種後(子宮頸がん)熱がでました。
2111	友人が2人、接種後、体調を崩してしまった。
2112	もし万が一の事があつたら、今からずっと親に迷惑かけることになるので心配になった。安全性が高まれば(リスクに対する補償も含めて)接種したいと思います。
2113	とても残念です。1日も速く原因を解明していただきたいです。私の母も子宮頸がんて病院へ検査へ行っています。遅くなり本当に申し訳有りませんでした。
2114	解答が遅くなり、申し訳ありません。子宮頸がんワクチンが開始された比較的初期の頃に接種し、副作用の危険性に関する情報は知る限りでは全くなかったどころか、推奨されていました。そのため、何の疑問も持たず、将来的に病気のリスクを下げるこたができるなら、という思いで娘に接種をすすめました。のちになって副作用のことが報道され、人ごとではないという思いです。安易にワクチン接種することは危険だという認識を今は持つようになり、今後はワクチンというものを避けたいと思います。
2115	当時はあまり情報がなく、娘のためと受けましたが、もし、今だったら怖くて受けないと思います。考えてみれば私も受けていませんが、発病していないからです。
2116	兄姉が、アレルギーがあり、ほとんどのワクチンをうけず、乳幼児期をすごしてきたため、元気に育ててからワクチンは自費(泣)で接種した。
2117	返答が大変遅くなり、申し訳ありません。子宮頸がん予防接種との因果関係なのかはわかりませんが、時期的に、接種を受けた頃から高校への登校が困難になりました。身体的な症状と、精神的な症状が現れたためです。調査の結果を待ちたいと思います。
2118	健康状態への配慮の為にワクチン接種を一時止めているというのは正しい判断かと思えます。ですが将来的に自分の娘にも子宮頸がんの恐ろしさから少しでも守ってあげたいと思っております。医療の発達は勿論、市の皆さんの協力も必要です。子宮頸がんワクチンをもっと気軽に接種できる未来に期待をしています。
2119	子供の同じクラスの友人はサーバリックス接種後、神経系に異常が出て、名古屋、信州、仙台と病院をたらい回しにされ、予防接種とは関係ないと認めてもらえず、学校生活にも影響が出ましたし、本人も勉強や生活に意欲をなくし、母子関係も悪くなりひき込みりのような浪人生活を送っています。因果関係はないと言われ続けたのにこのような大規模調査をいまさらされても、彼女の学生生活、これからの人生を台なしにされたことは元にはもどりません。もっと、早期に実態を正確につかんでほしかったです。そして体調だけでなく、生活そのもの又人生そのもの影響をうけた補償を今後検討していただきたいです。
2120	腕が腫れたが3回打ちました。
2121	十分な免疫をつけるために3回の接種が必要と書いてあり、名古屋市で進めていたので、3回目が部活動の休みが無く、実費で支払ってまで、接種したのに、副作用の報道を見て・・・ワクチン代が必要だったのか？回答をください。

2122	今回この接種で2種類の薬のうちで、サーバリックかガーダシルどちらで受けた方の人に体に悪い症状がでたのかどちらが何%多いのか自分が受けた方の方はどうなのか心配です。(今でも受けたことが大丈夫だったのか心配しています。)(今回のアンケート結果で公表される時にどちらの方が体に悪い症状がでたのかも教えてください。)
2123	今まで受けたワクチンの中で一番(腫れ感 だるさ)は有った(本人より)(サーバリックス)
2124	特に異常はなかったと思います。
2125	頭痛、だるさありました。アンケートが書きにくいのでもっと簡単にしてもらいたい。
2126	非常に強い行政からの絶対にワクチンを接種するよという広報があったように記憶しています。その後、名古屋でも、無料接種となり市長が接種を強く呼びかけていました。副反応の結果、後遺症を患った女性を知り、驚きました。インフルエンザも効果がわからないままマスクは接種を呼びかけています。ワクチン接種というリスクがあるものを市長が呼びかけた結果、今はどう考えておられるのか知りたいです。
2127	子宮頸がん任意予防接種については当初、新しいワクチンであるために慎重に対応して見合わせていましたが、副反応の報告もまだなかったので、それではと踏みきった矢先に各種事例から勧奨が中止となり とても複雑な心境になりました。‘無料‘のようなPR的政策、子どもの生涯を左右することにもなるので、今後は十分に責任を持って取り組んで頂きたいです。回答が遅れて申し訳ありません。
2128	なにもわからないまま受けましたが、何も副作用や巷で言われる症状が起らず良かったのですが、ワクチンそのものには疑念が感じます。医療そのものの偏った見解や薬の意味を理解していない医師が多すぎて人を守る医療が利権のために走りすぎ、元来の医療からかけ離れていて信用できません。長女には申し訳なかったが末女にはワクチンは打たせ薬も使いたくありません。後悔しています。
2129	接種時はまだ事例がなく、デメリットを考えていませんでした。副作用はありませんでした。
2130	受ける時はすでにいろいろな事例がでていたので心配でしたが、リスクとメリットを考え、医師と相談して接種しました。幸い副作用はありませんでした。
2131	予防接種を受けたのは4年前ですがその後、体の変化はありませんが大丈夫なんでしょうか??TVで接種をすすめる呼びかけ等があり、義務なのか??と思う程でした。受けた人に対してその後はこのようなアンケートだけで終りにしてしまう国の対応に疑問を感じます。
2132	1回目がとても痛かったので、痛くない注射にしてもらえると嬉しいです。
2133	1回目に接種後、視野が暗くなった。少し休んでいたら、治ったが、2回目の接種の際の副反応がどうでるのか、少し心配になった。2回目の接種後には、副反応は見られなかった。2回目の接種後副反応が強くていたら・・・と思うとこわいと思った。
2134	接種するのに名古屋市の補助が出るという事で接種を受けました。その後、安全面に問題があると言われ、打ってしまった以上、不安はぬぐえません。不妊になると聞いた事もあり、この先心配です。
2135	予防接種、進められるまま接種してしまいましたが大丈夫でしょうか。生理不順です。普通に妊娠できるのでしょうか。元気な赤ちゃんが産めるのでしょうか。安心できる情報をお願いします。不安、心配です!!
2136	もともと、月経不順、月経量が少なめで不順が年齢があがって良くなってきた所で予防接種して、またまた月経不順が悪くなった気がします。言われるまま打ってよかったのか・・・この後、心配です。予防接種受けた女の子達が普通に妊娠、出産できているのか知りたいです。とても不安です。
2137	副作用がでた方が大変な状態である事を目にします。どうか完治するまで補償をしてあげて下さい。
2138	高額ワクチンなので、補助があるとわかった時は大変有難く思いました。市のおすすめでしたので、何の疑いもなく、接種しました・・・今、TV等で後遺症のある方々を見るたび、本当に恐ろしい・・・と胸が痛いです。ひょっとしたら我が子もそうになっていたかも知れない。一生をだいなしにしてしまった・・・国が!!何より日々、苦しむ我が子の姿を見ている親御さんはどんな気持ちでおられるのか。自分を責めて、責めて悔やんでいるはずです。何故こんな不確かな予防接種を行政が推進していたのでしょうか?本当に疑問で、本当に恐ろしいです。後遺症の残っている方々に、手厚い補償を強く望みます。
2139	副作用・・・痛みが強かった。
2140	母子手帳が見つからず、ワクチン日付がわかりませんが姉妹と同時期に受けたため、子宮頸がん、インフルエンザ等だけ日付記入しました。
2141	子宮頸がんのワクチンを接種後熱と腕の痛みがありました。熱は1日、腕は3日ほど続きました。
2142	子宮頸がんワクチン接種後、発熱(38℃程)
2143	接種後2～3日腕があがりませんでした。特に副作用はでませんでした
2144	3回目を接種する前日に子宮頸がんワクチンの接種報道があり取りやめましたが、その後国(県)からも何の連絡もなく、我が子は今のところ何の後遺症もないが、ある日突然、何らかの後遺症が出た場合、責任の所在はどこにあるのか?3回受けて後遺症が出た人、2回で取りやめて、数年後に出た人などさまざまな例があるのでしっかりと責任の出所を公表してほしい!!
2145	子宮頸がんワクチンを打っても副作用はなかった。押すと痛いという小さな痛みが続いたが、生活に支障はなかった。

2146	子宮頸がんワクチン接種が無償化されたので、すぐに娘に接種させました。副作用については、全く考えてもみませんでした。幸い、娘は、何も副作用が出ていませんが、同年代の娘さんに副作用が出て、学校にも行けなくなったり、大変な事になってしまった様子をTVや新聞で見るたびに胸を痛めています。どうか、ワクチン接種で、副作用が出てしまった方達に、医療費等の助成をお願いします。
2147	特に副作用、反応などなく元気に過ごしています。
2148	サーバリックスを接種した後、毎回直径5～6cmに赤く腫れた。普段インフルエンザ等でも腫れるのであまり気にしなかったが、サーバリックスの場合は1ヶ月程度腫れ、固くなった。後から思えば、副反応がしっかりとでていたんだと思います。
2149	副作用かどうか？どこに問い合わせをしたらよいのでしょうか？
2150	特に後遺症はないのですが、調査をすることはとても重要だと思います。全国で初めてこの調査はとも評価します。
2151	四日市在中にすべての予防接種を受けているので種類が違うのかも知れません(DT→DPTでした)
2152	高校2～3年くらいより頭痛がひどく学校を休むことはありました。不登校だったので、言い訳なのかわかりません。
2153	痛み(副作用)が強かったです。
2154	接種後、今まで打ったものの中で一番痛いと言っていた記憶があります。2～3日腕があがらないと痛がってました。
2155	回答が遅くなりすみません。届いて開封したものの、ワクチン接種の時期の記入が面倒で後回しになりました。「手元に母子手帳を用意すると記入が簡単」というような一言があればアンケートに答える人も増えるのにと思いました。
2156	ワクチンをうけたが問題なしでした。
2157	1回目は、偶然土曜日に接種しましたが、接種部位の大きな腫れと体のだるさ、疲労でシャワーも浴びることもできずに、寝込んでいました。翌日も丸一日同等でした。2回目の接種もすでに予約がとっており、副反応の件も伝え不安を伝えたのですが、接種しないことの方が高いと看護師に言われて、接種しました。3回目からは予約はとらず放置しました。でも時期がきた頃に病院から電話があり看護師のすすめで結局接種しました。1回目からもすでに相当迷っていて、中学の先生に接種のすすめのプリントを頂いて接種することにしてしまいました。普段からとても尊敬していた中学の先生がすすめてくれたからです！！現在、将来の夢に向かって、彼氏もつくらないまま日々勉強に精進しております。接種は必要だったのか、今更だけどいろいろ考えさせられます。
2158	接種後、新聞テレビ等で副作用の症状を知りとても怖かったです。
2159	子宮頸がんワクチン後、2～3日体調がすぐれませんでした。友人の中には接種後失神した人もいて接種することを迷いましたが唯一ワクチン接種で予防できるガンだと言われていたし母にも説得され受けました。自分なる可能性もあったかと思うと怖いです。副反応で苦しんでいる人をニュースで見ても良くなることを、きちんと治療が受けられることを願います。
2160	何も問題ありませんでした。
2161	子宮頸がんワクチンの副作用で苦しんでいる方の記事を目にするたび人ごととは思えず、行政に憤りを感じます。健康は戻りませんが、最大限の補償をするべきだと思います。
2162	3回目接種後は、2、3日風邪のような症状があり、体がだるいと言っていました。ニュースで騒がれていた時期だったので、毎日、体の変化もチェックしていました。変化なしでした。(風邪をひいていたのか、よくわかりませんが・・・)
2163	H23と記憶しています。公費で受けられる年に、指定回数分、受けました。一番最初の頃かと思うのですが、記録がありません。少し腫れたように思いましたが、特に変わった症状はありませんでした。
2164	普段の予防接種でもいつも強めの反応が出ます。三種混合は大きく皮フがただれて先生が保健所に連絡するほどでした。それがあっての子宮ガン接種でした。やはり腕がおどろくほど腫れあがり、再診しようか迷いました。数日過ぎるとおさまりました。その後、症例を聞いて、予防接種の怖さが認識不足だったなとおもいました。
2165	生理痛が重すぎるため、起きていられない、または痛みで失神することがあった。市販の薬も過剰接種気味であったので、その当時はいかなる市販の痛み止めはもはや効かなくなっていた。大学に入ってから産婦人科を受診し、子宮後屈であることが発覚し、生理不順、生理時の出血量の異常も含めて改善させるために低容量ピルを、今年の6月から服用。現在は上述した症状すべてが改善されている。
2166	中3～高1にかけて、接種しました。すでにワクチンについて問題になっており、姉が接種した産婦人科にいきましたが、接種を見合わせるようにいわれました。でも、ワクチンを調べて、ガーダシルに指定して接種することにしました。子どものお友だちからワクチンを接種と、体がすごくいたいよといわれましたが、何も副作用はありませんでした。

2167	子宮けいがんワクチン3回目接種後、腕に5cm大のしこりができ、1ヶ月程、痛みが続きました。左腕だったため、字を書いたりする事に支障はありませんでしたが、左側を下にしては寝ることができないと言っていました。事前に接種をした病院より、しこりや痛みの副作用がでると言うパンフを頂いていたので、受診はしませんでした。症状はかなり酷かったため副作用の情報がなければ、受診していたと思います。友達の中には痛みで腕を上げる事もできない子もいて、とても不安になりました。
2168	中学生のうちに接種したいと思い、2回目は自費で接種しました。市の方からお金をはらってもらえるといった制度を行うならば、打ちたい方が、打ちたい時期までに打てるようにしてほしい。返金の制度があったら・・・と思う。
2169	基本的に、予防接種は受けようと考えています。接種が取りやめになったり、再開したり・・・で我が子はどれが未接種なのか、就職等で不利益にならないかなど不安です。親としてわかりません。

## 質問6 その他、ご意見等

### ③ ①②以外(未記入等)の方のご意見等

1	平成27年6月末に米国●より祖父母の所へ、子の子として転入致しました。現在は入試の為(帰国生枠での入試のため一般の高校卒業生より早い)●の女子寮にて1人暮らしをしています。住民票は祖父母宅にあります。5才位で渡米。以上のため予防接種調査に答えられませんのでお許し下さい。祖母記入
2	本当にこの調査だわかるものですか?ついこの間も週刊誌にも子宮けいがんワクチンのことがのっていません。はっきりした回答がほしいです。
3	2回受けたところで、テレビの報道を見て中止しました。ガンも心配だし、副反応も怖いんです。どうしたら良いのか、迷っています。
4	接種後すぐに卒倒し、あごを縫う怪我をしてしまいました。子供の体を守る為に受けたはずが傷つけてしまいとてもショックです。
5	子宮頸がんワクチン受けさせたいのですがこわくてできません。
6	このワクチンは接種の必要がないと思います。
7	昔の事すぎて、質5の(2)は親・子共に覚えていません。
8	子宮頸ガンと日本脳炎の二期を打とうと思っていた矢先に副作用が騒がれ、接種をやめました。日本脳炎はそれまでの分が済んでいるので、その後、打ってなければどうなるのか?詳しい事をわかるようにしてほしいです。打つべきならば安心して打てるようにしてほしい。
9	娘は子宮頸がんワクチンを接種しなくて本当に良かったと思います。ですが接種されて大変な症状を発症された方たちが今後どうなっていくかとても気がかりです。このような方たちにどのように対処していくのか明確な回答を国はしなければいけないのではないのでしょうか。
10	子宮頸がんワクチン接種は反対です。これだけ副作用の反応が出て、苦しんでいる子供たちがいるのに、中止しないのは、本当におかしいと思います。自分の子供には、接種させるつもりは、全くありません。
11	副作用のあった方には、しっかりとした補償はしてほしい。
12	私は頸がんワクチンはインフルエンザワクチンよりも痛みはなかったです。
13	接種後、うでが3日ほどあがらなくて、熱が出た。2回目、3回目とだんだん症状は軽くなったが、おどろいた。
14	子宮頸がんになりました。(去年9月)接種は2回しか受けませんでした。副作用等の情報を耳にし途中でやめましたが、しっかり受けとけばと後悔しています。
15	私(母親)が子宮頸がんになり全摘手術等受けている為、一刻も早い結論が欲しい。接種できる年齢の頃問題となり接種出来ません。安心して受けさせる事が出来る事を望んでいます。
16	子宮頸がんのワクチンを打ったかどうかあいまいであるが、打った可能性の方が高い。テレビやネットで後遺症がひどくでている方をみてとても不安になった。しっかりと原因をつきとめ、安全なワクチンにしてほしいです。
17	副作用で苦しんでいる方がいらっしゃる事に本当に心が痛みます。我娘が(普通の生活)この様になつたら自分をせめ、つらいと思います。このような事例があるワクチンを推奨してはならないと思います。娘の場合はまだそれほど副作用のことが広く知られていなかったもので、接種してしまいました。今ならば絶対に、接種しません。ただただ副作用で苦しんでいらっしゃる方が、一日も早く好転され以前の生活をとりもどされることをお祈りします。
18	娘は今20才ですが、身体障害者のため、月経はなく、意思のそつがむずかしいので、質問に答えることができず、申しわけありません。
19	接種を受けて、色々な症状が出ている人達を、見たら、当然接種しようとは思いません。副反応で、出たといっても何も対応してもらえない。治らないなんて腹立たしく思います。
20	2回接種して、特に何も変調がなかったのと、せっかく2回したので、もう1回で抗体ができるなら、又、ガンを防げるなら、その方が良いと思い、3回全て接種しました。報道で体が不自由になってしまった子等、怖いなども思いました。
21	副反応に関して色々診ていただきたいとは思いますが、保健所へ連絡するよう裏面に記載がありますが、保健所は閉鎖的で不親切で相談したいとはいっさい思いません。また、医療機関へも子どもに恐怖心があり、受診できません。公的に『一度受診してください』ということになれば、受診する人も増えるのではないのでしょうか。アンケートのみでは、正確な数値は出ませんよ。重い後遺症に苦しむ子どもさんのことを聞くと他人事ではありません。
22	ワクチンを接種した後、すぐはれて痛かった。接種後2日目ではれも引きましたが、友人は全然はれていなかったの心配になりました。その後は特に問題ありません。
23	副作用が一時的なものではなく、体力・知力に重大な影響をおよぼしているという現状を見るかぎり、とてもおそろしくて接種させる気にはなりません。原因解明と、重い症状に苦しむ若い方々への手厚い支援を期待します。

24	娘が接種しましたが、この予防接種は必要なのですか？学校からパンフレットを持ってきたり、院内でチラシを見かけたり(MRワクチンや日本脳炎などは接種の必要ありだと思いますが)、〇歳までが無料だとか、ガンにならないだとか、良い事ばかりうたっている冊子などを見たら、「いいもののができた」と思い受けさせる保護者は多いはずです。大事に育ててきた娘だからこそ、受けさせたいと決めるんです。簡単な注意事項で済まされている副反応が出るかも知れませんという「まさかうちの子にはでないでしょう」世間はそう思っていたらうし、こんな怖いワクチンを知っていたら受けさせないです。
25	子供のためにと受けたのに子供に障害がのこるなんて少しおどろいてます。ホントに受けなくてよかったです！！(たまたま子供が注射をいやがって)
26	身体はいたって健康です。ワクチンも(ほとんど)全て受けています。子宮頸ガンワクチンを2回受けたところでニュースになりましたが、3回目を受けても大丈夫でした。
27	身体はいたって健康です。ワクチンは子宮頸がん以外は全て接種しました。上の子はニュースになる前だったので受けましたが、下の子は迷っています。
28	質問5(2)③の理由で、子宮頸がんワクチンは接種していません。一度も。もっと副反応が軽く、安全性が高くなったら接種を考えるつもりです。
29	子宮頸がんワクチンを受けた後の副反応に対する対応がひどいと思う。早く副反応だということを知ってほしい。
30	接種した後は必ず腕がはれて頭痛があった
31	子宮頸がんワクチン1回目接種後38℃以上の熱が出た。
32	ワクチン接種が無料となり、接種しようと思ったのですが、知人より、危険だと知らされ、ネット等で調べれば調べるほど、こわくなって接種しませんでした。今は、ほんとうによかったと思っています。安全性の確認(副作用等)をしっかりとって欲しいです。信用を裏切ってほくはいいです。これからの様々な予防接種の接種率の低下が心配です。具合が悪くなった方々の保証をしっかりと願います。
33	特に1回目の接種後、接種部位の腫れが通常の予防接種より強くでました。ひじまで全体が腫れ、なかなか治まらなかったと思います。2回目、3回目も1回目ほどではありませんがやはり腫れがひどかったです。
34	子供とは関係ありませんが、44才の時に私もワクチンを打ちました。大人も副反応はあるのでしょうか
35	今の所症状などありませんが、すぐに禁止(廃止)となる危険性のあるワクチンの子供に受けた上、上記のような詰問に答える人は余程のお人良しでしょうね。大変、不愉快です。しかもこんな事に税金を使うのならこちらが手数料を頂きたい位です。
36	日本脳炎では、休止期間がありました。理由(休止再か)はよく覚えていませんが？副作用の心配等がありました。経過措置もあり再開後かなりたって接種しました。残すは、第2期のみとなりました。(先のことで、忘れそうですが)接種済の方が少なく、流行しなければよいと思います。今回の子宮頸がん、早く原因等がわかること、再開する時は経過措置をまたお願いします。再開されても、副作用の心配等もありますので、様子を見て無料で接種の期間がなくなるまで、接種しないと思います。定期(無料)予防接種は副作用のことを考えてしまい、無料期間ぎりぎりまで接種をするのを延ばしているように思います。任意と最近の新種類 予防接種は、接種していません。やはり、副作用はこわいです。遅くなりすいません。昔から続いているものは、安全と勝手に考えているところもあります。この機会にわかりにくくたくさん記入してごめんなさい。
37	子宮頸がんは性感染(多数の人との性交渉)と聞きました。ワクチンも必要ですが小中学校の保健の学習に性感染の恐ろしさを話していくのも必要かなと思います。
38	上記アンケートにはお答えいたしません。が当ワクチンは接種していませんので、変わりなく生活しています。このアンケートに「何故接種しなかったか？」と質問項目がないので、この欄で意見を述べたいと思います。新しいワクチンで、副作用がどの程度の割合、どんな症状になるか国としての報告がハッキリしてないので、いくら無料であってもおそろしくて接種しませんでした。今では、その判断は正しかったと思っています。TVなどで報道されている、重とくな症状の女性たちの救済を速やかにしてあげてほしいと思います。
39	副反応の看者の方の力に少しでもなれたらと思います。よろしくお願ひ致します。
40	副作用なのか あらためて心配になった。無料で受診費用を国がだすべき。そしてきちんと調べてからの調査票を調べるべきだと思う こんなアンケート意味がない
41	1回目の接種の際、大変痛がった。翌日まで痛みが続いていた事を覚えています。
42	案内が来た年に1回だけ接種しましたが、子ども達の間で副反応がこわいという話が広がり2回「イヤダ」と子どもが言ったので、接種しませんでした。
43	国からの無料の予防接種で上になぜ2回で止めたのですかとありましたが 2回打ってその後用紙が送ってこなかったと思います。
44	危険なワクチンを接種するより、子宮頸がんにかからない為にはどうすべきかを男子・女子達に教育したほうが良いのではとおもいます
45	子宮頸がんの予防接種は2回までの案内(無料)しか来てなかったし、3回打つものだと知りませんでした。

46	知り合いの子共さんが、ワクチンの副作用の為、すごく苦しんでいます、又、学校にも行けません。国はしっかりとした、支援をするべきです。
47	子宮頸がんワクチンについては副作用のことを考えると怖くて接種する気にはなれません。
48	我家は2人の娘がおります(22才と19才)が子宮頸がんワクチンは接種したことがありません。家庭で娘達には純潔教育をしておりましたので、ワクチン接種の話がきても無視していました。娘達には思春期前後の頃から、結婚のあり方を話しており、結婚するまでは絶対に性交渉してはいけないという事を言い続けてきました。新聞によく高校保健の時間に保健の先生が避妊の方法やコンドームの使い方などを指導している内容の文を読んで「何、今、高校では性交渉を推奨しよとしているのか?とびっくりしました。性交渉を若いうちからしなければ子宮頸がんワクチンは必要なかったのではないか?と思います。私は古い日本の人間だと思われるでしょうが、結婚するまで性交渉はしないという純潔教育が今の学校では必要なのではないのでしょうか?テレビで被害にあい学校も行けない、進学もできない、日々苦しんでる少女を見ました。本当に気の毒です。ワクチンを使わなければならないという誤ち。基本を見失っていたのではないのでしょうか?保健の時間(中学・高校)避妊の方法や、コンドームの使い方を教えるよりも性行為を結婚するまで絶対しないという純潔教育をやるべきです。私の意見は片よってとられるかもしれませんが青少年の最も大事なことを書かせて頂きました。2人の娘をもつ母親より。
49	3回で1セットと医者から言われ1~2回で止めたら打たない事と一緒に言われました。
50	娘に副作用が出なかったのは本当に運が良かっただけで、出てしまったお子さんを考えると気の毒でならない。どうしてあんなに接種を勧めたもので、苦しむ人が多勢出てしまったのか、何度でも考えてもらいたい。そして、苦しんでいる人には手厚く力を注いで下さい。
51	子宮頸がんの予防接種については、副作用が恐しく、接種は考えていません。重大な副作用が出た場合の国の保障を確立してほしいです。
52	●から進学で●に娘が転居しています。行政の皆様には色々とお世話になっています。ありがとうございます。子宮頸ガンワクチンについてはネット上にもその危険性が語られており、信用できないものは接種しないと決め娘3名受けませんでした。その後もこれだけ副反応で苦しんでおられる方がいるのに、”積極的にすすめない”という内容で、どうして判断できないのか疑問に思っています。市民に近い行政である名古屋市では、独自に調査して頂け、実情が明らかになってくればありがたいと思います。
53	任意の予防接種(水痘、おたふく)も接種してきましたが、子宮頸がんワクチンは接種していません。報道を見て不安感が増してしまいました。副反応に対する恐怖心があります。
54	子宮頸がんワクチン接種していません。こわくて
55	副反応の報道を見て、接種をやめました。これから先も接種する事はないです。副反応で苦しむ女の子達の医療の助成を望みます。
56	子宮頸がんワクチンの副作用の方のお話(テレビで)をきき、本当にショックを受けました。娘には絶対にさせたくないと思いました。
57	副反応の報道があったので接種をためらっています
58	腹部の左側が痛む事が時々あり、病院へ行き検査もしましたが原因がわかりません。子宮頸がんワクチンを接種した事と関係があるのではないかと不安です。
59	接種後、腕の痛みが1週間程続き、練習で走る時、腕振りに困った。
60	母子手帳が側にないのですみません。わかりませんが、3度(回)うちました
61	たま～にガンガンした痛みが頭にくることがある。