

市政記者クラブ 様

名古屋市保健所生活衛生部
食品衛生課食品衛生担当
(健康福祉局)
担当:森川、中居
972-2646

南区管内における食中毒の発生について

1 探知及び概要

令和7年3月10日(月)、南保健センターに3月5日(水)に南区の飲食店を利用したところ、複数名が体調不良となった。」との連絡が利用者からありました。

その後の調査の結果、3月5日、8日、9日に当該施設を利用した5グループ15名中12名が食中毒様症状を呈していることが判明しました。患者らの共通食は当該施設で提供された食事のみであること、患者及び調理従事者の検便からノロウイルスが検出されたこと、さらに本日、患者を診察した医師から食中毒の届出があったことなどから、名古屋市保健所(南保健センター)は当該施設が提供した食事を原因とする食中毒事件と判断しました。なお、患者らはいずれも快方に向かっています。

2 発症日時

3月6日(木)午後4時頃から

3 喫食者数

15名

4 患者数

12名(入院0名)

5 主な症状

下痢、嘔吐、発熱 等

6 原因食事提供施設

飲食店営業

施設所在地:名古屋市南区

7 原因食事

3月5日、8日、9日に提供された食事

(寿司(マグロ、ブリ、ヒラメ、イカ、サーモン等)、あら汁、杏仁豆腐 等)

8 病因物質

ノロウイルス(名古屋市衛生研究所で検査を実施)

9 措置

名古屋市保健所は3月12日(水)当該施設における飲食店営業の禁止処分を行いました。

10 本市の食中毒発生状況(3月12日現在、本食中毒を含む。)

	件 数(件)	患 者 数(人)
令 和 7 年	6	129
前 年 同 期	9	253
前 年 計	17	334

現在ノロウイルス食中毒注意報を発令中です。手洗いの励行、体調管理の徹底、食品の十分な加熱等を行い、食中毒防止に心がけましょう。



ノロウイルス食中毒に注意しましょう！

ノロウイルス食中毒は冬場だけでなく1年を通じて発生します。

近年は、調理従事者が原因と考えられる事例が多く発生していることから、手洗いや食品の十分な加熱など、予防対策をしっかり行いましょう。


ノロウイルスの特徴

- ・人の小腸でのみ増殖し、胃腸風邪のような症状（下痢、嘔吐等）を起こします。
(症状は、一般に数日で回復します。)
- ・少ないウイルス量(100個以下)でも感染します。
症状がなくになってからも、しばらくの間、便とともにウイルスが排泄され、食品を汚染したり感染を広げたりする場合があります。
- ・感染しても症状のない人もいますが、便にはウイルスが排泄されます。

ノロウイルス食中毒の予防方法

① 手洗いはしっかり

調理前、食事前、トイレの後、オムツ交換後、
吐物の処理後は、特に念入りに手を洗いましょう。
使い捨て手袋の使用も有効です。



② 食品は中心部まで十分加熱

中心温度85~90℃で90秒間以上加熱しましょう。
加熱調理後も、再汚染のないよう取扱いに注意！



③ 調理器具などを洗浄・消毒

まな板、包丁、食器、ふきん等は、十分に洗浄した後、熱湯(85~90℃で90秒間以上)又は、次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度約200ppm)※で消毒しましょう。
※水2リットルに対して市販の台所用漂白剤を10ミリリットル(キャップ半分弱)加えます。

④ 調理する人の体調に注意

下痢や嘔吐などの症状がある場合は、ノロウイルスに感染している可能性がありますので、調理は控えましょう。
症状がなくても感染している場合があります。日頃から手洗いをしっかり行い、使い捨て手袋を使用するなどして、食品の汚染や他の人への感染を防ぎましょう。

⑤ 患者の吐物は適切に処理

患者の吐物や便には感染力のあるウイルスが残っている可能性があるため、調理器具などよりも高濃度の次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度約1000ppm)※を使用して、ウイルスが飛び散らないように速やかに処理をしましょう。
※水2リットルに対して市販の台所用漂白剤を50ミリリットル(キャップ2杯半分)加えます。

ノロウイルス
による

食中毒を

防ぎましょう!

症状は感染してから
24~48時間後に
おう吐や下痢など



冬場は特に
ノロウイルス
食中毒が
起こりやすい
時期です

予防するには

十分な
手洗い

調理器具等の
洗浄・消毒

体調が
悪い人は
調理を
しない

カキなどの
二枚貝は
十分に
加熱する

